



Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailut vuonna 2023

Neova Oy & Turveruukki Oy

31.5.2024

101018176-002

Sisältö

1	Johdanto	5
2	Tarkkailuvelvolliset.....	5
3	Sääolosuhteet	7
3.1	Lämpötila ja sademäärä.....	7
3.2	Virtaamat.....	9
4	Tarkkailun toteutus vuonna 2023	9
4.1	Virtaamamittaus.....	9
4.2	Kuormitustarkkailu	10
4.3	Vesistötarkkailu.....	12
4.4	Käytetyt menetelmät.....	13
4.4.1	Ominaiskuormitusten laskenta.....	13
4.4.2	Tulosten tarkastelu.....	14
5	Tuotantoaluekohtaisen käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailun tulokset	16
5.1	Hevoskorpi	16
5.1.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	16
5.1.2	Vesistötarkkailu	18
5.2	Hourunneva.....	21
5.2.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	21
5.2.2	Vesistötarkkailu	22
5.3	Huhanneva	25
5.3.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	25
5.3.2	Vesistötarkkailu	28
5.4	Huhtineva	31

5.4.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	31
5.4.2	Vesistötarkkailu	34
5.5	Jousineva	38
5.5.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	38
5.5.2	Vesistötarkkailu	41
5.6	Jylenneva	44
5.6.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	44
5.6.2	Vesistötarkkailu	46
5.7	Järvineva	50
5.7.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	50
5.7.2	Vesistötarkkailu	52
5.8	Kivineva	54
5.8.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	54
5.8.2	Vesistötarkkailu	58
5.9	Korteneva	64
5.9.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	64
5.9.2	Vesistötarkkailu	67
5.10	Kärjenrimpi	69
5.10.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	69
5.10.2	Vesistötarkkailu	72
5.11	Puronräme	75
5.11.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	75
5.11.2	Vesistötarkkailu	78
5.12	Lahnasneva	78
5.12.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	78
5.12.2	Vesistötarkkailu	80
5.13	Mankisenneva	83
5.13.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	83

5.13.2	Vesistötarkkailu	85
5.14	Paskoneva.....	89
5.14.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	89
5.14.2	Vesistötarkkailu	91
5.15	Pullinneva	93
5.15.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	93
5.15.2	Vesistötarkkailu	96
5.16	Saari-Teerineva (Saarineva).....	99
5.16.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	99
5.16.2	Vesistötarkkailu	102
5.17	Sauvasuo	105
5.17.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	105
5.17.2	Vesistötarkkailu	108
5.18	Tahkoneva	110
5.18.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	110
5.18.2	Vesistötarkkailu	113
5.19	Tervasneva.....	116
5.19.1	Käyttö- ja kuormitustarkkailu	116
5.19.2	Vesistötarkkailu	117
6	Vuosittaisen vesistötarkkailun tulokset 2021–2023.....	120
6.1	Siikajoki.....	121
6.2	Neittävänjoki	122
6.3	Lamujoki	124
6.4	Savaloja.....	125
6.5	Luohuanjoki.....	127
7	ELY-keskuksen seurantatulokset, vesistöhaittailmoitukset sekä muut selvitykset	128
7.1	ELY-keskuksen seurantatulokset	128

7.2	Vesistöhaittailmoitukset sekä muut selvitykset	131
8	Siikajoen turvetuotantoalueen kokonaiskuormitus	131
9	Yhteenveto	132
10	Viitteet.....	132

Liitteet

- Liite 1 Turvetuotantoalueiden ja vesistötarkkailupisteiden sijainti Siikajoen vesistöalueella
- Liite 2 Vedenlaatutulokset: Päästötarkkailu 2023
- Liite 3 Vedenlaatutulokset: Alueellinen vesistötarkkailu 2023
- Liite 4 Vedenlaatutulokset: Vuosittaiset vesistöpiisteet
- Liite 5 ELY-keskuksen vesistötarkkailun tulokset pisteeltä Siikajoki 8-tien s 11600 vuosina 2021–2023

Tekijä
Anu Kivistö-Rahnasto, FM
Iia-Elisabeth Suomi, FM

Tarkastaja/hyväksyjä
Anni Nopanen, FM

1 Johdanto

Siikajoella on voimassa Siikajoen vesistöalueen turvetuotannon päästö- ja vesistö-tarkkailuohjelma vuosille 2020–2024 (Eurofins Ahma Oy 2019). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt suunnitelman (POPELY/257474/2019) vesistö-tarkkailun osalta. Päästötarkkailua suoritetaan kunkin turvetuotantoalueen ympäristöluvassa esitetyllä tavalla. Tarkkailuohjelma sisältää Neova Oy:n, Turveruukki Oy:n ja Piipsan Turve Oy:n turvetuotantoalueet. Piipsan Turve Oy on sittemmin irtaantunut ohjelmasta, koska ainoa sen hallussa ollut alue Mankisenneva siirtyi Neovalle.

Vuonna 2023 Siikajoella oli laajan tarkkailun vuosi, joka kattoi kahdeksan Neovan ja kymmenen Turveruukin turvetuotantoaluetta. Näistä kohteista kahdella, Hourunnevilla ja Tervasnevilla, toteutettiin jälkihoitovaiheen tarkkailua. Jylennevan ja Tervasnevan tarkkailu oli kesäaikaista, ja lopuilla kohteilla tarkkailu oli ympärivuotista.

Siikajoen turvetuottajien vaikutustarkkailuun kuuluu vuosittain toistuva Siikajoen, Neittävänjoen, Lamujoen, Savalojan ja Louhuanjoen vesistötarkkailu. Lisäksi laajan tarkkailun vuoteen kuului turvetuotantoaluekohtaisina vesistötarkkailuina 18 vesistöpisteen tarkkailu.

2 Tarkkailuvelvolliset

Siikajoen turvetuottajien yhteistarkkailuohjelmaan kuuluvat turvetuotantoalueet ja niiden lupapäätökset on esitetty taulukossa 2-1.

Siikajoen yhteistarkkailuun kuuluvilla turvesoilla tuotannossa oli 2 133 ha, tuotantokunnossa oli 166 ha, kuntoonpanossa 19 ha ja turvetuotannosta poistunutta (ei vielä muuhun maankäyttöön siirtynyttä) alaa 172 ha. Kuormittava pinta-ala oli yhteensä 2 490 ha. Hourunnevilla ja Tervasnevilla tehtiin lopputarkastus syksyllä 2023 ja lupavelvoitteet päättyivät, joten kyseiset suot poistuivat yhteistarkkailusta.

Taulukko 2-1. Siikajoen turvetuottajien yhteistarkkailuun kuuluvat turvetuotantoalueet, niiden lupapäätökset, kuormittava pinta-ala ja tarkkailun toteutus vuonna 2023.

Turvetuotanto- alue	Tuottaja	Lupapäätös	Tuotan- nossa [ha]	Tuotanto- kunnossa [ha]	Kuntoon- panossa [ha]	Poistunut tuotannosta [ha]	Pinta-ala yhteensä [ha]	Tarkkailu 2023
Hevoskorpi	Turveruukki Oy	PSAVI 82/11/1	92			1,8	93,8	x
Hourunneva*	Turveruukki Oy	PSAVI 164/2015/1					0,0	x
Huhanneva	Turveruukki Oy	PSAVI 103/2016/1	110,5			1	111,5	x
Huhtineva	Turveruukki Oy	PSAVI 4/2017/1, VHO 20/0040/1	61,6			15,2	76,8	x
Jousineva	Neova Oy	PSAVI 168/04.08/2012	56		18,8	19,0	93,8	x
Jylenneva	Turveruukki Oy	PSAVI 52/11/1, vireillä PSAVI 12567/2022	70,8			1,1	71,9	x
Järvineva	Turveruukki Oy	PSY 98/09/2, VHO 10/0754/3, PSAVI 152/2022	53,3			4,1	57,4	x
Kivineva	Neova Oy	PSAVI 182/04.08/2012	96			113,6	209,6	x
Korteneva	Neova Oy		107,8				107,8	x
Kärjenrimpi	Neova Oy	PSAVI 5203/2020	280,8				280,8	x
Lahnasneva	Turveruukki Oy	PSAVI 42/08/2, PSAVI 163/2021	119,9			6,4	126,3	x
Mankisenneva	Neova Oy	PSAVI 1072/2020	264,7				264,7	x
Paskoneva	Neova Oy	PSAVI 10432/2020		77,6			77,6	x
Peuraneva	Turveruukki Oy	PSY 7/08/2, PSAVI 6/2021	126,1			3,2	129,3	
Pikarinneva	Turveruukki Oy	PSAVI 64/2015/1, VHO 17/0029/1	40,7				40,7	
Pullinneva	Turveruukki Oy	PSAVI 127/12/1, PSAVI 73/2017/1, PSAVI 167/2022	48				48,0	x
Puronräme	Neova Oy	PSAVI 5203/2020	252	58			310,0	x
Saari-Teerineva	Neova Oy	PSAVI 4256/2020	114,8				114,8	x
Sauvasuo	Neova Oy	PSY 83/09/2		30,5			30,5	x
Savaloneva	Turveruukki Oy	PSY 49/04/2, PSAVI 67/2018/1, VHO 21/0079/1	59,4			4,1	63,5	
Tahkoneva	Turveruukki Oy	PSAVI 74/2016/1	141,4			1,2	142,6	x
Tervasneva*	Turveruukki Oy	PSY 61/08/2, PSAVI 164/2021					0,0	x
Vesiläisenneva	Matti Suni / Turveruukki Oy	PSAVI 53/2013/1, VHO 14/0095/2, KHO 2856	37,2			1,4	38,6	
Siikajoen vesistöalue yhteensä			2 133	166	19	172	2 490	

* Lopputarkastettu, velvoitteet lakanneet

Taulukossa 2-2 on listattu turvetuotantoalueiden sijainti ja purkureitit. Soiden sijainti on esitetty kartalla liitteessä 1.

Taulukko 2-2. Siikajoen turvetuottajien yhteistarkkailuun kuuluvat turvetuotantoalueet ja valumavesien purkureitit.

Turvetuotanto- alue	Tuottaja	Vesistö- alue	Laskureitti	Kunta
Hevoskorpi	Turveruukki Oy	57.017	Luhtaanoja-Lamujoki-Siikajoki	Siikalatva
Hourunneva	Turveruukki Oy	57.021	Laskuoja-Pakkulanoja-Kurraoja-Siikajoki	Siikalatva Rantsila
Huhanneva	Turveruukki Oy	57.073	Köyryoja-Savaloja-Kurunkanava-Siikajoki	Siikalatva Rantsila
Huhtineva	Turveruukki Oy	57.018	Laskuoja-Pesuanaja-Siikajoki	Siikalatva Ruukki
Iso Manninen	Turveruukki Oy	57.032	Uljuanoja-Uljuan kanava-Uljuan tekoallas-Lamujoki-Siikajoki	Siikalatva Piippola
Jousineva	Neova Oy	57.027	Jousioja-Siikajoki	Siikalatva
Jylenneva	Turveruukki Oy	57.068	Ristisenoja-Lamujoki-Siikajoki	Siikalatva Piippola
Järvineva	Turveruukki Oy	57.013	Laskuoja-Siikajoki	Siikalatva Ruukki
Kivineva	Neova Oy	57.028/ 57.069	Myllyoja-Leuvanjärvi-Leuvanojan-Siikajoki / Naarastenoja-Lamujoki-Siikajoki	Siikalatva
Korteneva	Neova Oy	57.063	Laskuoja-Lamujoki-Kortteisen tekojärvi-Lamujoki-Siikajoki	Siikalatva
Kupukkaneva	Turveruukki Oy	57.024	Purasimenoja-Kärsämäenjoki-Mankilanjärvi-Iso-oja-Siikajoki	Siikalatva Rantsila
Kärjenrimpi	Neova Oy	57.048	Laskuoja-Veneoja-Neittävänjoki-Siikajoki	Vaala
Lahnasneva	Turveruukki Oy	57.069	Naarastenoja-Lamujoki-Siikajoki	Siikalatva Pulkila
Mankisenneva	Neova Oy	57.026	Mankisenoja-Kurranjärvi-Kurranaja-Siikajoki	Siikalatva
Paskoneva	Neova Oy	57.068	Laskuoja-Pasko-oja-Ristisenoja-Lamujoki-Siikajoki	Haapavesi
Peuraneva	Turveruukki Oy	57.072	Laskuoja-Savaloja-Kurunkanava-Siikajoki	Siikalatva Rantsila
Pikarinneva	Turveruukki Oy	57.018/ 57.071	Laskuoja-Pesuanaja-Siikajoki	Siikalatva ja Siikajoki
Pullinneva	Turveruukki Oy	57.014	Vesioja-Iso-oja-Siikajoki	Siikajoki ja Siikalatva
Puronräme	Neova Oy	57.042	Laskuoja-Neittävänjoki-Siikajoki	Vaala
Saari-Teerineva	Neova Oy	57.037	Laskuoja-Pahkapuro-Siikajoki	Pyhäntä
Sauvasuo	Neova Oy	57.033	Laskuoja-Siikajoki	Pyhäntä
Savaloneva	Turveruukki Oy	57.073	Köyryoja-Savaloja-Kurunkanava-Siikajoki	Siikalatva
Siltaneva	Team Honkaturve Oy, Turveruukki Oy	57.018	Laskuoja-Pesuanaja-Siikajoki	Siikajoki ja Siikalatva
Tahkoneva	Turveruukki Oy	57.029	Kurunkanava-Siikajoki	Siikalatva Rantsila
Tervasneva	Turveruukki Oy, Paavolan Turve Ky	57.017	Laskuoja-Hanhioja-Siikajoki	Siikajoki
Vesiläisenneva	Matti Suni, Turveruukki Oy	57.073	Köyryoja-Savaloja-Kurunkanava-Siikajoki	Siikalatva


3 Sääolosuhteet

3.1 Lämpötila ja sademäärä


Vuoden 2023 kuukausittaiset keskilämpötilat ja -sademäärät on esitetty kuvissa 3-1 ja 3-2. Koko vuoden keskilämpötila oli Siikalatvan Ruukissa sama kuin vuosien 1991–2020 keskilämpötila. Alueella satoi 4 % tavanomaista enemmän.

Siikalatvan Ruukissa maaliskuu-, huhti-, heinä- ja loka-joulukuu olivat tavanomaista kylmempiä, ja muiden kuukausien osilta lämpötilat olivat tavanomaista korkeampia.

Siikalatvan Ruukissa sadanta oli erityisesti lokakuussa vertailujaksoa huomattavasti suurempaa ja vettä satoi 71 mm enemmän kuin vertailujaksona keskimäärin. Etenkin helmi-, touko- ja kesäkuu olivat tavanomaista kuivempia kuukausia.




Kuva 3-1 Keskilämpötilat Siikalatvan Ruukissa tarkkailujaksolla 2023 ja vertailujaksolla 1991–2020 (Ilmatieteen laitos 2024).



Kuva 3-2 Sademäärät Siikalatvan Ruukissa tarkkailujaksolla 2023 ja vertailujaksolla 1991–2020 (Ilmatieteen laitos 2024).

3.2 Virtaamat

Kuvassa 3-3 on esitetty Siikajoen virtaamat Länkelän mittauspisteeltä tarkkailujaksolla sekä keskimääräiset virtaamat vertailukautena 1991–2022. Siikajoessa loppuvuoden virtaamat olivat selvästi tavanomaista suurempia. Toukokuussa virtaamat olivat keskimäärin hieman pitkän ajan keskiarvoa suurempia ja kesäkuussa hieman pitkän ajan keskiarvoa pienempiä.



Kuva 3-3 Siikajoen virtaama Länkelän mittauspisteellä tarkkailukaudella 2023. Kuvassa on esitetty myös vertailukausien keskimääräisiä virtaamia (Syke 2024).

4 Tarkkailun toteutus vuonna 2023

4.1 Virtaamamittaus

Vuonna 2023 virtaamaa mitattiin jatkuvatoimisella mittalaitteella ympärivuotisesti yhdeksällä kohteella, joiden lisäksi virtaamamittaus oli vähintään sulan maan aikana kuudella kohteella. Ympärivuotinen virtaamamittaus toteutui Hevoskorvella, Jousinevalla, Järvinevalla, Kivinevalla, Kärjenrimmellä, Paskonevalla, Pullinnevalla ja Tahkonevalla. Sulan maan aikainen virtaamamittaus oli Hourunnevilla, Huhannevilla, Huhtinevalla, Jylennevalla, Kortenevalla, Lahnasnevilla ja Tervasnevilla. Puronrämeellä hyödynnettiin Kärjenrimmen pvk 1:n virtaamamittausta, ja

Mankisennevan pvk:llä 2 hyödynnettiin kyseisen suon pvk 1 virtaamamittausta. Saarinevalla (Saari-Teerineva) oma virtaamamittaus onnistui tammi-huhtikuun ja touko-heinäkuun, mutta muulloin virtaamat arvioitiin Ahmonsuon valuman avulla. Sauvasuolla virtaamamittari oli paikoillaan mittapadolla, mutta se ei suostunut lähettämään dataa useista huolto- ja korjaustoimenpiteistä huolimatta. Myös Sauvasuon virtaamat arvioitiin Ahmonsuon valumien avulla.

Jatkuvatoimisessa virtaamamittauksessa mittalaite tallentaa vedenkorkeuden mittapadolla 15 minuutin välein. Yksittäisten pinnankorkeustulosten avulla lasketaan vuorokauden keskivirtaamat ja edelleen laskentajakson virtaamat. Virtaama muutetaan valumaksi jakamalla virtaama mittapadon valuma-alueen pinta-alalla.

Mikäli virtaamaa ei mitattu jatkuvatoimisesti koko tarkkailujakson ajan tai mittaus ei onnistunut luotettavasti, arvioitiin virtaama ensisijaisesti saman tuottajan toisen, lähellä sijaitsevan jatkuvatoimisen virtaamamittauskohteen valuman avulla, tai toissijaisesti SYKE:n vesistömallijärjestelmän (WSFS) avulla.

Kesän 2023 keskivaluma oli Siikajoen tarkkailusoilla 8,8 l/s/km² (Taulukko 4-1). Vuoden 2023 keskivaluma oli 14,3 l/s/km². Vuonna 2022 Siikajoella oli suppean tarkkailuvuoden vuoksi vain vähän tarkkailukohteita, joten valumia ei vertailla edelliseen vuoteen.

Valumia on tarkasteltu tuotantoaluekohtaisesti kappaleessa 6.

Taulukko 4-1 Keskimääräiset keskivalumat Siikajoen tarkkailun kohteilla vuonna 2023. Keskiarvoihin sisältyvät vain kohteet, joilla toteutettiin omaa virtaamamittausta kyseisellä jaksolla.

Jakso	n	Mq l/s/km ²
Talvi	12	4,9
Kevät	11	47
Kesä	19	8,8
Alkusyksy	18	41
Loppusyksy	12	3,7
Vuosi	15	14,3

4.2 Kuormitustarkkailu

Turvetuotannossa tarkkailuvuosi kattaa yhden kalenterivuoden. Turvetuotantoalueiden päästötarkkailua toteutetaan Siikajoen vesistöalueen turvetuotannon

päästö- ja vesistötarkkailuohjelman 2020–2024 (Eurofins Ahma Oy 2019) mukaisesti. Tarkkailuohjelmassa on huomioitu kunkin kohteen ympäristöluvan määräykset.

Ympärivuotisen tarkkailun kohteilla päästötarkkailunäyte otettiin talvella ja loppusyksyllä kerran kuukaudessa, kevättulvan aikaan kerran viikossa ja kesäaikaan kahden viikon välein. Vuoden 2023 kuudestatoista tarkkailukohteesta kaikki olivat ympärivuotisessa tarkkailussa kahta kohdetta lukuun ottamatta. Jylenneva ja Tervasneva olivat kesäaikaisessa tarkkailussa. Jylennevalla päästötarkkailunäytteet otettiin kahden viikon välein touko-lokakuussa. Jälkihoitovaiheessa olevalta Tervasnevalta päästötarkkailunäyte otettiin touko-lokakuussa kerran kuukaudessa.

Vesiensuojelurakenteen tehoa tarkkailtiin kaikilla tarkkailukohteilla, lukuun ottamatta Hevoskorpea, Hourunnevaa ja Tervasnevaa. Tehon tarkkailu toteutettiin pääosin ottamalla näytteet ennen ja jälkeen vesienkäsittelyn kerran kuussa (Saari-Teerineva, Sauvasuo, Jousineva, Kivineva, Korteneva, Mankisenneva, Huhanneva, Huhtineva, Järvineva, Pullinneva ja Tahkoneva). Paskonevalla, Kärjenrimmellä ja Puronrämeellä tehon tarkkailun näytteet otettiin kolme kertaa vuodessa, kesä-, heinä- ja elokuussa. Lahnasnevan tehon tarkkailun näytteet otettiin kerran kuussa touko-lokakuussa. Kaikkien vuoden 2023 tarkkailukohteiden vesienkäsittelymenetelmänä oli ns. perustason rakenteiden lisäksi pintavalutuskenttä. Jäätynneen maan aikana, kun pumppaus ei ollut käynnissä, Tahkonevalla osalla alueesta oli vesienkäsittelynä kosteikko ja Lahnasnevalla laskeutusallas.

Päästötarkkailunäytteistä tehtiin aina laboratoriossa seuraavat määritykset: kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (COD_{Mn}), kokonaistyyppi, kokonaisfosfori ja pH (ns. suppea analyysivalikko). Lisäksi määritettiin pääsääntöisesti kerran kuussa ammoniumtyppi, fosfaattifosfori, nitriitti-nitraattitypen summa ja rauta (ns. laaja analyysivalikko). Näytteistä määritettiin kiintoaineen hehkutushäviö aina, kun kiintoainepitoisuus ylitti 20 mg/l. Lisäksi tehtiin myös muita analyysseja, mikäli niistä oli määrätty tuotantoaluekohtaisessa ympäristöluvassa. Kuormitustarkkailun tarkkailuohjelman mukaisesta näytteenotosta ja analytiikasta vastasi Eurofins Ahma Oy.

Toiminnanharjoittajilla on velvollisuus tehdä käyttötarkkailua koko toiminnan ajan kirjaamalla erityisesti ympäristövaikutuksiin liittyviä seikkoja päiväkirjaan.

Käyttötarkkailuyhteenvedon oleelliset seikat on esitetty kunkin tuotantoalueen tulosten tarkastelun yhteydessä kappaleissa 6. Toiminnanharjoittajan on lisäksi otettava päästötarkkailuvuosina tarkkailukohteilta normaalin näytteenoton lisäksi ylimääräisiä päästötarkkailunäytteitä poikkeustilanteissa, kuten rankkasateiden aikana. Mahdollisten omavalvontanäytteiden tulokset on esitetty kunkin tarkkailukohteen tuloslakanassa (Liite 2).

4.3 Vesistötarkkailu

Vesistötarkkailu piti sisällään kaikille tarkkailuun kuuluville tuotantoalueille yhteisen vuosittaisen tarkkailun näytteenoton kuudella vesistötarkkailupisteellä (Taulukko 6-1), ja vesistötulosten raportoinnin vuosien 2021–2023 osalta. Tulokset on raportoitu kappaleessa 6, ja tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 4.

Tarkkailuun kuului 43 turvetuotantoalueen lähivesistötarkkailupistettä, joista yksi (Neittävänjoki Koskenkylä Ne2) oli mukana myös yhteisen vuosittaisen tarkkailun pisteenä. Lähivesistötarkkailutulokset on esitetty turvetuotantoaluekohtaisesti kappaleessa 5, ja tarkemmat tulokset liitteessä 3.

Kaikki vesistötarkkailun näytteet otettiin vuonna 2023 tarkkailuohjelman mukaisesti neljä kertaa: maaliskuussa sekä kesä-, heinä- ja elokuussa. Päästö- ja vesistötarkkailun kiintoainepitoisuudet on määritetty käyttäen suodatinkokoa 1,2 µm.

Lisäksi Siikajoen tarkkailuohjelman mukaan ELY-keskuksen seurantatuloksia ja muita vesistön tilaa koskevia selvityksiä tulee hyödyntää laajassa vuosiraportissa. Vuosina 2021–2023 ELY-keskus seurasi vedenlaatua neljällä tarkkailupisteellä. Näistä kattavimman aineiston omaava tarkkailupiste Siikajoki 8-tien s 11600 valittiin raportin tarkasteluun ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti (Taulukko 7-1). Havaintopaikka on vuosittaisessa jokien mereen kuljettamien ainemäärien seurannassa. Pisteen tarkemmat vedenlaatutulokset on esitetty liitteessä 5.

4.4 Käytetyt menetelmät

4.4.1 Ominaiskuormitusten laskenta

Kunakin vuonna päästötarkkailussa oleville kohteille lasketaan kohteen omien virtaama- ja vedenlaatutulosten perusteella tarkkailukohteen ominaiskuormitukset (grammaa hehtaarilta päivässä, g/ha/d). Jos mittapadon valuma-alue ja/tai vesienkäsittelymenetelmä muuttuivat kesken tarkkailukauden, huomioitiin muutokset laskennoissa vuorokauden tarkkuudella. Mikäli näytteestä määritetty pitoisuus jäi alle määrittämissärajat, käytettiin päästölaskennassa (pitoisuuskeskiarvot ja ominaiskuormitukset) määrittämissärajat arvoa.

Turvetuotannon päästöjen laskentamenetelmänä käytetään periodimenetelmää. Pitoisuuden oletetaan olevan havaintopäivänä mitatun suuruisen havaintopäivän ja sitä edeltävän havaintopäivän puolivälistä havaintopäivän ja sitä seuraavan havaintopäivän puoleenväliin. Jos näytteenotto ajoittui selvästi poikkeavaan virtaamatilanteeseen, esimerkiksi ylivirtaamatilanteeseen, käytettiin havaintopäivän pitoisuuksia mahdollisuuksien mukaan vain virtaamapiikin aikajaksolle. Samoin menetellään, kun otetaan ylimääräisiä vesinäytteitä poikkeustilanteissa. Myös nollassa virtaamassa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan erottamaan omiksi laskentajaksoiksi.

Vuodenaikajaksolle (talvi, kevät, kesä, alkusyksy ja loppusyksy) ominaiskuormitukset laskettiin painottamalla kunkin laskentajakson kuormituksia jakson pituudella ja vastaavasti koko vuoden ominaiskuormitus laskettiin painottamalla vuodenaikajaksojen kuormituksia vuodenajan pituudella. Tulosraporteilla näkyvät kaikkien yllä mainittujen jaksojen ominaiskuormitukset siltä osin, kuin tarkkailua tehtiin.

Turvetuotantoalueiden vuosikuormitukset on toimitettu tarkkailuvelvollisten toimesta vuosiraportoinnista vastanneelle konsultille (AFRY Finland Oy) raportointia varten. Vuosikuormituksen on laskettu kunkin tuotantoalueen omalla, vuoden 2023 tarkkailuaineistolla silloin, kun aineistoa on ollut saatavilla. Turveruokin turvetuotantoalueiden, jotka eivät olleet tarkkailussa tai niiltä osin kuin omat tarkkailutulokset joltakin jaksolta puuttuivat, vuoden 2023 vuosikuormitukset laskettiin

Turveruukin vuonna 2023 tarkkailussa olleiden Pohjois-Pohjanmaan alueen turvetuotantoalueiden aineistolla. Turveruukin laskenta-aineiston laatimisesta ja vuosikuormituslaskennasta vastasi Eurofins Ahma Oy.

4.4.2 Tulosten tarkastelu

Tarkkailusoilta lähteneen veden laatua ja ominaiskuormituksia on verrattu Pöyry Finland Oy:n (2016) laatimaan Turvetuotantoalueiden ominaiskuormitusselvitykseen, jossa on tarkasteltu turvetuotantoalueilta lähteneen veden laatua ja kuormitusta turvetuotannon eri vaiheissa sekä eri vesienkäsittelymenetelmillä vuosina 2011–2015. Selvityksessä tehtiin vedenlaatu- ja ominaiskuormitustarkastelut kiintoaineen, kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) suhteen. Selvityksen aineistona toimi turvetuotantoalueiden päästötarkkailuaineisto, ja tarkastelu tehtiin alueittain. Tässä raportissa Siikajoen tarkkailutuloksia verrataan ominaiskuormitusselvityksen Pohjois-Suomen alueen tuloksiin (Taulukot 4-2 – 4-5). Ominaiskuormituksille on tyypillistä suuri vaihtelu kohteiden ja vuosien välillä, johtuen etenkin lähtevän veden määrän vaihtelusta, mikä puolestaan johtuu pääasiassa sademäärän vaihtelusta.

Turvetuotannon vesistövaikutuksia arvioitiin tarkastelemalla turvetuotantoalueen lähivesistöpisteiden vedenlaatua. Tuotantoalueen laskukohdan ylä- ja alapuolisten pisteiden vedenlaatutuloksia vertailtiin aina, kun tuotantoalueella oli myös laskukohdan yläpuolinen näytepiste. Tarkastelussa huomioitiin myös tuotantoalueelta lähteneen veden laatu. Näin pyrittiin havaitsemaan turvetuotantoalueelta lähteneen veden mahdollinen vaikutus vastaanottavan vesistön vedenlaatuun. Tarkastelua vaikeutti yläpuolisen vesistötarkkailupisteen puuttuminen osalta tuotantoalueita, sekä osin myös vesistötarkkailupisteiden sijainti kaukana tuotantoalueesta. Etenkin etäisyyksien ollessa pitkiä, on turvetuotannon vaikutusta vedenlaatuun vaikea erottaa muusta vesistöön kohdistuvasta kuormituksesta.

Taulukko 4-2 Tuotannossa olevien ojittamattomien pintavalutuskentällisten kohteiden keskimääräiset vedenlaadut vuosina 2011–2015 (n = näytteiden lukumäärä) (Pöyry Finland Oy 2016).

PINTAVALUTUSKENTTÄ: OJITTAMATTOMAT					
Tuotantovaihe	Kiintoaine mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	COD _{Mn} mg/l	n.
Pohjois-Suomi					
Talvi	5,5	38	1 329	27	401
Kevät	4,1	29	927	20	362
Kesä	5,9	44	1 006	33	2 186
Syksy	3,6	35	1 179	26	353
Vuosi	5,3	39	1 162	28	3 302

Taulukko 4-3 Tuotannossa olevien ojitettujen pintavalutuskentällisten kohteiden keskimääräiset vedenlaadut vuosina 2011–2015 (n = näytteiden lukumäärä) (Pöyry Finland Oy 2016).

PINTAVALUTUSKENTTÄ: OJITETUT					
Tuotantovaihe	Kiintoaine mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	COD _{Mn} mg/l	n.
Pohjois-Suomi					
Talvi	3,9	51	1 669	29	280
Kevät	4,6	40	1 340	24	200
Kesä	7,6	71	1 574	44	1 031
Syksy	5,5	45	1 710	30	191
Vuosi	5,4	56	1 610	34	1 702

Taulukko 4-4 Tuotannossa olevien ympärivuotisten ojittamattomien pintavalutuskentällisten kohteiden keskimääräiset ominaiskuormitukset vuosina 2011–2015 (n = jaksokeskiarvojen lukumäärä) (Pöyry Finland Oy 2016).

PINTAVALUTUSKENTTÄ: Brutto OJITTAMATTOMAT				
Tuotantovaihe	Kiintoaine g/ha d	Kok.P g/ha d	Kok.N g/ha d	COD _{Mn} g/ha d
Pohjois-Suomi				
Talvi	43	0,31	12	233
Kevät	180	1,24	47	973
Kesä	70	0,50	13	400
Syksy	78	0,78	30	643
Vuosi g/ha d	69	0,51	18	407
Vuosi kg/ha a	25	0,19	6,5	149

Taulukko 4-5 Tuotannossa olevien ympärivuotisten ojitettujen pintavalutuskentällisten kohteiden keskimääräiset ominaiskuormitukset vuosina 2011–2015 (n = jaksokeskiarvojen lukumäärä) (Pöyry Finland Oy 2016).

PINTAVALUTUSKENTTÄ: OJITETUT	Brutto Kiintoaine	Kok.P	Kok.N	COD_{Mn}
Tuotantovaihe	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
Pohjois-Suomi				
Talvi	35	0,41	17	276
Kevät	176	1,48	58	922
Kesä	94	0,75	18	490
Syksy	91	0,79	31	542
Vuosi g/ha d	75	0,67	23	441
Vuosi kg/ha a	27	0,25	8,3	161

5 Tuotantoaluekohtaiset käyttö-, päästö- ja vesistö-tarkkailun tulokset

5.1 Hevoskorpi

5.1.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Hevoskorvella tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 31 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 88,2 ha ja tuotannosta poistuneita alueita 1,8 ha. Laskeutusaltaat puhdistettiin lokakuussa, ja sarkaojarakenteet puhdistettiin touko- ja lokakuussa. Lisäksi tuotantoaluetta siivottiin touko-kesäkuussa sekä elokuussa. Tuotantoaikainen (25.6.-2.10.2023) sadanta oli 159 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 12.1.–11.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 20, joista viitenä kertana ei saatu otettua näytettä vähäisen virtaaman takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-1.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaistyyppipitoisuus oli alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä vain pieni osuus esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosforipitoisuus oli lähes samalla tasolla kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista noin kolmasosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. COD_{Mn}-pitoisuus oli hieman korkeammalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin, ja kiintoainepitoisuus oli alhaisempi kuin

vertailukohteilla keskimäärin. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 1 414 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Hevoskorvella oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympärivuotisesti. Jaksoilla 30.1.–8.4., 18.6.–2.7., 14.–31.10. ja 14.–31.12. virtaamaa ei ollut. Hevoskorven kesän keskivaluma (6,0 l/s km²) oli pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-1.

Taulukko 5-1 Hevoskorven pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l
Pvk1	Talvi	1.1. - 9.4.	99	3,2	1	7,3	22	35	740	1,4
Pvk1	Kevät	10.4. - 14.5.	35	76	4	6,4	20	29	855	1,5
Pvk1	Kesä	15.5. - 14.9.	123	6	7	6,7	42	39	1081	2,9
Pvk1	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	27	2	6,6	31	32	1195	2,5
Pvk1	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	3	1	7,1	21	50	860	2,0
Pvk1	Vuosi	1.1.-31.12.	365	14	15	6,6	32	36	999	2
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:llä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3


Hevoskorven pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-2. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat kaikilta osin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) alhaisemmat. Kokonaiskuormitus oli COD_{Mn} ja kokonaistypen osalta edellisvuotta korkeampi, ja kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta alhaisempi.

Taulukko 5-2 Hevoskorven pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Talvi	61	0,1	2,1	4
Pvk1	Kevät	1 147	1,8	55	107
Pvk1	Kesä	209	0,2	6,7	13
Pvk1	Alkusyksy	719	0,7	32	55
Pvk1	Loppusyksy	58	0,1	2	5
Pvk1	Vuosi	299	0,4	13	24
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.062	93,8	10 245	13	432	811
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>10 098</i>	<i>17</i>	<i>386</i>	<i>2 137</i>

5.1.2 Vesistötarkkailu

Hevoskorven vedet johdetaan pintavalutuskentältä reittiä Luhtaanoja–Lamujoki–Siikajoki. Hevoskorvelta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön seurattiin tarkkailuohjelman mukaisesti Hevoskorven alapuolisen Luhtaanojan tarkkailupisteellä Hev1. Tarkkailupisteen sijainti on esitetty kuvassa 5-1.



Kuva 5-1 Hevoskorven päästötarkkailupisteen ja alueellisen vesistötarkkailupisteen sijainti.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 20.3., 8.6., 5.7. ja 17.8 (Hev1). Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-3 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Luhtaanojan vesi oli kesäkuun näytekierroksella neutraalia, ja muiden näytteenottojen aikaan lievästi emäksistä. Veden happitilanne vaihteli välillä välttävä–erinomainen, ollen tyypilliseen tapaan heikoimmillaan elokuussa. Korkeat COD_{Mn}-pitoisuudet ja väriluku indikoivat suurta humusvaikutusta, ja kokonaisravinnepitoisuudet reheviä/erittäin reheviä olosuhteita. Kiintoainepitoisuudet olivat

korkeimmillaan elokuun näytteenoton aikaan, ja vesi oli jokaisella näytekerroksella sameaa. Rautapitoisuudet olivat korkeita.

Hevoskorven vesistötarkkailupisteellä vedenlaatu oli heikointa heinäkuun ja elokuun tarkkailukierroksella.

Luhtaanojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.


Taulukko 5-3 Hevoskorven alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Luhtaanoja Hev1 (Hevoskorven ap)	71314	20.3.2023	7,2	75	31	87	1000	330	5 500	5,6
		8.6.2023	7,0	85	43	51	820	330	2 700	4,6
		5.7.2023	7,3	80	50	110	1300	470	6 300	11,0
		17.8.2023	7,2	67	67	130	1400	620	7 500	8,5

Kuvassa 5-2 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Hevoskorven pintavalituskentältä 1 lähteneessä vedessä (pvk1) sekä Hevoskorven alapuolisessa Luhtaanojassa (Hev1). Näytteet on otettu samoina päivinä, lukuun ottamatta pisteen pvk1 maaliskuun näytettä, jota ei saatu ollenkaan.

Mittapadon pisteen pvk1 vedenlaatu oli joko selvästi parempaa tai hyvin lähellä Luhtaanojan pisteen Hev1 vedenlaatua (Kuva 5-2). Etenkin kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet olivat selvästi matalampia mittapadon pisteellä.

Tarkkailussa ei ole mukana suoalueen yläpuolista pistettä, ja Luhtaanojan piste Hev1 sijaitsee yli 2 kilometriä Hevoskorven mittapadolta alavirtaan. Tämän vuoksi turvetuotantoalueen vaikutusta alapuoliseen vesistöön on vaikea arvioida.



Kuva 5-2 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Hevoskorven pintavalutuskentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Hevoskorven alapuolella Luhtaanojassa (Hev1) vuonna 2023.

5.2 Hourunneva

5.2.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Hourunnevan viimeinen tuotantovuosi oli 2020, ja se on ollut jälkihoitovaiheessa sen jälkeen. Hourunnevan lohkojen 1–8 jälkihoitovelvoitteet loppuivat vuonna 2022, ja tarkkailu vuonna 2023 tehtiin vain lohkojen 9–10 osalta. Tuotantoalueen lohkojen 9–10 osalta lopputarkastus tehtiin vuonna 2023.

Hourunnevan keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-4. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Taulukko 5-4 Hourunnevan laskeutusaltaan/pintavalutuskentän keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m	SO ₄ mg/l
la	Talvi	1.1. - 9.4.	99	5,3	1	6,2	31	120	2200	38,0	9,6	5,0
la	Kevät	10.4. - 17.6.	69	22	5	6,0	19	43	1060	3,4	4,3	5,5
la/pvk	Kesä	18.6. - 14.9.	89	5	5	5,8	35	48	873	4,2	4,9	7,0
la	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	76	3	5,9	32	50	1733	2,6	6,9	11,2
la	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	3	2	6,1	40	103	2550	19,0	10,2	3,7
la/ Pvk	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	17	16	5,9	29	59	1419	8	5	8
pvk	Vuosi				3	5,9	37	46	1010	2	6,0	6,8
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:illä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3		

* SYKE:n vesistömalli (WSFS) 1.1.-30.5. ja 2.11.-31.12.

Hourunnevan laskeutusaltaan/pintavalutuskentän vuoden 2023 ominaiskuormitukset on esitetty taulukossa 5-5.


Taulukko 5-5 Hourunnevan laskeutusaltaan/pintavalutuskentän ominaiskuormitukset (g/ha/d) vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
la	Talvi	143	0,6	10,1	175,3
la	Kevät	412	0,9	23	90
la/pvk	Kesä	156	0,2	4,4	11
la	Alkusyksy	2 376	3,3	123	172
la	Loppusyksy	111	0,3	7,5	52
la/pvk	Vuosi	442	0,8	23,1	92

5.2.2 Vesistötarkkailu

Hourunnevan lohkojen 9–10 vedet johdetaan reittiä laskuoja–Pakkulanoja–Kurraoja–Siikajoki. Hourunnevan lohkoilta 9–10 lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Hourunnevan yläpuoliselta tarkkailupisteeltä Pakkulanoja Pa1 ja Hourunnevan alapuoliselta pisteeltä Pakkulanoja alapuoli Pa0. Tarkkailuohjelman mukaisesti, laskeutusaltaan 1 alapuolisesta tarkkailupisteestä Selkämaanoja yläp ei otettu näytteitä vuonna 2024. Näytteitä ei otettu, sillä Hourunnevan pohjoisosan lohkojen, joiden vedet laskevat

Selkämaanojaan, tarkkailuvelvoitteet päättyivät vuonna 2022. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-3.



Kuva 5-3 Hourunnevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 14.3., 8.6., 6.7. ja 17.8. Hourunnevan yläpuoliselta tarkkailupisteeltä Pakkulanoja Pa1 ei saatu näytettä maaliskuussa. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 4-5 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Hourunnevan yläpuolisen tarkkailupisteen Pakkulanoja Pa1 ja alapuolisen pisteen Pa0 veden laaduissa ei ollut havaittavissa suuria eroja. Yläpuolisen pisteen Pa1 vedenlaatu oli osin jopa Hourunnevan alapuolista pistettä heikompaa.

Pakkulanojan vesi oli lievästi hapanta tai neutraalin tuntumassa, ja happipitoisuudet vaihtelivat välillä välttävä–erinomainen ollen heikoimmillaan maaliskuun tarkkailukierroksella. Vesi oli hyvin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat reheviä/erittäin reheviä olosuhteita, kokonaisfosforipitoisuuksien ollessa korkeimmillaan heinä- ja elokuun tarkkailukierroksilla. Kokonaistyyppipitoisuudet olivat selvästi korkeampia Hourunnevan yläpuolisella pisteellä Pa1. Rautapitoisuudet olivat korkeita, ja pitoisuudet olivat korkeimmillaan heinä-elokuun näytekiirroksilla. Pakkulanojan kiintoainepitoisuudet olivat korkeimmillaan elokuussa.


Pakkulanojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.

Taulukko 5-6 Hourunnevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
		14.3.2023								ei näytettä
Pakkulanoja Pa1 (Hourunnevan yp)	65440	8.6.2023	7,0	88	31	99	1000	350	6 000	8,0
		6.7.2023	7,0	86	40	160	1100	510	12 000	7,0
		17.8.2023	6,9	72	41	140	1500	560	11 000	14
		14.3.2023	6,7	64	24	95	830	330	7 200	4,5
Pakkulanoja alapuoli Pa0 (Hourunnevan ap)	65445	8.6.2023	7,0	86	26	80	630	300	5 100	7,4
		6.7.2023	6,7	83	37	120	640	410	7 800	5,0
		17.8.2023	7,0	75	35	140	970	520	11 000	13
Selkämaanoja yläp Se18 (Hourunnevan ap)	65446									ei näytteitä

Kuvassa 5-4 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Hourunnevan ylä- ja alapuolisissa pisteissä sekä Hourunnevan pintavalutuskentältä 1 lähtevässä vedessä. Näytteet on otettu samana päivinä edellä esitetyn vesistötarkkailun näytteenoton mukaisesti.

Koska suon yläpuolisen pisteen Pa1 vedenlaatu oli keskimäärin alapuolista pistettä Pa0 heikompaa, Hourunnevan turvetuotantoalueen ei tutkituilta osin havaittu heikentävän sen alapuolisen vesistön vedenlaatua.



Kuva 5-4 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Hourunnevan pintavalutuskentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Pakkulanajassa Hourunnevan yläpuolella (Pa1) ja Hourunnevan alapuolella (Pa0) vuonna 2023.

5.3 Huhanneva

5.3.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Huhannevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 11 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 110,5 ha ja tuotannosta poistuneita alueita 1 ha. Reuna- ja kokoojaojat puhdistettiin helmi- ja syyskuussa, ja sarkaojarakenteet puhdistettiin touko- ja syyskuussa. Lisäksi tuotantoalueen vesiensuojelurakenteiden tarkastuksia tehtiin touko-syyskuussa. Tuotantoaika oli 12.6.–12.8. välillä.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 10.1.–11.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 21, joista jokaisena saatiin näyte otettua. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-7.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaistyyppipitoisuus oli lähes samalla tasolla kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä noin puolet esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosforipitoisuus oli pienempi kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista noin neljäsosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. COD_{Mn}-pitoisuus oli hieman korkeammalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin. Kiintoainepitoisuus oli alhaisempi kuin vertailukohteilla keskimäärin. Lisäksi kiintoainepitoisuus alitti selvästi lupamääräyksessä annetun kiintoaineen vuosikeskiarvon (9 mg/l) lähtevässä vedessä. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 2 541 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Huhannevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus 26.5.–1.11. välisenä aikana. Muulloin virtaamat arvioitiin Tahkonevan pvk 2:n valuman avulla. Näytteenottopäivänä 21.6. virtaama oli todella vähäinen, ja tämän takia vedenlaatatulokset eivät ole täysin luotettavia. Huhannevan kesän keskivaluma (19 l/s km²) oli selvästi suurempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-7.

Taulukko 5-7 Huhannevan pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	SO ₄ mg/l
Pvk1	Talvi	1.1. - 9.4.	99	4,9	3	6,1	26	19	873	2,5	0,6
Pvk1	Kevät	10.4. - 12.5.	33	79	4	6,2	20	15	900	1,9	0,8
Pvk1	Kesä	13.5. - 14.9.	125	19	8	6,2	42	19	1144	2,8	1,0
Pvk1	Alkusyky	15.9. - 31.10.	47	35	4	6,1	31	21	1508	3,0	1,1
Pvk1	Loppusyky	1.11. - 31.12.	61	3	2	6,3	26	20	1175	3,7	1,5
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	20	21	6,2	32	19	1131	2,7	1,0
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:illä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3	

* Oma virtaamamittaus 26.5.-1.11. Muuna aikana virtaama arvioitu Tahkonevan pvk2:n valuman avulla.

Huhannevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Fosforin ja kiintoaineen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo hyvä (Taulukko 5-8). Typen osalta kentälle

saapuneen veden pitoisuus vaihteli, ollen keväällä ja alkukesällä alhaisin. Typen keskimääräinen ainepoistuma jäi keskinkertaiseksi. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin negatiivinen, mutta myös tältä osin kentälle saapuneen veden pitoisuudet olivat turvetuotantoalueelle tyypillisellä tasolla (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-8 Huhannevan pintavalutuskentän ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	Näyte-määrä	COD_{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	3	15	82	62	92
Pvk1	Kevät	2	24	62	38	84
Pvk1	Kesä	3		74	25	88
Pvk1	Alkusyksy	2		68	52	89,5
Pvk1	Loppusyksy	2	22	66	48	66
Pvk1	Vuosi	12	-4	74	46	88


Huhannevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-9. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat typen ja fosforin osalta pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvojen (Taulukko 4-4) kanssa melko samalla tasolla, COD_{Mn} osalta vertailukohteita korkeammat ja kiintoaineen osalta vertailukohteita pienemmät. Kokonaiskuormitus oli COD_{Mn} ja typen osalta edellisvuotta korkeampi, ja kiintoaineen ja fosforin osalta alhaisempi.

Taulukko 5-9 Huhannevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	COD_{Mn} g/ha/d	Kok.P g/ha/d	Kok.N g/ha/d	Kiintoaine g/ha/d
Pvk1	Talvi	95	0,1	3,3	9,1
Pvk1	Kevät	1 052	0,9	48	142
Pvk1	Kesä	584	0,3	20,7	37
Pvk1	Alkusyksy	852	0,6	43	83
Pvk1	Loppusyksy	60	0,0	2,8	9
Pvk1	Vuosi	441	0,3	18,3	40
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.073	111,5	17 932	12	750	1 633
Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022		12 004	21	459	2 540

5.3.2 Vesistötarkkailu

Huhannevalta vedet laskevat reittiä Köyryoja–Savaloja–Kurunkanava–Siikajoki. Huhannevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Huhannevan yläpuolisella tarkkailupisteellä Köyryoja yp (Kö yp) sekä Huhannevan alapuolisilla pisteillä Köyryoja ap (Kö ap) ja Savaloja, Näsälänperä (Sa29). Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 5-5.



Kuva 5-5 Huhannevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 13.3., 8.6., 6.7. ja 17.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-10 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat lievästi reheviä/reheviä olosuhteita ja pitoisuudet olivat korkeimmillaan heinä- ja elokuun näytekierroksilla. Veden väri ja kemiallinen hapenkulutus (COD_{Mn}) indikoivat runsashumuksista vettä jokaisella näytekierroksella. Vesi oli hapanta/lievästi hapanta ja happipitoisuudet vaihtelivat välillä välttävä–erinomainen happitilanteen ollessa jokaisella pisteellä huonoin maaliskuussa. Rautapitoisuudet olivat korkeita lähes joka näytekierroksella, ja korkeimpia pitoisuuksia mitattiin maaliskuu- ja elokuun näytekierroksella. Kiintoainepitoisuudet olivat koholla jokaisella näytepisteellä pitoisuuksien ollessa suurimmillaan heinä- ja elokuun näytekierroksella. Vedenlaatu oli tutkituilta osin selvästi parasta Huhannevan yläpuolisella pisteellä Kö yp.

Köyryoja sekä Savaloja kuuluvat Savalojan vesimuodostumaan, joka on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt), joten vesistötarkkailupisteiden kokonaisravinnepitoisuuksien keskiarvoja ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Tutkituilta osin keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat hyvää tilaa (20–40 $\mu\text{g/l}$) Huhannevan yläpuolisella pisteellä Kö yp (33 $\mu\text{g/l}$) ja tyydyttävää tilaa (40–60 $\mu\text{g/l}$) Huhannevan alapuolisilla pisteillä Kö ap (46 $\mu\text{g/l}$) ja Sa29 (56 $\mu\text{g/l}$). Keskimääräiset kokonaistyyppipitoisuudet indikoivat hyvää tilaa (450–900 $\mu\text{g/l}$) jokaisella vesistötarkkailupisteellä. pH-minimit indikoivat erinomaista tilaa ($\text{pH} > 5,7$) jokaisella vesistötarkkailupisteellä.

Taulukko 5-10 Huhannevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.


Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Köyryoja yp Kö yp (Huhannevan yp)	87817	13.3.2023	6,0	67	45	27	450	360	4 800	4,4
		8.6.2023	6,2	88	23	16	400	170	1 700	4,0
		6.7.2023	6,4	92	31	51	510	260	4 300	13,0
		17.8.2023	5,8	73	52	39	710	440	5 800	17,0
Köyryoja ap Kö ap (Huhannevan ap)	87818	13.3.2023	6,5	56	18	45	530	370	8 400	7,2
		8.6.2023	6,7	89	21	32	560	220	3 800	6,4
		6.7.2023	5,9	71	42	50	900	310	3 500	10,0
		17.8.2023	6,7	74	48	57	950	490	8 200	17
Savaloja, Näsälänperä Sa29 (Huhannevan ap)	28070	13.3.2023	6,5	51	26	54	620	360	8 300	5,6
		8.6.2023	6,8	83	26	38	640	250	4 600	7,6
		6.7.2023	6,0	72	44	61	1100	320	3 700	13,0
		17.8.2023	6,7	68	44	70	1100	510	9 400	17

Kuvassa 5-6 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Huhannevalta lähtevässä vedessä sekä suon ylä- ja alapuolisissa tarkkailupisteissä. Vesistötarkkailun näytteet on otettu edellä esitetyn vesistönäytteenoton aikataulun mukaisesti. Päästötarkkailunäytteet on otettu samoina päivinä vesistötarkkailunäytteiden kanssa.

Huhannevan pintavalutuskentältä lähtevän veden kokonaistyyppipitoisuudet olivat koholla erityisesti heinä- ja elokuun näytteenottokierroksilla, verrattuna vesistötarkkailupisteiden pitoisuuksiin. Myös COD_{Mn}-pitoisuus oli selvästi vesistötarkkailupisteitä korkeampi elokuussa. Muuten pintavalutuskentältä lähtevän veden laatu oli joko lähes samalla tasolla suon yläpuolisen pisteen (Kö yp) kanssa, tai sitä parempaa.

Huhannevan yläpuolisen vedenlaatupisteen (Kö yp) vedenlaatu oli etenkin kokonaisravinnepitoisuuksien osalta jokaisella näytekierroksella parempaa kuin

Huhannevan alapuolisella pisteellä (Kö ap). Erot voivat johtua ainakin osittain Huhannevan turvetuotantoalueen kuormituksesta.



Kuva 5-6 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Huhannevan pintavalutus-kentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Huhannevan yläpuolisella vedenlaatupisteellä Kö yp ja alapuolisilla pisteillä Kö ap ja Sa29 vuonna 2023.

5.4 Huhtineva

5.4.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Huhtinevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrsin- ja kuiviketurvetta 20 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 61,6 ha ja tuotannosta poistuneita alueita 15,2 ha. Laskeutusaltaat puhdistettiin syyskuussa, ja sarkaojarakenteet puhdistettiin kesä-heinä- ja syyskuussa. Reuna- ja kokoojaojia kaivettiin tammi-huhtikuussa sekä joulukuussa. Vesiensuojelurakenteiden tarkastuksia tehtiin heinä-syyskuussa. Tuotantoa oli 6.6.–15.9. välisenä aikana.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 11.1.–13.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 22, joista neljänä kertana ei saatu otettua näytettä vähäisen virtaaman takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-11.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin hapanta. Kokonaistyyppipitoisuus oli alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä pieni osuus esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat hieman matalampia kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista noin kolmasosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. COD_{Mn}-pitoisuus oli lähes samalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 874 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Huhtinevan ympäristöluvassa on määrätty seuraavat pitoisuusrajat: kiintoaine 7 mg/l, kokonaisfosfori 130 µg/l ja kokonaistyyppi 1500 µg/l. Lupamääräykset täyttyivät kaikilta osin.

Huhtinevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus 25.5.–30.10. Muulloin virtaama on arvioitu Pullinnevan valuman avulla. Jaksoilla 10.–27.6. ei ollut virtaamaa. Huhtinevan kesän keskivaluma (8 l/s km²) oli hieman pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-11.

Taulukko 5-11 Huhtinevan pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m	SO4 mg/l
Pvk1	Talvi	1.1. - 9.4.	99	4,5	1	6,7	29	23	640	1,0	16,0	43,0
Pvk1	Kevät	10.4. - 24.5.	45	42	5	5,8	18	28	710	2,6	9,7	29,0
Pvk1	Kesä	25.5. - 14.9.	113	8	6	6,1	27	35	630	2,0	16,2	39,0
Pvk1	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	117	5	5,8	31	28	950	2,0	16,5	70,0
Pvk1	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	2	1	6,6	47	44	1100	2,3	14,0	30,0
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	24	18	5,9	27	30,9	767,8	2,1	14,3	43,1
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:llä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3		

* Oma virtaamamittaus 25.5.-30.10., muulloin virtaama arvioitu Pullinnevan valuman avulla.

Huhtinevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Fosforin ja raudan osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo hyvä (Taulukko 5-12). Kiintoaineen osalta kentän puhdistusteho oli keskimäärin todella hyvä. Typen osalta keskimääräinen ainepoistuma jäi kohtalaiseksi. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin todella matala, johon vaikutti selvästi negatiiviset puhdistustehot talvella ja loppusyksyllä. Kemiallisen hapenkulutuksen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuudet olivat turvetuotantoalueelle tyypillisellä tasolla (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-12 Huhtinevan pintavalutuskentän ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD_{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk	Talvi	1	-45	88	30	100
Pvk	Kevät	2	21	42	44	68
Pvk	Kesä	3	30	67	37	86
Pvk	Alkusyksy	2	22	50	41	86,6
Pvk	Loppusyksy	1	-104	60	-11	77
Pvk	Vuosi	9	10	66	35	94


Huhtinevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa Taulukko 5-13. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat fosforin ja typen osalta pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvojen (Taulukko 4-4) kanssa samalla tasolla, ja kiintoaineen osalta vertailukohteita pienemmällä sekä kemiallisen hapenkulutuksen osalta vertailukohteita suuremmalla tasolla. Kokonaiskuormitus oli kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta edellisvuotta matalampi, typen osalta samalla tasolla ja COD_{Mn} osalta edellisvuotta korkeampi.

Taulukko 5-13 Huhtinevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Talvi	113	0,1	2,5	3,9
Pvk1	Kevät	615	1,1	26	131
Pvk1	Kesä	179	0,2	4,3	10
Pvk1	Alkusyksy	3 101	2,7	92	161
Pvk1	Loppusyksy	16	0,0	0,4	1
Pvk1	Vuosi	564	0,6	17,1	41
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.018	76,8	15 806	16	480	1 154
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>12 607</i>	<i>22</i>	<i>482</i>	<i>2 668</i>

5.4.2 Vesistötarkkailu

Huhtinevan vedet johdetaan pintavalutuskentältä laskuojan kautta Pesuanojaan ja siitä Siikajokeen. Huhtinevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Pesuanojassa Huhtinevan laskuojan yläpuolisella tarkkailupisteellä Pesuanoja Hu yp, sekä Huhtinevan alapuolisilla tarkkailupisteillä Pesuanoja Hu ap ja Siikajoki 86-tien silta Si40. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-7.



Kuva 5-7 Huhtinevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin Pesuanojan tarkkailupisteiltä vuonna 2023 16.3., 5.6., 3.7. ja 14.8. Pesuanoja Hu yp -pisteeltä ei saatu näytettä maaliskuussa vähäisen vesimäärän vuoksi. Siikajoen pisteeltä (Si40) näytteet haettiin 16.3., 6.6., 4.7. ja 15.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-14 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Pesuanojan havaintopisteiden vedenlaatu oli joko samankaltaista tai vedenlaatu oli huonompaa Huhtinevan yläpuolisella pisteellä (Hu yp). Yläpuoliselta pisteeltä ei saatu näytettä maaliskuussa, mutta Huhtinevan alapuolisen pisteen (Hu ap) vedenlaathavaintojen perusteella voidaan olettaa, että veden laatu oli heikoimmillaan molemmilla pisteillä maaliskuun ja elokuun havaintokierroksilla. Vesi oli Pesuanojassa rehevää/erittäin rehevää, erittäin tummaa ja humuspitoista (väriluku

ja COD_{Mn}) ja runsaasti kiintoainesta sisältävää. Rautapitoisuudet olivat suuria, ja vesi oli lievästi hapanta tai neutraalin tuntumassa. Veden happipitoisuus vaihteli suuresti, ollen huono Pesuanojan alapuolisella pisteellä maaliskuussa ja muutoin välillä tyydyttävä–hyvä.

Siikajoen havaintopisteen (Si40) vedenlaatu oli Pesuanojan pisteitä selvästi parempaa. Veden happipitoisuus vaihteli välillä välttävä–erinomainen, ja veden kiintoainepitoisuudet olivat hieman koholla. Siikajoen maaliskuun kokonaisfosforipitoisuus oli korkea, indikoiden erittäin reheviä olosuhteita. Muuten kokonaisravinnepitoisuudet olivat rehevällä tasolla. Vesi oli erittäin tummaa, runsaasti orgaanista ainesta sisältävää ja rautapitoista, pitoisuuksien ollessa kuitenkin selvästi Pesuanojaa matalampia. Vesi oli joko lievästi hapanta tai neutraalin tuntumassa.

Siikajoen havaintopiste Si40 sijaitsee Siikajoen alaosan vesimuodostumassa, joka on tyypitelty suureksi turvemaiden joeksi (St). Havaintopisteen kokonaisravinnepitoisuuksien keskiarvoja ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Tutkituilta osin keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (110 µg/l) indikoi huonoa tilaa (>90 µg/l). Tämä johtuu havaintopisteen maaliskuun näytekierroksen suuresta pitoisuudesta (Taulukko 5-14). Keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (693 µg/l) indikoi hyvää tilaa (450–900 µg/l) ja pH-minimi (6,6) erinomaista tilaa (pH >5,7).


Pesuanojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.

Taulukko 5-14 Huhtinevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
		16.3.2023								ei näytettä
Pesuanaja Hu yp (Huhtinevan yp)	69083	5.6.2023	6,9	81	46	110	1100	450	5 700	17,0
		3.7.2023	7,0	51	64	320	1800	880	15 000	28,0
		14.8.2023	6,7	54	65	250	2000	810	11 000	26,0
		16.3.2023	6,3	11	50	240	1400	680	13 000	18,0
Pesuanaja Hu ap (Huhtinevan ap)	27863	5.6.2023	6,9	83	43	110	1000	410	5 500	15,0
		3.7.2023	6,9	62	48	220	1400	590	9 500	13,0
		14.8.2023	6,7	57	58	200	1700	680	10 000	19
		16.3.2023	6,6	69	21	280	660	220	4 100	4,0
Siikajoki 86-tien silta Si40 (Huhtinevan ap)	27862	6.6.2023	7,1	88	23	39	690	180	2 100	3,6
		4.7.2023	7,0	77	22	54	660	190	3 200	3,4
		15.8.2023	6,6	77	31	65	760	260	4 000	8

Kuvassa 5-8 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Huhtinevalta lähtevässä vedessä sekä suon ylä- ja alapuolisissa tarkkailupisteissä. Vesistötarkkailun näytteet on otettu edellä esitetyn vesistönäytteenoton aikataulun mukaisesti. Päästötarkkailunäytteet on otettu samoina päivinä Pesuanojan vesistötarkkailunäytteiden kanssa. Siikajoen tarkkailunäytteet on haettu yhtä päivää myöhemmin jokaisella tarkkailukierroksella.

Huhtinevan pintavalutuskentältä lähtevän veden kokonaisravinne-, kiintoaine- ja COD_{Mn}-pitoisuudet olivat selvästi pienempiä kuin Huhtinevan ylä- ja alapuolisilla havaintopisteillä Pesuanojassa. Pesuanojan Huhtinevan yläpuolella sijaitsevan havaintopisteen vedenlaatu oli jopa Huhtinevan alapuolista pistettä heikompaa. Tästä syystä Huhtinevan turvetuotantoalueen ei tutkituilta osin havaittu heikentävän sen alapuolisen vesistön vedenlaatua.



Kuva 5-8 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Huhtinevan pintavalutus-kentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Huhtinevan yläpuolisella vedenlaatupisteellä Hu yp ja alapuoli-silla pisteillä Hu ap ja Si40 vuonna 2023.

5.5 Jousineva

5.5.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Jousinevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 46 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 56 ha, kuntoonpanossa 18,8 ha ja tuotannosta poistuneita alueita 19 ha. Laskeutusaltaat puhdistettiin touko- ja lokakuussa, ja sarkaojille sekä reu-naojille tehtiin kunnossapitotöitä tammi-toukokuussa. Lisäksi tuotantoalueella teh-tiin sammalen ajoa ja muita sammaleeseen liittyviä töitä tammikuulta syyskuulle. Sadesumma 26.1.–28.8. välisenä aikana oli 159 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 11.1.–4.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 2–3. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 20,

joista yhtenä kertana ei saatu otettua näytettä hankalan kelin takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-15.

Pintavalutus Kentän 2–3 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaistyyppipitoisuus oli alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutus kenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä keskimäärin noin 60 % esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuus oli suurempia kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista lähes 80 % esiintyi epäorgaanisessa muodossa. COD_{Mn}-pitoisuus oli lähes samalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 5 060 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Jousinevan ympäristölupapäätöksen mukaan pintavalutus kentillä 2 ja 3 on saavutettava yhteenlaskettuna vuosikeskiarvona ilmaistuna enintään seuraavat pitoisuudet: kiintoaine 7 mg/l, ja tavoitteellisena arvona kokonaisfosfori 50 µg/l sekä kokonaistyyppi 1 400 µg/l. Kiintoaineen vuosikeskiarvoa ei saavutettu, vaan se ylittyi hieman, ollen 8,2 mg/l. Lupamääräyksen mukaan joko pitoisuusrajan tai reduktiovaatimuksen tulee täytyä. Tavoitteellisista arvoista kokonaistypen tavoitepitoisuus saavutettiin, mutta kokonaisfosforin tavoitepitoisuus ylittyi.

Jousinevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympärivuotisesti. Jaksoilla 1.–4.1., 24.–25.11. ja 27.–31.12. omassa virtaamamittauksessa on ollut katkos, ja korvaavat virtaamatiedot on haettu vesistömallijärjestelmästä. Jousineva kesän keskivaluma (20 l/s km²) oli selvästi suurempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-15.

Taulukko 5-15 Jousinevan pvk2-3 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m	SO4 mg/l
Pvk2-3	Talvi	1.1. - 9.4.	99	12,1	3	6,4	29	79	1600	5,9	8	2
Pvk2-3	Kevät	10.4. - 26.5.	47	53	4	6,2	22	53	1145	5,7		6
Pvk2-3	Kesä	27.5. - 14.9.	111	20	7	6,5	44	93	1236	13,3		3
Pvk2-3	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	36	2	6,3	26	57	1500	3,4		15
Pvk2-3	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	9	3	6,2	19	67	1833	5,6	7	6
Pvk2-3	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	22	19	6,3	31	74,3	1396,3	8,2	7	5
Keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pvk:llä 2011-2015							34	56	1 610	5,4		

* SYKE:n vesistömalli (WSFS) 1.1.-4.1., 24.-25.11. ja 27.-31.12.

Jousinevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Kiintoaineen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo hyvä (Taulukko 5-18). Kokonaisfosforin ja raudan osalta kentän puhdistusteho oli keskinkertainen. Typen osalta keskimääräinen ainepoistuma jäi kohtalaiseksi. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin todella matala, johon vaikutti selvästi negatiiviset puhdistustehot kesällä ja alkusyksyllä. Kemiallisen hapenkulutuksen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuudet olivat turvetuotantoalueelle tyypillisellä tasolla (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-16 Jousinevan pintavalutuskentän ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk2	Talvi	3	9	55	21	88
Pvk2	Kevät	1	24	59	37	84
Pvk2	Kesä	3	-19	42	41	49
Pvk2	Alkusyksy	1	-8	66	41	87
Pvk2	Loppusyksy	2	31	53	14	75
Pvk2	Vuosi	10	3	53	29	78

Jousinevan ympäristölupapäätöksen mukaan pintavalutuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot: kiintoaineella ja kokonaisfosforilla 50 % ja kokonaistypellä 20 %. Kokonaisravinteiden tehon vuosikeskiarvot ovat tavoitteellisia. Kaikkien kolmen aineen osalta kenttä ylsi lupavaateisiin reduktion osalta.


Jousinevan pintavalutuskentän 2–3 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-17. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat typen, fosforin, COD_{Mn} ja kiintoaineen osalta pohjoisessa sijaitsevien ojitettamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) korkeammat. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin selvästi edellisvuotta korkeampi.

Taulukko 5-17 Jousinevan pintavalutuskenttä 2–3:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk2-3	Talvi	296	0,8	16,4	60,0
Pvk2-3	Kevät	871	2,4	55	348
Pvk2-3	Kesä	740	1,6	22,5	213
Pvk2-3	Alkusyksy	786	1,5	46	91
Pvk2-3	Loppusyksy	124	0,5	14,3	36
Pvk2-3	Vuosi	540	1,3	26,6	144
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.027	93,8	18 468	44	903	4 916
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>5 570</i>	<i>12</i>	<i>375</i>	<i>849</i>

5.5.2 Vesistötarkkailu

Jousinevan vedet johdetaan Jousiojan kautta Siikajokeen. Jousinevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Jousinevan alapuolisilla tarkkailupisteillä Jousioja J Jo0 ja Siikajoki Niskakosken yp Si101. Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 5-9.



Kuva 5-9 Jousinevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainti.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 14.4., 6.6. (Jousioja), 7.6. (Siikajoki), 4.7. ja 16.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-18 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Jousinevan alapuolisella pisteellä J Jo0 Jousiojassa veden happamuus vaihteli välillä 6,2–7 ja happipitoisuus välillä välttävä–erinomainen. Happitilanne oli heikoin maaliskuun näytteenoton aikaan. Jousiojan vesi indikoi kokonaisravinnepitoisuuksien perusteella reheviä/erittäin reheviä olosuhteita, ja rautapitoisuudet olivat korkeita. Vesi oli erittäin tummaa, runsaasti orgaanista ainesta sisältävää ja kiintoainepitoista.

Siikajoessa Niskakosken yp Si101 -havaintopisteellä vedenlaatu oli parempaa kuin Jousiojassa. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita, ja vesi oli hapanta/lievästi hapanta. Siikajoen vesi oli niin ikään hyvin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Rautaa oli vedessä paljon, vaikkakin pitoisuudet olivat selvästi Jousiojan pistettä matalampia. Veden happipitoisuus vaihteli välillä välttävä–hyvä. Fosfaattifosforin osuus kokonaisfosforipitoisuudesta vaihteli välillä 37–90 % ollen suurimmillaan maaliskuun näytteenoton aikaan. Vedenlaatu oli molemmilla vesistötarkkailupisteillä heikointa elokuun tarkkailukierroksella.

Niskakosken yp Si101 -piste sijaitsee Siikajoen keskiosan vesimuodostumassa, joka on tyypitelty suureksi turvemaiden joeksi (St). Havaintopisteen kokonaisravinnepitoisuuksien keskiarvoja ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (68 µg/l) indikoi havaintopisteellä välttävää tilaa (60–90 µg/l), ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (718 µg/l) hyvää tilaa (450–900 µg/l). Havaintopisteen pH-minimi oli 6,3 joka indikoi erinomaista tilaa (>5,7).

Jousiojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.


Taulukko 5-18 Jousinevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Jousioja J Jo0 (Jousinevan ap)	27920	14.3.2023	6,7	55	27	130	1100	380	9 900	9,6
		6.6.2023	7,0	96	32	85	630	310	5 000	10,0
		4.7.2023	6,2	72	41	82	830	390	5 200	16,0
		16.8.2023	6,8	80	63	170	1300	760	13 000	34,0
Siikajoki Niskakosken yp Si101 (Jousinevan ap)	41549	14.3.2023	6,6	69	22	71	600	230	4 600	4,0
		7.6.2023	6,6	84	28	51	590	220	2 400	4,0
		4.7.2023	6,4	63	32	70	720	300	4 400	6,4
		16.8.2023	6,3	61	45	79	960	390	4 900	12

Kuvassa 5-10 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Jousinevan alapuolissa pisteissä sekä Jousinevan pintavalutuskentiltä 2–3 lähtevässä vedessä.

Näytteet on otettu samoina päivinä edellä esitetyn vesistötarkkailun näytteenoton mukaisesti, lukuun ottamatta havaintopisteen Si101 kesäkuun näytettä, joka on otettu muita havaintopisteitä päivää myöhemmin.

Tarkkailussa ei ole mukana suoalueen yläpuolista pistettä, joten turvetuotantoalueen vaikutusta alapuoliseen vesistöön on vaikea arvioida.



Kuva 5-10 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Jousinevan pintavalutus-kentiltä 2-3 lähtenessä vedessä sekä Jousinevan alapuolisilla pisteillä Jo0 ja Si101.

5.6 Jylenneva

5.6.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Jylennevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrsturvetta 35 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 70,8 ha ja tuotannosta poistuneita alueita 1,1 ha. Laskeutusaltaat puhdistettiin maalis- ja syyskuussa, sarkaojarakenteet puhdistettiin touko- ja syyskuussa sekä virtaamansäätöpatoja puhdistettiin syyskuussa. Tuotantoaikainen (7.6.–28.7.) sadanta oli 164 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua sulanmaan aikaan, 11.5.–31.10. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä

13, joista jokaisella kerralla näytteenotto onnistui. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-19.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaistyyppipitoisuus oli alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyydestä vain pieni osuus esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosfori-, COD_{Mn} - ja kiintoainepitoisuus oli korkeammalla tasolla kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista suurin osa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 9 467 $\mu\text{g/l}$. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Jylennevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus jaksolla 26.5–31.10. 1.–25.5. välisen ajan virtaama on arvioitu Pullinnevan valuman avulla. Jylennevan kesän keskivaluma (11 l/s km^2) oli suurempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km^2) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-19.

Taulukko 5-19 Jylennevan pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD_{Mn} mg/l	Kok.P $\mu\text{g/l}$	Kok.N $\mu\text{g/l}$	Kiintoaine mg/l
Pvk1	Kevät	1.5. - 24.5.	24	14	2	6,4	32	43	700	4,3
Pvk1	Kesä	25.5. - 14.9.	113	11	7	6,4	42	91	927	10,7
Pvk1	Alkusyky	15.9. - 31.10.	47	35	4	6,4	31	60	960	4,1
Pvk1	Tarkkailukausi	1.5. - 31.10.	184	18	13	6,4	37	74	902	7,7
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:illa 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3

* Virtaama arvioitu Pullinnevan valuman avulla 1.-25.5.

Jylennevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin koko tarkkailujakson ajan. Kokonaistyyppien osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion tarkkailukauden aikainen keskiarvo keskinkertainen (Taulukko 5-20). Kokonaisfosforin ja kiintoaineen osalta kentän puhdistusteho jäi heikoksi. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli negatiivinen (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-20 Jylennevan pintavalutuskentän ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Kevät	1	3,6	33	41	37
Pvk1	Kesä	3	-14	2	52	-24
Pvk1	Alkusyksy	1	18	48	52	42
Pvk1	1.5.-31.10.	5	-4	16	51	2


Jylennevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-21. Tarkkailuajan keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat typen osalta pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) alhaisemmat, ja muilta osin vertailukohteita korkeammat. Kokonaiskuormitus oli COD_{Mn}, kokonaisfosforin ja kiintoaineen osalta edellisvuotta korkeampia, ja typen osalta hieman alhaisempi.

Taulukko 5-21 Jylennevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
		g/ha/d			
Pvk1	Kevät	354	0,5	8	64
Pvk1	Kesä	411	0,7	9,0	91
Pvk1	Alkusyksy	936	1,5	29	127
Pvk1	Tarkkailukausi	537	0,9	13,9	96
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.068	71,9	9 010	18	269	1 763
Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022		7 740	13	296	1 638

5.6.2 Vesistötarkkailu

Jylennevan vedet johdetaan pintavalutuskentältä reittiä Ristisenoja–Lamujoki–Siikajoki. Jylennevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Ristisenojassa Jylennevan yläpuolisella tarkkailupisteellä Ristisenoja Siikalatva Ri yp sekä Jylennevan alapuolisilla pisteillä Ristisenoja Ri silta ja Ristisenoja Ri4 Ri8. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-11.



Kuva 5-11 Jylennevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytenäytteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 20.3., 8.6., 3.7., 5.7.(Ri4 Ri8), 16.8.(Ri4 Ri8) ja 17.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-22 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Ristisenojassa Jylennevan yläpuolisella havaintopisteellä (Ri yp) veden laatu oli heikointa maaliskuun näytteenoton aikaan. Jylennevan alapuolisilla havaintopisteillä erot eri tarkkailukierrosten välillä eivät olleet yhtä selkeitä. Vedenlaatu oli kuitenkin jokaisella havaintopisteellä parhaimmalla tasolla kesäkuun näytekierroksella. Keskimäärin veden laatu oli parasta Jylennevan yläpuolella ja heikointa Ristisenojan alimmalla pisteellä Ri4 Ri8. Jylennevan yläpuolisella pisteellä veden happitilanne oli kuitenkin keskimäärin huonoin. Vesi oli jokaisella havaintopisteellä erittäin tummaa

ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Rautapitoisuudet olivat korkeita, ja kiintoainepitoisuudet vaihtelivat ollen kuitenkin koholla lähes joka tarkkailukierroksella. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat Jylennevan yläpuolisella pisteellä lievästi reheviä/reheviä olosuhteita, ja alapuolisilla pisteillä reheviä/erittäin reheviä olosuhteita. Vesi oli selvästi happaminta Jylennevan yläpuolisella pisteellä (pH 5,9–6,0), kun turvetuotantoalueen alapuolisilla pisteillä se oli lievästi hapanta–neutraalin tuntumassa.


Ristisenoja on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt), joten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-arvoja verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Jylennevan yläpuolisen pisteen Ristisenoja Siikalatva Ri yp keskimääräiset kokonaisravinnepitoisuudet (kok.P 37 µg/l ja kok.N 585 µg/l) indikoivat hyvää tilaa (kok.P 20–40 µg/l ja kok.N 450–900 µg/l). Jylennevan alapuolisen pisteen Ristisenoja Ri silta keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (87 µg/l) indikoi välttävää tilaa (60–90 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (795 µg/l) hyvää tilaa. Niin ikään Jylennevan alapuolisen pisteen Ristisenoja Ri4 Ri8 keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (118 µg/l) indikoi huonoa tilaa (>90 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (859 µg/l) muiden Ristisenojan pisteiden tavoin hyvää tilaa. pH-minimi indikoi jokaisella Ristisenojan pisteellä erinomaista tilaa (>5,7).

Taulukko 5-22 Jylennevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Ristisenoja Siikalatva Ri yp (Jylennevan yp)	68017	20.3.2023	5,9	1	37	45	850	460	13 000	27,0
		8.6.2023	6,0	64	21	27	450	160	2 300	5,2
		3.7.2023	6,0	54	23	44	510	260	5 500	7,2
		17.8.2023	6,2	44	22	32	530	250	5 600	16,0
Ristisenoja Ri silta (Jylennevan ap)	68091	20.3.2023	6,5	57	34	68	890	350	5 900	7,2
		8.6.2023	6,7	85	32	50	590	250	2 300	4,0
		3.7.2023	7,0	92	35	110	870	360	5 300	10,0
		17.8.2023	6,8	68	49	120	830	470	5 900	15
Ristisenoja Ri4 Ri8 (Jylennevan ap)	50263	20.3.2023	6,9	67	19	120	890	280	6 600	8,0
		8.6.2023	7,1	82	29	71	630	270	3 700	6,8
		5.7.2023	7,2	87	29	140	880	370	8 300	9,2
		16.8.2023	7,1	71	42	140	1000	480	7 400	14

Kuvassa 5-12 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Ristisenojassa Jylennevan yläpuolella (Ri yp) ja alapuolella (Ri silta ja Ri4 Ri8) sekä Jylennevan pinta-
valutuskentältä 1 lähteneessä vedessä. Näytteet on otettu samoina päivinä edellä
esitetyn vesistötarkkailun näytteenoton mukaisesti, lukuun ottamatta pistettä Ri4
Ri8, jonka heinäkuun näyte otettiin kaksi päivää muiden pisteiden näytteiden jäl-
keen ja elokuun näyte yhtä päivää muiden pisteiden näytteitä aikaisemmin.

Vedenlaatu oli havaintopisteistä keskimäärin parasta Jylennevan yläpuolisella pis-
teellä. Turvetuotantoalueen vaikutusta sen alapuoliseen Ristisenojaan on kuitenkin
tutkituilta osin vaikea arvioida, sillä alue on voimakkaasti ojitettua ja alapuoliset
pisteet sijaitsevat turvetuotantoalueesta useita kilometrejä alavirtaan.



Kuva 5-12 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Ristisenojassa Jylennevan yläpuolella (Ri yp) ja alapuolella (Ri silta, Ri4 Ri8) sekä Jylennevan pinta-
valutuskentältä (pvk1) lähteneessä vedessä vuonna 2023.

5.7 Järvineva

5.7.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Järvinevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrsin- ja kuiviketurvetta 15 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 53,3 ha ja tuotannosta poistuneita alueita 4,1 ha. Laskeutusaltaat puhdistettiin lokakuussa, ja sarkaojarakenteet puhdistettiin elo- ja lokakuussa. Tuotantoaikainen (6.6.–26.6.) sadanta oli 11,8 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 11.1.–13.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 21, joista jokaisella kerralla saatiin otettua näyte. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-23.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin hapanta. Kokonaisravinne-, kiintoaine- ja COD_{Mn}-pitoisuudet olivat korkeampia kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Vuoden 2023 keskimääräinen sähkönjohtavuus oli 16 mS/m. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Järvinevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympärivuotisesti. Järvinevan kesän keskivaluma (7 l/s km²) oli pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-23.

Taulukko 5-23 Järvinevan pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m
Pvk1	Talvi	1.1. - 7.4.	97	8,6	3	6,6	42	207	2333	5,4	20,0
Pvk1	Kevät	8.4. - 18.5.	41	71	4	5,5	29	68	1295	3,1	6,7
Pvk1	Kesä	19.5. - 14.9.	119	7	8	6,5	60	179	1875	7,8	18,0
Pvk1	Alkusyky	15.9. - 31.10.	47	82	4	6,0	71	140	2650	6,2	13,0
Pvk1	Loppusyky	1.11. - 31.12.	61	4	2	6,9	34	215	2500	6,2	29,0
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	24	21	6,0	51	158,0	2037,0	6,1	16,0
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:illä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3	

Järvinevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Kaikkien aineiden osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli keskimäärin melko samalla

tasolla kuin lähteneen veden pitoisuudet (Liite 2). Kokonaisravinteiden ja kiintoaineen reduktioiden vuosikeskiarvo oli tyydyttävällä tasolla, ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli negatiivinen (Taulukko 5-24).

Taulukko 5-24 Järvinevan pintavalutuskentän ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	Näyte-määrä	COD_{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	3	-26	26	14	33
Pvk1	Kevät	2	3,6	31	4	48
Pvk1	Kesä	3	-2	29	19	38
Pvk1	Alkusyksy	2	5	-15	13	-62
Pvk1	Loppusyksy	2	-18	20	12	41
Pvk1	Vuosi	12	-5	24	13	28

Järvinevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-25. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat COD_{Mn} , kiintoaineen, fosforin ja typen osalta pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) korkeammat. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin edellisvuotta korkeampi.

Taulukko 5-25 Järvinevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	COD_{Mn} g/ha/d	Kok.P g/ha/d	Kok.N g/ha/d	Kiintoaine g/ha/d
Pvk1	Talvi	309	1,5	19,0	38,0
Pvk1	Kevät	1 709	3,1	73	216
Pvk1	Kesä	410	0,9	12,0	42
Pvk1	Alkusyksy	5 094	6,5	167	385
Pvk1	Loppusyksy	104	0,7	8,1	19
Pvk1	Vuosi	1 081	2,0	40,0	101
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.013	57,4	26 196	51	974	2 494
Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022		6 179	11	236	1 308

5.7.2 Vesistötarkkailu

Järvinevan vedet johdetaan pintavalutuskentältä 1 laskuojan kautta Siikajokeen. Järvinevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Järvinevan alapuolisilla pisteillä Järvinevan laskuoja JäLo sekä Siikajoki 86-tien silta Si40. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-13.



Kuva 5-13 Järvinevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytenäytteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 16.3., 6.6., 4.7. ja 15.8. Järvinevan laskuojan pisteeltä JäLo ei saatu näytettä maaliskuussa. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-23 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Järvinevan laskuojassa JäLo vesi oli erittäin tummaa, ravinteikasta ja paljon orgaanista ainesta sisältävää. Veden happitilanne oli huono jokaisella

tarkkailukierroksella. Ravinnepitoisuudet indikoivat erittäin reheviä olosuhteita, ja pitoisuudet olivat korkeimmillaan heinäkuun tarkkailukierroksella. Veden väriluku ja COD_{Mn}-arvo olivat korkeimmillaan elokuussa ja rautapitoisuudet olivat korkeita. Kiintoainepitoisuudet olivat korkeimmillaan heinä- ja elokuussa.

Siikajoen tarkkailupisteellä Si40 vedenlaatu oli laskuojan pistettä parempaa, ja happipitoisuus vaihteli välillä välttävä–erinomainen. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita lukuun ottamatta maaliskuun tarkkailukierrosta, jonka kokonaisfosforipitoisuus indikoi erittäin reheviä olosuhteita. Vesi oli tummaa, runsaasti orgaanista ainesta sisältävää ja rautapitoista, vaikka pitoisuudet olivat selvästi pistettä JäLo matalampia. Vesi oli molemmilla vesistötarkkailupisteillä lievästi hapanta/neutraalin tuntumassa.

Siikajoen tarkkailupiste Si40 sijaitsee Siikajoen alaosan vesimuodostumassa, joka on tyypitelty suureksi turvemaiden joeksi (St). Vesistötarkkailutulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (110 µg/l) indikoi huonoa tilaa (>90 µg/l) maaliskuun korkean pitoisuuden vuoksi. Keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (693 µg/l) indikoi hyvää tilaa (450–900 µg/l) ja pH-minimi (6,6) erinomaista tilaa (>5,7).


Järvinevan laskuojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.

Taulukko 5-26 Järvinevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailu-piste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Järvinevan laskuoja JäLo (Järvinevan ap)	68095	16.3.2023				ei näytettä				
		6.6.2023	6,9	52	41	150	1200	400	4 900	4,4
		4.7.2023	7,1	21	51	270	2300	630	9 700	16,0
		15.8.2023	6,7	13	75	330	1800	830	9 600	18
Siikajoki 86-tien silta Si40 (Järvinevan ap)	27862	16.3.2023	6,6	69	21	280	660	220	4 100	4,0
		6.6.2023	7,1	88	23	39	690	180	2 100	3,6
		4.7.2023	7,0	77	22	54	660	190	3 200	3,4
		15.8.2023	6,6	77	31	65	760	260	4 000	8

Kuvassa 5-14 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset turvetuotantoalueen alapuolisilla pisteillä laskuojassa (JäLo) sekä Siikajoessa (Si40). Näytteet on otettu samana päivänä edellä esitetyn vesistötarkkailun näytteenoton mukaisesti.

Tarkkailussa ei ole mukana suoalueen yläpuolista pistettä, joten turvetuotantoalueen vaikutusta alapuoliseen vesistöön on tutkituilta osin vaikea arvioida.



Kuva 5-14 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Järvinevan laskuojassa (JäLo) sekä Siikajoessa (Si40) Järvinevan alapuolella sekä Järvinevan pintavalutuskentältä 1 lähtevässä vedessä vuonna 2023.

5.8 Kivineva

5.8.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Kivinevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 39 päivänä. Tuotannosta poistuneita alueita vuoden 2023 jälkeen oli 113,3 ha. Tuotantoaika oli 10.6.–9.9. välisenä aikana. Tuotantoalueella tehtiin touko-lokakuussa eri kunnossapitotöitä, kuten

pumppualtaan, sarkaojien ja kokoojaojan puhdistuksia sekä alueen siivouksia. 26.1.–9.9. välisen ajan sadanta oli 305 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti 12.1.–11.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1 ja 2. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 21, joista kolmena (pvk1) / viitenä (pvk2) kertana ei saatu otettua näytettä vähäisen virtaaman takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukoissa 5-27 ja 5-28.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin hapanta. Kokonaistyyppipitoisuus oli melko samalla tasolla kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutus kenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä noin puolet esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosforipitoisuus oli matalampi kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista noin kolmasosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. COD_{Mn}- ja kiintoainepitoisuudet olivat korkeammalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 9 478 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Pintavalutuskentän 2 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaisravinne, kiintoaine- ja COD_{Mn}-pitoisuudet olivat matalammalla tasolla kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutus kenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä noin 40 % ja fosforista noin puolet esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 2 600 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kivinevan ympäristölupapäätöksen mukaan pintavalutus kentillä 1 ja 2 on saavutettava yhteenlaskettuna vuosikeskiarvona ilmaistuna enintään seuraavat pitoisuudet: kiintoaine 9 mg/l, kokonaisfosfori 50 µg/l sekä kokonaistyyppi 1 400 µg/l. Kiintoaineen vuosikeskiarvoa ei saavutettu pintavalutus kentällä 1, vaan se ylittyi hie-man, ollen 9,4 mg/l. Muilta osin lupamääräykset saavutettiin.

Kivinevan pvk 1:llä oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympärivuotisesti. Jaksoilla 1.–12.1., 21.2.–12.4. ja 10.–31.12. ei ollut virtaamaa. Kivinevan kesän keskivaluma (12 l/s km²) oli suurempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukoissa 5-27 ja 5-28.

Taulukko 5-27 Kivinevan pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m
Pvk1	Talvi	1.1. - 20.4.	110	3,7	2	5,8	28	36	1230	3,7	6
Pvk1	Kevät	21.4. - 20.5.	30	57	3	5,9	14	22	813	1,7	3
Pvk1	Kesä	21.5. - 14.9.	117	12	8	6,1	50	31	1098	10,9	6
Pvk1	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	34	4	5,9	40	27	1653	16,7	5
Pvk1	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	5	1	6,3	18	23	1200	2,4	4
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	15	18	6,0	37	28,7	1193,9	9,4	5
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:illä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3	

Taulukko 5-28 Kivinevan pvk2 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m
Pvk2	Talvi	1.1. - 20.4.	110	3,7	1	6,4	14	35	1700	4,0	4
Pvk2	Kevät	21.4. - 20.5.	30	57	3	6,3	13	31	1230	2,4	3
Pvk2	Kesä	21.5. - 14.9.	117	12	7	6,3	24	22	723	3,2	4
Pvk2	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	34	4	6,3	19	25	900	3,0	4
Pvk2	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	5	1	6,5	16	53	1300	10,0	5
Pvk2	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	15	16	6,3	19	27,0	959,0	3,5	4
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:illä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3	

*Virtaamatiedot 1.1.-20.2. SYKE:n WSFS vesistömallista ja 21.2. eteenpäin Kivinevan pvk1:ltä.

Kivinevan pintavalutuskentän 1 tehoa tarkkailtiin 25.4.2023 asti, ja jälkihoitovaiheeseen siirtymisen jälkeen tehon tarkkailu lopetettiin. Tehon tarkkailun tulokset kahdelta näytteenottokierrokselta on esitetty osittain taulukossa 5-29 ja kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kivinevan pintavalutuskentän 2 tehoa tarkkailtiin 25.4.–7.11. Kiintoaineen ja kokonaistypen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo oli typen osalta keskinkertainen ja kiintoaineen osalta hyvä (Taulukko 5-30). Kokonaisfosforin osalta kentän puhdistusteho oli lähellä keskinkertaista. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin negatiivinen, johon vaikutti selvästi negatiiviset puhdistustehot kesällä. Kemiallisen hapenkulutuksen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuudet olivat kuitenkin turvetuotantoalueelle tyypillisellä tasolla (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-29 Kivinevan pintavalutuskentän 1 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	1	29	43	19	90
Pvk1	Kevät	1	7,1	67	41	83
Pvk1	1.1.-25.4.	2	25	53	28	89

Taulukko 5-30 Kivinevan pintavalutuskentän 2 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk2	Kevät	2	17,0	22	8	74
Pvk2	Kesä	3	-19	61	59	83
Pvk2	Alkusyksy	2	13	57	65	78
Pvk2	Loppusyksy	1	-7	10	55	63
Pvk2	Vuosi	8	-1	46	52	76

Kivinevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-31. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat typen ja fosforin osalta pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) alhaisemmat, kemiallisen hapenkulutuksen osalta hieman korkeammat ja kiintoaineen osalta selvästi korkeammat. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin edellisvuotta korkeampi.

Kivinevan pintavalutuskentän 2 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-32. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat kaikilta osin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) alhaisemmat. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin edellisvuotta korkeampi.

Taulukko 5-31 Kivinevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Talvi	122	0,1	5,3	18,7
Pvk1	Kevät	690	1,1	40	86
Pvk1	Kesä	517	0,3	14,0	135
Pvk1	Alkusyksy	1 314	0,8	52	460
Pvk1	Loppusyksy	75	0,1	5,0	10
Pvk1	Vuosi	441	0,4	16,9	117
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.028	113	18 228	15	699	4 836
Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022		8 111	9	369	2 128

Taulukko 5-32 Kivinevan pintavalutuskenttä 2:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.


Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk2	Talvi	21	0,1	2,5	5,9
Pvk2	Kevät	778	2,0	75	153
Pvk2	Kesä	304	0,3	12,0	43
Pvk2	Alkusyksy	706	0,9	31	90
Pvk2	Loppusyksy	83	0,3	6,8	52
Pvk2	Vuosi	272	0,4	16,0	49
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.069	96	7 964	13	480	1 460
Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022		5 704	9	305	1 288

5.8.2 Vesistötarkkailu

Kivinevan vedet johdetaan pintavalutuskentältä 1 reittiä Myllyoja–Levanjärvi–Levanoja–Siikajoki ja pintavalutuskentältä 2 reittiä Naarastenoja–Lamujoki–Siikajoki.

Kivinevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti pintavalutuskentän 1 alapuolisessa Leuvanjärvessä tarkkailupisteellä Leuvanjärvi L1 Leu ja sen alapuolisessa Leuvanojassa tarkkailupisteellä Levanoja le Le0. Lisäksi vesistövaikutuksia tarkkailtiin pintavalutuskentän 2

alapuolisessa Naarastenojassa tarkkailupisteellä Naarastenoja alapää Na0 sekä sen alapuolisessa Lamujoessa pisteellä Lamujoki Pulkk yp 1,5 km Lam18. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-15. Tarkkailuohjelmaan kuuluvalta Kivinevan yläpuoliselta pisteeltä Lamujoki Junn meij yp Lam23 ei haettu vesinäytteitä vuonna 2023. Syy pisteen pois jättämiselle ei ole tiedossa.



Kuva 5-15 Kivinevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit. Vaikutustarkkailun vesinäytteet haettiin pintavalutuskentän 1 alapuolisilta tarkkailupisteiltä 14.3., 7.6., 6.7. ja 16.8. Pintavalutuskentän 2 alapuolisilta

tarkkailupisteiltä näytteet haettiin 20.3., 7.6., 5.7. ja 16.8. Keskeisimmät vesistö-tarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-33 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Kivinevan pintavalutuskentän 1 alapuolisella Leuvanjärven tarkkailupisteellä L1 vesi oli erittäin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Veden happipitoisuus oli tyypilliseen tapaan heikoimmillaan lopputalvella ja -kesällä. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita ja vesi oli lievästi hapanta/hapanta. Vedessä oli runsaasti rautaa, ja pitoisuudet olivat korkeimmillaan maaliskuussa. Leuvanjärven vedenlaatu oli tutkituilta osin parasta kesäkuun tarkkailukierroksella.

Leuvanjärven alapuolisella Leuvanojan tarkkailupisteellä Le0 vesi oli Leuvanjärven veden tavoin hyvin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat erittäin reheviä olosuhteita ja kokonaistyyppipitoisuudet reheviä olosuhteita. Veden happipitoisuus vaihteli välillä välttävä–erinomainen, ol-
len parhaalla tasolla kesäkuussa. Veden pH oli lähes neutraalia lukuun ottamatta heinäkuun tarkkailukierrosta, jolloin vesi oli hapanta. Veden kiintoainepitoisuus oli korkea heinäkuussa, ja rautapitoisuudet olivat korkeita jokaisella tarkkailukierroksella.

Leuvanjärven vesimuostuma on tyypitelty hyvin lyhytviipymäiseksi (Lv) järveksi, toissijaisena tyyppinään matalat humusjärvet (Mh). Leuvanjärven kasvukaudella (kesä–syyskuu) otettujen vesinäytteiden keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia verrattiin matalat humusjärvet -järvityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (46 µg/l) indikoi tyydyttävää tilaa (40–65 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (680 µg/l) hyvää tilaa (600–750 µg/l).

Leuvanojan vesimuodostuma on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt), joten Leuvanojan tarkkailupisteen Le0 keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (107 µg/l) indikoi huonoa tilaa (>90 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (615 µg/l) hyvää tilaa (450–900 µg/l). Leuvanojan vesistönäytteiden pH-minimi indikoi erinomaista tilaa (>5,7).

Kivinevan pintavalutuskentän 2 alapuolisella Naarastenoja alapää NaO -tarkkailupisteellä vesi oli rehevää, tummaa ja humuspitoista. Rautapitoisuudet olivat korkeita ja vesi oli neutraalia/lievästi hapanta. Veden happipitoisuus vaihteli välillä välttävä–erinomainen ja vedenlaatu oli parhaimmillaan kesäkuun tarkkailukierroksella.

Naarastenojan alapuolella Lamujoessa tarkkailupisteellä Pulkk yp 1,5 km Lam18 vesi oli niin ikään tummaa ja humusvaikutteista, ja vesi oli rehevää. Rautapitoisuudet olivat koholla, mutta selvästi matalampia kuin Naarastenojassa. Vesi oli niin ikään neutraalia/lievästi hapanta.

Naarastenojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin. Lamujoen vesimuodostuma on tyypitelty Leuvanojan tavoin keskisuureksi turvemaiden joeksi, joten vesistötarkkailun keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin. Lamujoen havaintopisteen keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (51 µg/l) indikoi tyydyttävää tilaa (40–60 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (678 µg/l) hyvää tilaa (450–900 µg/l). Vesistönäytteiden pH-minimi indikoi erinomaista tilaa (>5,7).


Taulukko 5-33 Kivinevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Leuvanjärvi L1 Leu (Kivinevan pvk1 ap)	44320	14.3.2023	6,3	41	28	55	870	430	11 000	7,5
		7.6.2023	6,5	92	26	37	580	220	3 000	4,4
		6.7.2023	6,5	93	28	53	620	310	5 700	9,0
		16.8.2023	6,1	69	43	47	840	380	5 000	12
Leuanoja le Le0 (Kivinevan pvk1 ap)	27959	14.3.2023	6,9	62	25	130	790	380	9 800	9,2
		7.6.2023	6,9	88	27	77	640	280	4 600	9,6
		6.7.2023	6,1	83	41	120	670	330	7 600	67,0
		16.8.2023	6,9	79	42	100	360	460	7 400	17
Lamujoki Junn mejj yp Lam23 (Kivinevan pvk2 yp)	28051	ei näytteitä								
Naarastenoja alapää Na0 (Kivinevan pvk2 ap)	28055	20.3.2023	6,5	58	15	54	1100	280	6 800	7,6
		7.6.2023	7,0	89	20	45	650	230	4 400	7,2
		5.7.2023	6,8	88	30	70	860	300	7 600	10,0
		16.8.2023	7,0	84	33	63	840	430	8 200	13
Lamujoki Pulkki yp, 1,5 km Lam18 (Kivinevan pvk2 ap)	28057	20.3.2023	6,6	69	18	43	670	180	3 300	6,0
		7.6.2023	7,0	100	22	38	510	170	2 100	4,0
		5.7.2023	7,1	89	20	66	770	220	3 800	2,4
		16.8.2023	6,8	83	28	55	760	260	3 800	6


Kuvassa 5-16 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Kivinevan pintavalutuskentältä 1 lähtevässä vedessä, sekä sen alapuolisilla pisteillä Lauvanjärvessä ja Leuanojassa. Vesistötarkkailun näytteet on otettu samoina päivinä edellä esitetyn näytteenoton mukaisesti. Pintavalutuskentän 1 näytteet on otettu kesäkuussa samana päivänä vesistötarkkailunäytteiden kanssa, heinäkuussa päivää aikaisemmin ja elokuussa päivää myöhemmin. Kuvassa 5-17 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Kivinevan pintavalutuskentältä 2 lähtevässä vedessä, sekä sen alapuolisilla pisteillä Naarastenojassa ja Lamujoessa. Pintavalutuskentältä 1 lähtevä vesi oli alapuolisten vesistötarkkailupisteiden vedenlaatua selvästi heikompaa ainoastaan elokuussa kiintoaineen, orgaanisen aineksen pitoisuuden ja kokonaistyyppipitoisuuden osalta. Pintavalutuskentältä 2 lähtevä vesi oli joko parempilaatuista, tai veden laatu oli samalla tasolla alapuolisen Naarastenojan vesistötarkkailupisteen kanssa.

Tarkkailussa ei ole mukana suoalueen yläpuolisia tarkkailupisteitä, ja pintavalutus-kenttien alapuoliset vesistötarkkailupisteet sijaitsevat voimakkaasti ojitetuilla

alueilla ylin 5 kilometriä pintavalutuskentiltä alavirtaan. Lisäksi pintavalutuskentän 2 alapuoliseen Naarastenojaan johdetaan myös Lahnasnevan turvetuotantoalueen vesiä. Tämän vuoksi turvetuotantoalueen vaikutusta alapuoliseen vesistöön on tutkituilta osin vaikea arvioida.



Kuva 5-16 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Kivinevan pintavalutuskentältä 1 lähteneessä vedessä, sekä alapuolisessa Leuvanjärvessä (L1 Leu) ja Leuanojassa (le Le0) vuonna 2023.



Kuva 5-17 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Kivinevan pintavalutus-kentältä 2 lähteessä vedessä, sekä alapuolisessa Naarastenojassa (Na0) ja Lamujoessa (Lam18).

5.9 Korteneva

5.9.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Kortenevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta ja palaturvetta 49 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 107,8 ha. Reunaojien ja pumppausaltaiden puhdistusta sekä sarkaojien lietetaskujen tyhjennystä tehtiin lokakuussa. Lisäksi muita kunnossapitotöitä tehtiin toukokuussa ja syyskuussa. 26.1.–12.9. välisen ajan sadanta oli 270 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 9.1.–13.12. välisenä aikana pintavalutus-kentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 19,

joista neljänä kertana ei saatu otettua näytettä vähäisen virtaaman takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-34.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaistyyppi-, kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuus oli alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy, 2016). Typestä vain pieni osuus esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Fosforista noin neljäsosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. COD_{Mn}-pitoisuus oli hieman korkeammalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 1 730 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kortenevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus 26.5.2023 alkaen. Jaksolle 1.1.–25.5. korvaavat virtaamatiedot haettiin vesistömallijärjestelmästä. Jaksoilla 13.–29.6., 10.7.–24.7. ja 1.–3.11. virtaamaa ei ollut. Kortenevan kesän keskivaluma (6,0 l/s km²) oli pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-34.

Taulukko 5-34 Kortenevan pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l
Pvk1	Talvi	1.1. - 9.4.	99	2,4	3	6,5	32	12	700	1,3
Pvk1	Kevät	10.4. - 24.5.	45	41	4	6,1	30	18	713	2,1
Pvk1	Kesä	25.5. - 14.9.	113	6	5	6,3	53	28	962	4,6
Pvk1	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	41	1	6,3	31	13	750	1,0
Pvk1	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	3	1	6,6	30	29	1100	1,6
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	13	14	6,3	39	21	829	2,7
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pvk:llä 2011-2015</i>							34	56	1 610	5,4

*SYKE:n vesistömalli (WSFS) 1.1.-25.5. ja 19.9.

Kortenevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Kokonaisfosforin ja kiintoaineen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo hyvä (Taulukko 5-35). Kokonaistypen osalta kentän puhdistusteho oli keskinkertainen. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin negatiivinen. Kemiallisen hapenkulutuksen osalta

kentälle saapuneen veden pitoisuudet olivat kuitenkin turvetuotantoalueelle tyyppillisellä tasolla (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-35 Kortenevan pintavalutuskentän 1 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	2	-18	91	76	94
Pvk1	Kevät	1	14,7	42	-36	8
Pvk1	Kesä	3	-22	77	46	83
Pvk1	Alkusyksy	1	26	87	46	92
Pvk1	Loppusyksy	1	-36	45	27	73
Pvk1	Vuosi	8	-10	79	51	88


Kortenevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-36. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat typen, fosforin, kiintoaineen ja COD_{Mn} osalta pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-5) alhaisemmat. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin edellisvuotta korkeampi.

Taulukko 5-36 Kortenevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
		g/ha/d			
Pvk1	Talvi	61	0,02	1,3	2,8
Pvk1	Kevät	1 049	0,6	24	62
Pvk1	Kesä	256	0,1	5,5	44
Pvk1	Alkusyksy	1 099	0,5	27	35
Pvk1	Loppusyksy	89	0,1	3,3	5
Pvk1	Vuosi	382	0,2	9,0	27
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.063	107,8	15 012	8	356	1 075
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>9 696</i>	<i>7</i>	<i>300</i>	<i>614</i>

5.9.2 Vesistötarkkailu

Kortenevan vedet johdetaan pintavalutuskentältä 1 laskuojaan ja siitä reittiä Lamujoki–Kortteisen tekojärvi–Lamujoki–Siikajoki. Kortenevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Lamujossa Kortenevan yläpuolella (Lamujoki Kortteisen yp Lam57) sekä alapuolella (Lamujoki Kortteijan alap LamPu). Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-18.



Kuva 5-18 Kortenevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 22.3., 5.6., 3.7. ja 14.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-37 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Kortenevan yläpuolisella pisteellä Lam57 vesi oli jokaisella näytteenottokerralla hieman parempilaatuista kuin turvetuotantoalueen alapuolisella pisteellä LamPu. Veden laatu oli myös heikoimmillaan heinäkuun tarkkailukierroksella molemmilla pisteillä. Vesi oli niin Kortenevan ylä- kuin alapuolella hyvin tummaa, ja orgaanisen aineksen määrää indikoiva COD_{Mn}-pitoisuus oli humusvesille tyypillisellä tasolla. Veden happipitoisuus oli hyvä tai erinomainen lukuun ottamatta Kortenevan alapuolisen pisteen maaliskuun tulosta, jossa pitoisuus oli välttävällä tasolla.

Kokonaisravinnepitoisuudet olivat Kortenevan yläpuolisella pisteellä Lam57 karulla/lievästi rehevällä tasolla ja Kortenevan alapuolisella pisteellä LamPu lievästi rehevällä/rehevällä tasolla. Molemmilla pisteillä rautapitoisuudet olivat suovaltaiselle valuma-alueelle tyypillisellä tasolla. Vesi oli Kortenevan alapuolella hieman kiintoainepitoisempaa ja happamampaa kuin tuotantoalueen yläpuolella, ollen kuitenkin lievästi hapanta molemmilla tarkkailupisteillä.

Lamujoen vesimuodostuma on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt), joten vesistötarkkailun havaintopaikkojen keskimääräisiä ravinnepitoisuuksia sekä pH-minimejä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet (Lam57 20 µg/l ja LamPu 24 µg/l) indikoivat hyvää tilaa (20–40 µg/l) ja keskimääräiset kokonaistyyppipitoisuudet (Lam57 420 µg/l ja LamPu 443 µg/l) erinomaista tilaa (<450 µg/l). Myös pH-minimit indikoivat erinomaista tilaa (>5,7).


Taulukko 5-37 Kortenevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Lamujoki Kortteisen yp Lam57 (Kortenevan ap)	28039	22.3.2023	6,8	82	14	16	490	100	1 100	1,2
		5.6.2023	6,9	90	15	18	370	98	940	4,8
		3.7.2023	6,8	87	15	23	440	110	1 600	1,6
		14.8.2023	6,8	89	14	22	380	100	1 300	4
Lamujoki Korteojan alap LamPu (Kortenevan ap)	28040	22.3.2023	6,6	75	15	18	520	120	1 600	1,6
		5.6.2023	6,7	98	15	21	380	110	1 200	7,0
		3.7.2023	6,7	92	16	30	470	140	2 300	3,6
		14.8.2023	6,6	83	16	28	400	130	2 100	6

Kuvassa 5-19 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Lamujoessa Kortenevan yläpuolella (Lam57) ja alapuolella (LamPu) sekä Kortenevan

pintavalutuskentältä lähteneessä vedessä. Näytteet on otettu samana päivänä edellä esitetyn vesistötarkkailun näytteenoton mukaisesti.

Vedenlaatu oli keskimäärin parempaa Kortenevan turvetuotantoalueen yläpuolisella havaintopisteellä Lam57) kuin sen alapuolisella pisteellä (LamPu). Turvetuotantoalueen vaikutusta sen alapuoliseen vesistöön on kuitenkin tutkituilla osin vaikea arvioida, sillä alue on voimakkaasti ojitettua ja tuotantoalueen yläpuolinen vesistötarkkailupiste sijaitsee turvetuotantoalueesta useita kilometrejä ylävirtaan.



Kuva 5-19 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Lamujoessa Kortenevan yläpuolella (Lam57) ja alapuolella (LamPu), sekä Kortenevan pintavalutuskentällä 1 vuonna 2023.

5.10 Kärjenrimpi

5.10.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Kärjenrimmellä tuotettiin vuonna 2023 jyrsin- ja palaturvetta 33 päivänä. Tuotantoaika oli 15.5.–14.7. Tuotannossa olevaa aluetta oli 280,8 ha. Laskeutusaltaiden

puhdistukselle ei ollut tarvetta syyskuussa. Muita alueen kunnossapitotöitä tehtiin touko-lokakuussa. 26.1.–14.7. välisen ajan sadanta oli 159 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 9.1.–18.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 22, joista kaikkina kertoina saatiin otettua näytteet. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-38.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin hapanta. Kokonaistyyppi-, kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuus oli alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä ja fosforista reilu kolmasosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. COD_{Mn}-pitoisuus oli hieman korkeammalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 2 200 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kärjenrimellä oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympärivuotisesti. Kärjenrimmen kesän keskivaluma (5 l/s km²) oli pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-38.

Taulukko 5-38 Kärjenrimmen pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l
Pvk1	Talvi	1.1. - 20.4.	110	1,1	4	4,4	45	17	790	1,1
Pvk1	Kevät	21.4. - 24.5.	34	37	5	4,8	23	16	850	2,0
Pvk1	Kesä	25.5. - 14.9.	113	5	7	4,8	46	30	1421	2,2
Pvk1	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	18	1	5,2	46	14	1800	1,0
Pvk1	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	1	5	4,8	48	20	1382	1,2
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	8	22	4,7	41	21	1185	1,7
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pvk:illä 2011-2015</i>							34	56	1 610	5,4

Kärjenrimmen pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin kesäaikaisesti, kolme kertaa vuodessa kesä-, heinä- ja elokuussa. Myös tammikuussa otettiin tehon tarkkailun näyte, minkä jälkeen päätettiin tarkkailurytmin muutos. Kokonaisfosforin ja kiintoaineen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja

reduktion vuosikeskiarvo todella hyvä (Taulukko 5-39). Kokonaistypen osalta kentän puhdistusteho oli keskinkertainen. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin todella matala, johon vaikutti selvästi negatiivinen puhdistusteho kesäkuussa.

Taulukko 5-39 Kärjenrimmen pintavalutuskentän 1 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD_{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	1	13	93	80	94
Pvk1	Kesä	3	8	86	42	93
Pvk1	Vuosi	4	9	87	54	93


Kärjenrimmen pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-40. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat kaikilta osin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-5) alhaisemmat. Kokonaiskuormitus oli COD_{Mn} ja kiintoaineen osalta edellisvuotta alhaisempi, ja typen ja fosforin osalta hieman korkeampi.

Taulukko 5-40 Kärjenrimmen pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD_{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Talvi	41	0,0	0,7	1,0
Pvk1	Kevät	635	0,5	25	63
Pvk1	Kesä	186	0,1	6,5	8
Pvk1	Alkusyksy	728	0,2	28	16
Pvk1	Loppusyksy	23	0,0	0,7	1
Pvk1	Vuosi	227	0,1	8,4	11
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.048	281	23 230	12	849	1 110
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		27 518	11	806	2 782

5.10.2 Vesistötarkkailu

Kärjenrimmen vedet johdetaan laskuojan kautta Veneojaan, josta ne kulkeutuvat Neittävänjokeen ja siitä edelleen Siikajokeen. Kärjenrimmen ja Puronrämeen turvetuotantoalueella on tarkkailuohjelman mukaisesti yhteiset vesistötarkkailupisteet, ja Puronrämeen vedet johdetaan laskuojan kautta Neittävänjokeen noin 4 kilometriä Veneojan suulta ylävirtaan. Kärjenrimmen ja Puronrämeen tuotantoalueilta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti molempien soiden yläpuolisella pisteellä Neittävänjoki yp Ne yp, Kärjenrimmen yläpuolisena ja Puronrämeen alapuolisena pisteenä toimivalla pisteellä Neittävänjoki Leiviskä Ne11, Kärjenrimmen alapuolisella pisteellä Veneojassa (Veneoja Ve1) sekä molempien tuotantoalueen alapuolisella pisteellä Neittävänjoki Koskenkylä Ne2. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-20.



Kuva 5-20 Kärjenrimmen-Puronrämeen päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näy-
tepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet otettiin vuonna 2023 21.3. (Ne yp ja Ne11), 22.3. (Ve1 ja Ne2), 6.6., 4.7. ja 15.8.

Neittävänjoen vesi oli jokaisella havaintopaikalla erittäin tummaa, sameaa ja etenkin elokuun tarkkailukierroksella runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat reheviä/erittäin reheviä olosuhteita ja kokonaistyyppipitoisuudet reheviä olosuhteita. Vesi oli hyvin rautapitoista ja pH vaihteli lievästi happaman ja lievästi emäksisen välillä. Vedenlaatu oli Neittävänjoen tarkkailupisteistä heikoimmalla tasolla pisteellä Ne11 (Kärjenrimmen yp, Puronrämeen ap) kokonaisravinnepitoisuuksien, orgaanisen aineksen ja rautapitoisuuksien ollessa keskimäärin muita Neittävänjoen pisteitä hieman korkeammalla tasolla. Turvetuotantoalueiden yläpuolisella pisteellä Ne yp kokonaisravinnepitoisuudet olivat turvetuotantoalueiden alapuolista pistettä (Ne2) korkeampia, mutta orgaanista ainesta oli vähemmän, ja väriluku sekä rautapitoisuudet olivat soiden alapuolista pistettä matalampia.

Veneojassa Kärjenrimmen alapuolella (Ve1) vesi oli erittäin tummaa, sameaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita ja rautapitoisuudet olivat hyvin korkeita. Orgaanisen aineksen ja raudan pitoisuudet sekä väriluku olivat selvästi korkeampia kuin Neittävänjoen havaintopisteillä. Kaikilla vedenlaatupisteillä vedenlatu oli parhaimmillaan kesäkuun tarkkailukierroksella.

Neittävänjoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt), joten vesistö-tarkkailupisteiden keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarahoihin (Aroviita ym. 2019).

Keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat Neittävänjoessa huonoa tilaa ($>90 \mu\text{g/l}$) jokaisella havaintopisteellä. Keskimääräiset kokonaistyyppipitoisuudet indikoivat tyydyttävää tilaa ($900\text{--}1500 \mu\text{g/l}$) ylimmillä pisteillä Ne yp ja Ne11, ja hyvää tilaa ($450\text{--}900 \mu\text{g/l}$) molempien turvetuotantoalueen alapuolisella pisteellä Ne2. Pitoisuus oli kuitenkin lähellä tyydyttävän tilan rajaa ($893 \mu\text{g/l}$). pH-minimit indikoivat erinomaista tilaa jokaisella Neittävänjoen havaintopisteellä ($\text{pH} >5,7$).

Veneojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.


Taulukko 5-41 Kärjenrimpi-Puronrämeeen alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Neittävänjoki yp Ne yp (Kärjenrimpi-Puronrämeeen yp)	69052	21.3.2023	6,8	76	11	110	1100	210	5 400	6,4
		6.6.2023	7,2	85	14	99	720	200	4 400	10,0
		4.7.2023	7,3	75	17	130	1100	240	6 100	7,5
		15.8.2023	7,0	75	25	160	890	370	7 800	8,5
Neittävänjoki Leiviskä Ne11 (Kärjenrimpi yp, Puronrämee ap)	28018	22.3.2023	6,8	64	14	110	1100	250	9 900	6,4
		6.6.2023	7,2	88	16	95	700	210	4 500	6,8
		4.7.2023	7,0	65	34	140	1600	270	6 400	7,2
		15.8.2023	6,8	67	31	170	890	430	9 000	12
Veneoja ve Ve1 (Kärjenrimpi ap)	59609	22.3.2023	6,4	43	27	85	930	380	13 000	10,0
		6.6.2023	6,9	87	26	55	540	270	4 300	10,0
		4.7.2023	6,9	74	32	110	940	490	11 000	22,0
		15.8.2023	6,4	88	50	97	940	590	10 000	27
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2 (Kärjenrimpi-Puronrämeeen ap)	28015	23.3.2023	6,7	68	17	110	980	260	7 500	8,4
		6.6.2023	7,1	98	19	82	620	220	4 300	9,6
		4.7.2023	7,2	76	19	100	1000	260	6 500	7,3
		15.8.2023	6,7	79	36	130	970	460	8 400	16

Kuvassa 5-21 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Kärjenrimmen ja Puronrämeeen pintavalutuskentiltä lähtevässä vedessä, sekä Neittävänjoessa molempien tuotantoalueiden yläpuolella (Ne yp), Puronrämeeen alapuolella ja Kärjenrimmen yläpuolella (Ne11), molempien tuotantoalueiden alapuolella (Ne2) sekä Veneojassa Kärjenrimmen alapuolella (Ve1).

Puronrämeeen turvetuotantoalueelta lähtevän veden (pvk2) orgaanisen aineksen (COD_{Mn}) pitoisuudet olivat selvästi Neittävänjoen turvetuotantoalueen yläpuolelta havaintopistettä (Ne yp) korkeammat, ja suurimpia pitoisuuserot olivat maalisi- ja elokuun tarkkailukierroksilla. Orgaanisen aineksen pitoisuudet olivatkin suurempia Puronrämeeen alapuolisella havaintopisteellä Ne11 kuin tuotantoalueen yläpuolella (Ne yp). Orgaanisen aineksen pitoisuudet olivat Neittävänjoen havaintopaikkoja korkeampia myös Kärjenrimmen turvetuotantoalueelta lähteneessä vedessä (pvk1). Heinäkuun tarkkailukierrosta lukuun ottamatta orgaanisen aineksen pitoisuudet olivat Neittävänjoessa pienimpiä turvetuotantoalueen yläpuolella ja suurimpia niiden alapuolella. Tutkituilta osin voidaan siis todeta, että tuotantoalueella vaikuttaisi olevan vaikutusta Neittävänjoen COD_{Mn}-pitoisuuksiin.

Puronrämeeiltä tulevan veden kokonaistyyppipitoisuudet olivat selvästi Neittävänjoen pitoisuuksia suurempia etenkin maalisk- ja elokuussa. Myös Kärjenrimmeltä tulevan veden tyyppipitoisuudet olivat Neittävänjokeen verrattuna koholla elokuussa. Selvää vaikutusta turvetuotantoalueiden alapuoliseen vesistöön ei kuitenkaan ollut tutkituilta osin havaittavissa. Tutkituilta osin turvetuotantoalueiden vaikutusta myöskään kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuuksiin ei voitu havaita.



Kuva 5-21 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Puronrämeeiltä (pvk2) sekä Kärjenrimmeltä (pvk1) lähtevässä vedessä, sekä molempien yläpuolisella pisteellä Ne yp, Puronrämeeen alapuolisella ja Kärjenrimmen yläpuolisella pisteellä Ne11, Kärjenrimmen alapuolisella pisteellä Ve1 sekä molempien tuotantoalueiden alapuolisella pisteellä Ne2 vuonna 2023.

5.11 Puronrämee

5.11.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Puronrämeeillä tuotettiin vuonna 2023 jyrsin-, kuivike- ja palaturvetta 62 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 252 ha ja tuotantokunnossa olevia alueita 58 ha.

Laskeutusaltaiden puhdistukselle ei ollut tarvetta syyskuussa. Tuotantoalueella tehtiin muita kunnossapitotöitä touko-, heinä-syyskuussa. 26.1.–15.9. välisen ajan sadanta oli 269 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 9.1.–18.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 2. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 22, joista yhtenä kertana ei saatu otettua näytettä. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-42.

Pintavalutuskentän 2 vesi oli keskimäärin hapanta. Kokonaistyyppi- ja kiintoainepitoisuudet olivat lähes samalla tasolla kuin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä vain pieni osuus esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosforipitoisuus oli hieman matalammalla tasolla kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista noin viidesosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. COD_{Mn}-pitoisuus oli korkeammalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 3 567 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Puronrämeeen virtaamien arviointiin käytettiin Kärjenrimmen pvk1:n valumia. Kärjenrimmen kesän keskivaluma (5 l/s km²) oli pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-42.

Taulukko 5-42 Puronrämeeen pvk2 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l
Pvk2	Talvi	1.11. - 3.11.	4	0,5	4	5,4	66	94	1950	5,1
Pvk2	Kevät	4.11. - 13.11.	9	1	4	5,2	24	20	838	1,5
Pvk2	Kesä	14.11. - 26.11.	14	1	7	5,2	54	52	1400	10,1
Pvk2	Alkusyksy	27.11. - 10.12.	13	0	1	5,3	58	29	2700	1,6
Pvk2	Loppusyksy	11.12. - 31.12.	21	0	5	5,4	57	31	2160	2,2
Pvk2	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	8	21	5,3	52	48	1640	5,2
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pvk:illa 2011-2015</i>							34	56	1 610	5,4

*Virtaama arvioitu Kärjenrimmen pvk1:n valumien avulla.

Puronrämeeen pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin kesäaikaisesti, kolme kertaa vuodessa kesä-, heinä- ja elokuussa. Myös tammikuussa otettiin tehon tarkkailun näyte, minkä jälkeen päätettiin tarkkailurytmin muutos. Kokonaisfosforin osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo keskinkertaista hieman parempi (Taulukko 5-43). Kokonaistypen ja kiintoaineen osalta kentän puhdistusteho oli keskinkertaisen tuntumassa. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin negatiivinen, johon vaikutti selvästi negatiiviset puhdistustehot tammi- ja elokuussa.

Taulukko 5-43 Puronrämeeen pintavalutuskentän 2 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD_{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk2	Talvi	1	-74	55	44	78
Pvk2	Kesä	3	-7	68	41	54
Pvk2	Vuosi	4	-18	66	42	57

Puronrämeeen pintavalutuskentän 2 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-44. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat kaikilta osin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-5) alhaisemmat. Kokonaiskuormitus oli COD_{Mn} , kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta edellisvuotta alhaisempi, ja typen osalta hieman korkeampi.

Taulukko 5-44 Puronrämeeen pintavalutuskenttä 2:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD_{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk2	Talvi	59	0,1	1,9	6,7
Pvk2	Kevät	627	0,6	26	38
Pvk2	Kesä	211	0,2	5,6	23
Pvk2	Alkusyksy	917	0,5	43	25
Pvk2	Loppusyksy	26	0,0	1,0	1
Pvk2	Vuosi	264	0,2	10,4	16
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.042	309,9	29 855	23	1180	1 819
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>33 184</i>	<i>28</i>	<i>1088</i>	<i>2 951</i>

5.11.2 Vesistötarkkailu

Puronrämeeen vedet johdetaan pintavalutuskentältä 2 laskuojaan, josta ne kulkeutuvat Neittävänjokeen ja edelleen Siikajokeen. Puronrämeeeltä lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Puronrämeeen yläpuolisella pistellä Neittävänjoki yp Ne yp, sekä sen alapuolisilla pisteillä Neittävänjoessa (Neittävänjoki Leiviskä Ne11 ja Neittävänjoki Koskenkylä Ne2). Lisäksi tarkkailuun kuului Kärjenrimmen alapuolella Neittävänjokeen laskevassa Veneojassa sijaitseva piste Veneoja ve Ve1. Tarkkailupisteet ovat yhteisiä Kärjenrimmen turvetuotantoalueen kanssa, ja Puronrämeeen alueellisen vesistötarkkailun tulokset on esitetty Kärjenrimmen vesistötarkkailun alla kappaleessa 5.10.2. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-20.

5.12 Lahnasneva

5.12.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Lahnasnevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 33 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 119,9 ha ja tuotannosta poistuneita alueita 6,4 ha. Laskeutusaltaat puhdistettiin syyskuussa, ja sarkaojarakenteet puhdistettiin touko- ja syyskuussa. Lisäksi reuna- ja kokoojaojat puhdistettiin syyskuussa. Tuotantoalueella tehtiin touko-lokakuussa muita kunnostustöitä, kuten kivien poistoa lohkolta sekä aumojen peittämistä. Tuotantoaikainen (6.6.–30.8.) sadanta oli 187 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti. Pintavalutuskentälle pumpattiin 1.5.–24.10. välisenä aikana, jolloin myös päästötarkkailunäytteet otettiin pintavalutuskentän alapuoliselta mittapadolta. Muulloin näytteet otettiin laskeutusaltaiden 1-3 alapuoliselta virtaamansäätöpadolta. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 21, joista jokaisella kerralla saatiin otettua näyte. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-45.

Lahnasnevalta lähtenyt vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaisravinteiden, kiintoaineen ja COD_{Mn}:n kesäaikaiset pitoisuudet olivat alhaisempia kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 kesän keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Lahnasnevalta lähteneen veden

sähkönjohtavuus oli keskimäärin 6,1 mS/m vuonna 2023. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Lahnasnevilla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus 26.5.–25.10. välisenä aikana. Muulloin virtaama on arvioitu Tahkonevan pvk2:n valuman avulla. Lahnasnevan kesän keskivaluma (13 l/s km²) oli suurempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa taulukossa 5-45.

Taulukko 5-45 Lahnasnevan la/pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte-määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m
La	Talvi	1.1. - 7.4.	97	4,9	3	6,3	18	110	1143	19,7	10,6
La/Pvk1	Kevät	8.4. - 11.5.	34	77	4	6,2	18	43	1335	4,0	3,5
Pvk1	Kesä	12.5. - 14.9.	126	13	8	6,6	31	24	693	3,9	5,9
Pvk1/La	Alkusyky	15.9. - 31.10.	47	31	4	6,3	29	41	1220	5,3	5,4
La	Loppusyky	1.11. - 31.12.	61	3	2	6,5	18	68	1250	14,0	7,3
Pvk1/La	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	18	21	6,4	25	47	1033	7,4	6,1
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:llä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3	

Lahnasnevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin 10.5.–18.10. välisenä aikana. Kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion pintavalutuskentän käyttöaikainen keskiarvo hyvä (Taulukko 5-46). Kokonaistypen osalta kentän puhdistusteho oli keskinkertainen. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) osalta keskimääräinen ainepoistuma jäi kohtalaiseksi. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin todella matala, johon vaikutti selvästi negatiiviset puhdistustehot kesällä ja alkusyksyllä. Kemiallisen hapenkulutuksen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuudet olivat kuitenkin turvetuotantoalueelle tyypillisellä tasolla (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-46 Lahnasnevan pintavalutuskentän 1 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	Näyte-määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Kevät	1	27	76	28	98
Pvk1	Kesä	3	8	81	62	89
Pvk1	Alkusyky	2	24	75	55	90
Pvk1	Tarkkailukausi	6	19	76	58	92


Lahnasnevan vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-47. Pintavalutuskenttä 1:n kesän keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 kesän keskiarvoja (Taulukko 4-4) alhaisemmat kokonaisravinteiden ja kiintoaineen osalta, ja COD_{Mn} osalta likimain samalla tasolla vertailukohteiden kanssa. Lahnasnevan kokonaiskuormitus oli kaikilta osin edellisvuotta korkeampi.

Taulukko 5-47 Lahnasnevan ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
		g/ha/d			
La	Talvi	75	0,5	5,3	86
La/Pvk1	Kevät	1 071	2,7	88	283
Pvk1	Kesä	392	0,3	9,5	53
Pvk1/La	Alkusyksy	812	0,8	32	116
La	Loppusyksy	49	0,2	3,6	36
Pvk1/La	Vuosi	368	0,6	18	88
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.069	126,3	16 078	25	717	3 799
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>12 396</i>	<i>18</i>	<i>444</i>	<i>2 420</i>

5.12.2 Vesistötarkkailu

Lahnasnevan vedet johdetaan Kivinevan tavoin reittiä Naarastenoja–Lamujoki–Siikajoki. Lahnasnevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Naarastenojassa Lahnasnevan alapuolisella pisteellä Naarastenoja alapää Na0. Tarkkailupisteen sijainti on esitetty kuvassa 5-22.



Kuva 5-22 Lahnasnevan päästötarkkailupisteiden ja vesistötarkkailun näytepisteen sijainti.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 20.3., 7.6., 5.7. ja 16.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-48 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Lahnasnevan pintavalutus kentän 1 alapuolisella Naarastenoja alapää Na0 -tarkkailupisteellä vesi oli rehevää, tummaa ja humuspitoista. Rautapitoisuudet olivat korkeita ja vesi oli neutraalia/lievästi hapanta. Veden happipitoisuus vaihteli välillä välttävä–erinomainen ja vedenlaatu oli parhaimmillaan kesäkuun tarkkailukierroksella.


Naarastenojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.

Taulukko 5-48 Lahnasnevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Naarastenoja alapää NaO (Lahnasnevan ap)	28055	20.3.2023	6,5	58	15	54	1100	280	6 800	7,6
		7.6.2023	7,0	89	20	45	650	230	4 400	7,2
		5.7.2023	6,8	88	30	70	860	300	7 600	10,0
		16.8.2023	7,0	84	33	63	840	430	8 200	13

Kuvassa 5-23 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Lahnasnevan laskeutusaltilta tai pintavalutuskentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Naarastenojassa. Lahnasnevan laskeutusaltilta lähtenyt vesi oli selvästi Naarastenojaa heikompi-laatuista maaliskuun tarkkailukierroksella kiintoaineen sekä kokonaisfosforipitoisuuden osalta. Pintavalutuskentältä lähteneen veden (kesä-elokuu) kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet olivat selvästi Naarastenojaa alhaisempia. Kokonaistypipitoisuus oli hieman korkeampi Naarastenojassa jokaisella vaikutustarkkailun näytteenottokierroksella. COD_{Mn}-pitoisuudet olivat likimain samalla tasolla, tai hieman korkeampia Lahnasnevalta lähteneessä vedessä.

Tarkkailussa ei ole mukana suoalueen yläpuolista tarkkailupistettä, ja pintavalutuskentän alapuolinen vesistötarkkailupiste sijaitsee voimakkaasti ojitetuilla alueella yli 5 kilometriä pintavalutuskentältä alavirtaan. Lisäksi Naarastenojan vedenlaatuun vaikuttaa myös siihen vetensä laskeva Kivinevan turvetuotantoalue. Tämän vuoksi Lahnasnevan turvetuotantoalueen vaikutusta alapuoliseen vesistöön on tutkituilta osin vaikea arvioida.



Kuva 5-23 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Lahnasnevan pintavalutuskentältä 1 lähteneessä vedessä sekä sen alapuolisella pisteellä naarastenojassa (NaO) vuonna 2023.

5.13 Mankisenneva

5.13.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Mankisennevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrsin-, kuivike- ja palaturvetta 59 päivänä. Tuotantoaika oli 12.5.–11.9. Tuotannossa olevaa aluetta oli 264,7 ha. Laskeutusaltaat puhdistettiin syyskuussa, ja sarkaojarakenteet puhdistettiin touko-kuussa. Lisäksi tuotantosaroille tehtiin kunnossapitotöitä touko- ja syyskuussa. Tuotantoaikainen (15.5.–11.9.) sadanta oli 234 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 9.1.–4.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 2. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 20, joista kahtena kertana ei saatu otettua näytettä upottavan lumen (26.4.) ja

vähäisen virtaaman (20.6.) takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatu-tulokset on esitetty taulukossa 5-49.

Pintavalutus Kentän 1 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaistyyppipitoisuus oli alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutus kenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä noin 40 % esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosfori-, kiintoaine ja COD_{Mn}-pitoisuus oli korkeammalla tasolla kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista suurin osa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 6 070 µg/l ja sähkönjohtavuus 7,0 mS/m. Vedenlaatu tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Mankisennevan pvk1:llä oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympärivuotisesti, joten virtaamatietoja käytettiin myös pvk2:lle. Mankisennevan kesän keskivaluma (7,8 l/s km²) oli hieman pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-49.

Taulukko 5-49 Mankisennevan pvk2 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pintavalutus kentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m
Pvk2	Talvi	1.1. - 17.4.	107	5,9	3	6,3	36	287	1395	9,2	11,2
Pvk2	Kevät	18.4. - 19.5.	32	60	3	6,2	25	76	1027	2,1	3,1
Pvk2	Kesä	20.5. - 14.9.	118	8	7	6,4	61	188	1199	10,2	6,1
Pvk2	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	31	2	6,2	50	73	1650	2,8	
Pvk2	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	5	3	6,3	37	160	1500	1,2	6,4
Pvk2	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	14	18	6,3	47	181	1337	6,8	7,0
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pvk:illä 2011-2015</i>							34	56	1 610	5,4	

*Virtaamatiedot EHP Mankisenneva pvk1

Mankisennevan pintavalutus Kentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) ja kokonaisfosforin osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli matala verrattuna lähteneen veden pitoisuuksiin (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo oli tämän takia negatiivinen (Taulukko 5-50). Kokonaistyyppien osalta Kentän puhdistusteho oli heikko. Kiintoaineen osalta keskimääräinen ainepoistuma jäi keskinäiseksi.

Taulukko 5-50 Mankisennevan pintavalutuskentän 2 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk2	Talvi	3	-100	-82	14	34
Pvk2	Kevät	1	-14,3	-16	29	62
Pvk2	Kesä	3	-68	-17	6	10
Pvk2	Alkusyksy	0				
Pvk2	Loppusyksy	3	-51	-9	17	94
Pvk2	Vuosi	10	-65	-38	14	52

Hevoskorven pintavalutuskentän 2 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-51. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat kiintoaineen ja typen osalta pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) alhaisemmat, ja fosforin sekä COD_{Mn} vertailukohteita korkeammat. Kokonaiskuormitus oli COD_{Mn}, typen ja kiintoaineen osalta edellisvuotta alhaisempi, ja fosforin osalta korkeampi.


Taulukko 5-51 Mankisenneva pintavalutuskenttä 2:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk2	Talvi	211	1,7	7,9	53,5
Pvk2	Kevät	1 233	3,5	54	111
Pvk2	Kesä	417	1,1	8,4	57
Pvk2	Alkusyksy	1 417	2,0	48	79
Pvk2	Loppusyksy	149	0,9	6,1	5
Pvk2	Vuosi	512	1,6	17,0	55
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.026	139,8	49 629	152	1644	5 336
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>86 027</i>	<i>116</i>	<i>2404</i>	<i>7 312</i>

5.13.2 Vesistötarkkailu

Mankisennevan vedet johdetaan pintavalutuskentältä 2 reittiä Mankisenoja–Kurranjärvi–Kurranoja–Siikajoki. Mankisennevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Mankisenojassa

Mankisennevan alapuolella tarkkailupisteellä Mankisenoja alapää Man0 sekä sen alapuolella Kurranjärvessä pisteellä Kurranjärvi 4 Kur4. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-24.



Kuva 5-24 Mankisennevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 21.3., 6.6., 4.7. ja 15.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-52 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Mankisennevan alapuolella Mankisenojassa havaintopisteellä Man0 vesi oli erittäin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita ja rautapitoisuudet olivat korkeita. Rautapitoisuus,

veden COD_{Mn}-arvo ja väriluku olivat selvästi korkeimmillaan elokuun tarkkailukierroksella. Veden happipitoisuus vaihteli välillä tyydyttävä–erinomainen ja vedenlaatu oli selvästi parhaimmillaan kesäkuun tarkkailukierroksella. Kiintoainepitoisuudet olivat suurimpia heinäkuussa ja elokuussa ja vesi oli lievästi hapanta.

Mankisenojan alapuolella sijaitsevassa Kurranjärvessä (tarkkailupiste Kur4) vesi oli Mankisenojan tavoin hyvin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita ja kokonaistyyppipitoisuudet lievästi reheviä/reheviä olosuhteita. Maaliskuun tarkkailukierroksella kokonaistyyppipitoisuus ja rautapitoisuus olivat selvästi muiden tarkkailukierrosten pitoisuuksia korkeampia. Veden happitilanne oli erinomainen lukuun ottamatta maaliskuun tarkkailukierrosta, jolloin se oli tyydyttävällä tasolla. Kurranjärven vesi oli lievästi hapanta/hapanta.

Mankisenojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin. Kurranjärven vesimuodostuma on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi järveksi Kurranjärven kasvukaudella (kesä–syyskuu) otettujen vesinäytteiden keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia verrattiin matalat runsashumuksiset järvet -järvityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (57 µg/l) indikoi tyydyttävää tilaa (45–60 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (530 µg/l) erinomaista tilaa (<580 µg/l).

Taulukko 5-52 Mankisennevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.


Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Mankisenoja alapää Man0 (Mankisennevan ap)	27945	21.3.2023	6,3	59	28	75	1200	390	7 600	6,4
		6.6.2023	6,7	88	28	40	620	270	3 600	8,0
		4.7.2023	6,7	78	42	92	910	510	8 900	14,0
		15.8.2023	6,5	66	60	96	1100	800	15 000	18
Kurranjärvi 4 Kur4 (Mankisennevan ap)	27952	21.3.2023	5,7	42	32	46	1400	310	4 200	1,2
		6.6.2023	6,4	96	23	55	470	200	2 900	18,0
		4.7.2023	6,5	90	22	61	480	180	3 000	22,0
		15.8.2023	6,1	93	26	55	640	200	2 700	14

Kuvassa 5-25 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Mankisennevan pinta-valutuskentältä 2 lähteneessä vedessä sekä Mankisennevan alapuolisissa

vesistötarkkailupisteissä Mankisenojassa (Man0) sekä Kurranjärvessä (Kur4). Näytteet on otettu samoina päivinä edellä esitetyn vesistötarkkailun näytteenoton mukaisesti.

Mankisennevalta laskeva vesi oli COD_{Mn}- ja kokonaisravinnepitoisuuksien osalta selvästi turvetuotantoalueen alapuolisia pisteitä huonolaatuisempaa lähes joka tarkkailukierroksella. Kaikista suurimpia pitoisuuserot alapuolisiin tarkkailupisteisiin olivat maaliskuun ja elokuun tarkkailukierroksilla, jolloin myös Mankisennevalta laskevan veden kiintoainepitoisuudet olivat korkeita.

Mankisennevan vaikutusta sen alapuoliseen vesistöön on kuitenkin vaikea arvioida, sillä tarkkailussa ei ole mukana turvetuotantoalueen yläpuolista pistettä.



Kuva 5-25 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Mankisennevan pintavalutuskentältä 2 lähteneessä vedessä sekä alapuolisilla vesistötarkkailupisteillä Mankisenojassa (Man0) ja Kurranjärvessä (Kur4) vuonna 2023.

5.14 Paskoneva

5.14.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Paskonevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrsinturvetta 32 päivänä. Tuotantokunnossa olevaa aluetta oli 77,6 ha. Laskeutusaltaat, sarkaojat sekä virtaamasäätöpadot puhdistettiin syyskuussa. Tuotantosaroille tehtiin kunnossapitotöitä kesä-heinäkuussa. Tuotantoaikainen (12.6.–19.9.) sadanta oli 78 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 12.1.–11.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 21, joista neljänä kertana ei saatu otettua näytettä vähäisen virtaaman takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-53.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin hapanta. Kokonaistyyppi-, kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuus oli alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). COD_{Mn}-pitoisuus oli korkeammalla tasolla kuin pohjoisen kohteilla keskimäärin. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 2 825 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Paskonevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympärivuotisesti. Paskonevan kesän keskivaluma (5,9 l/s km²) oli pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-53.

Taulukko 5-53 Paskoneva pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l
Pvk1	Talvi	1.1. - 28.4.	119	4,9	4	5,5	58	51	1293	1,5
Pvk1	Kevät	29.4. - 6.5.	8	55	1	5,6	29	32	2000	1,0
Pvk1	Kesä	7.5. - 14.9.	130	6	7	5,4	54	40	1207	2,3
Pvk1	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	29	4	5,4	40	25	1625	1,2
Pvk1	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	2	1	5,7	43	55	1900	2,6
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	9	17	5,4	50	39	1413	1,8
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pvk:llä 2011-2015</i>							34	56	1 610	5,4

Paskonevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin kesäaikaisesti, kolme kertaa vuodessa kesä-, heinä- ja elokuussa. Myös tammikuussa otettiin tehon tarkkailun näyte, minkä jälkeen päätettiin tarkkailurytmin muutos. Kokonaisfosforin ja kiintoaineen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea verrattuna lähtevän veden pitoisuuteen (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo fosforin osalta melko hyvä ja kiintoaineen osalta hyvä (Taulukko 5-54). Kokonaistypen osalta kentän puhdistusteho jäi kohtalaiseksi. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli kaikkina näytteenottokertoina negatiivinen.

Taulukko 5-54 Paskonevan pintavalutuskentän 1 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD_{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	1	-41	62	43	94
Pvk1	Kesä	3	-39	67	32	81
Pvk1	Vuosi	4	-40	66	36	85


Paskonevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-55. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat kaikilta osin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-5) alhaisemmat. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin alhaisempi edellisvuoteen verrattuna.

Taulukko 5-55 Paskonevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD_{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Talvi	193	0,2	4,5	5,1
Pvk1	Kevät	1 386	1,5	96	48
Pvk1	Kesä	269	0,2	6,6	11
Pvk1	Alkusyksy	1 053	0,6	46	25
Pvk1	Loppusyksy	86	0,1	3,8	5
Pvk1	Vuosi	339	0,3	12,5	11
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.068	77,6	9 615	5	354	304
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>11 214</i>	<i>6</i>	<i>453</i>	<i>372</i>

5.14.2 Vesistötarkkailu

Paskonevan vedet johdetaan pintavalutuskentältä 1 reittiä laskuoja–Pasko-oja–Ristisenoja–Lamujoki–Siikajoki. Paskonevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Pasko-ojassa Paskonevan yläpuolisella vesistötarkkailupisteellä Pas yp sekä Paskonevan alapuolisella pisteellä Pas ap. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-26.



Kuva 5-26 Paskonevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 20.3., 8.6., 5.7. ja 17.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-56 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Paskonevan ylä- ja alapuolisilla pisteillä Pasko-ojassa (Pas yp ja Pas ap) vesi oli erittäin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat turvetuotantoalueen ylä- ja alapuolella reheviä/erittäin reheviä olosuhteita. Kokonaistyyppipitoisuudet indikoivat yläpuolella lievästi reheviä/reheviä ja alapuolella reheviä olosuhteita. Vedessä oli molemmilla tarkkailupisteillä runsaasti rautaa, ja pitoisuudet olivat korkeimmillaan heinä- ja elokuussa. Myös kiintoainepitoisuudet olivat molemmilla havaintopisteillä korkeimmillaan heinä- ja elokuussa. Paskonevan alapuolisella pisteellä vesi oli selvästi turvetuotantoalueen yläpuolista pistettä heikompilaatuista rauta- ja kokonaistyyppipitoisuuksien osalta. COD_{Mn}-pitoisuudet taas olivat Paskonevan yläpuolisella pisteellä keskimäärin korkeampia. Vesi oli molemmilla pisteillä selvästi heikkolaatuisinta heinä- ja elokuun tarkkailukierroksella.

Pasko-ojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.


Taulukko 5-56 Paskonevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Pasko-oja yp Pas yp (Paskonevan yp)	68791	20.3.2023	6,5	75	26	55	560	250	3 700	4,4
		8.6.2023	6,3	85	36	64	520	320	2 800	4,4
		5.7.2023	6,3	72	35	110	620	370	6 600	10,0
		17.8.2023	6,1	61	66	160	810	600	7 700	26
Pasko-oja ap Pas ap (Paskonevan ap)	68792	20.3.2023	6,7	76	17	68	980	270	7 300	8,0
		8.6.2023	6,9	83	19	60	830	240	5 800	6,3
		5.7.2023	6,8	78	35	170	750	360	20 000	69,0
		17.8.2023	7,0	73	31	100	850	430	12 000	21

Kuvassa 5-27 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset turvetuotantoalueen pintavalutuskentältä 1 lähtevässä vedessä sekä tuotantoalueen ylä- ja alapuolisilla pisteillä Pasko-ojassa (Pas yp ja Pas ap). Näytteet on otettu samoina päivinä edellä esitetyn vesistötarkkailun näytteenoton mukaisesti.

Paskonevalta lähtevässä vedessä oli Pasko-ojan ylä- ja alapuolisia tarkkailupisteitä korkeammat COD_{Mn}- ja kokonaistyyppipitoisuudet. Kokonaisravinne- sekä kiintoainepitoisuuden osalta vesi oli keskimäärin heikompilaatuista Pasko-ojassa

turvetuotantoalueen alapuolella kuin sen yläpuolella. Erot vedenlaadussa voivat johtua ainakin osittain Paskonevan turvetuotantoalueen kuormituksesta.



Kuva 5-27 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Paskonevan pintavalutuskentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Paskonevan ylä- ja alapuolisilla vesistötarkkailupisteillä Pas yp ja Pas ap vuonna 2023.

5.15 Pullinneva

5.15.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Pullinnevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 13 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 48 ha. Laskeutusaltaat puhdistettiin tammi- ja syyskuussa, sarkaojarekenteet syyskuussa sekä reuna- ja kokoojaojat tammikuussa. Tuotantoaikainen (6.6.–22.6.) sadanta oli 17 mm.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 10.1.–14.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä

21, joista kahtena kertana ei saatu otettua näytettä vähäisen virtaaman takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-57.

Pintavalutus kentän 1 vesi oli keskimäärin hapanta. Kiintoainepitoisuus oli hieman alhaisempi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutus kenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Kokonaisfosfori-, kokonaistyyppi- ja COD_{Mn}-pitoisuus oli korkeammalla tasolla kuin vertailukohteilla keskimäärin. Tyypestä noin 40 % ja fosforista noin 60 % esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 5 791 µg/l ja sähkönjohtavuus 5 mS/m. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Pullinnevan ympäristölupamääräyksen mukaan pintavalutus kentältä lähtevässä vedessä on saavutettava vuosikeskiarvona enintään seuraavat pitoisuudet: kiintoaine 10 mg/l, kokonaisfosfori 100 µg/l ja kokonaistyyppi 2 000 µg/l. Pitoisuuksien osalta kaikki lupamääräykset saavutettiin.

Pullinnevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympärivuotisesti. Pullinnevan kesän keskivaluma (7,4 l/s km²) oli pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-57.

Taulukko 5-57 Pullinnevan pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pintavalutus kentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m
Pvk1	Talvi	1.1. - 9.4.	99	4,5	3	6,0	62	76	1867	4,0	6
Pvk1	Kevät	10.4. - 20.5.	41	46	4	5,7	21	37	1425	2,8	4
Pvk1	Kesä	21.5. - 14.9.	117	7	7	5,8	71	107	1740	7,2	5
Pvk1	Alkusyky	15.9. - 31.10.	47	38	4	5,8	42	45	2100	2,9	4
Pvk1	Loppusyky	1.11. - 31.12.	61	2	1	6,1	54	58	1900	6,0	5
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	14	19	5,8	52	71,9	1778	4,8	5
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojitetuilla pvk:llä 2011-2015</i>							34	56	1 610	5,4	

Pullinnevan pintavalutus kentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Kiintoaineen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo hyvä (Taulukko 5-58). Kokonaisfosforin osalta kentän

puhdistusteho oli kohtalainen, ja typen osalta keskimääräinen ainepoistuma jäi heikoksi. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin negatiivinen.

Taulukko 5-58 Pullinnevan pintavalutuskentän 1 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD_{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	3	-115	43	-14	83
Pvk1	Kevät	2	-7,7	34	30	86
Pvk1	Kesä	3	-46	70	41	88
Pvk1	Alkusyky	2	18	33	28	60
Pvk1	Loppusyky	1	-80	42	-12	79
Pvk1	Vuosi	11	-45	29	9	72

Pullinnevan ympäristölupapäätöksen mukaan pintavalutuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot: kiintoaineella 50 %, kokonaisfosforilla 30 % ja kokonaistypellä 15 %. Kiintoaineen osalta kenttä ylsi lupavaateisiin reduktion osalta, mutta ravinteiden osalta lupavaateet jäivät saavuttamatta.


Pullinnevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-59. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat fosforin ja typen osalta pohjoisessa sijaitsevien ojitettujen pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) hieman alhaisemmat, COD_{Mn} osalta hieman korkeammat ja kiintoaineen osalta selvästi alhaisemmat verrattuna vertailukohteisiin. Kokonaiskuormitus oli COD_{Mn} ja typen osalta edellisvuotta korkeampi, ja kiintoaineen sekä fosforin osalta alhaisempi.

Taulukko 5-59 Pullinnevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Talvi	213	0,2	6,6	7,0
Pvk1	Kevät	741	1,4	54	117
Pvk1	Kesä	428	0,5	10,9	38
Pvk1	Alkusyksy	1 222	1,1	76	102
Pvk1	Loppusyksy	88	0,1	3,1	10
Pvk1	Vuosi	451	0,5	21,6	42
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.014	48	7 889	9	380	736
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>6 373</i>	<i>11</i>	<i>300</i>	<i>1 150</i>

5.15.2 Vesistötarkkailu

Pullinnevan pintavalutuskentän 1 vedet johdetaan reittiä Vesioja–Iso-oja–Siikajoki. Pullinnevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Vesiojassa Pullinnevan yläpuolisella tarkkailupisteellä Vesioja yp Ves yp sekä Pullinnevan alapuolisilla pisteillä Vesioja Saarik-Mankila s Ves2. Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 5-28.



Kuva 5-28 Pullinevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytenpisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 15.3., 5.6., 3.7. ja 14.8. Pullinnevan ylä- ja alapuolisilta pisteiltä Ves yp ja Ves2 ei saatu näytteitä maaliskuussa. Keskeisimmät vesistötulokset on esitetty taulukossa 5-60 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Vesi oli kaikilla Pullinnevan vesistötarkkailupisteillä hyvin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää, ja vedenlaatu oli tutkituilta osin heikointa elokuun tarkkailukierroksella. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat jokaisella tarkkailupisteellä erittäin reheviä olosuhteita ja kokonaistyyppipitoisuudet reheviä olosuhteita. Vesiojan happitilanne oli heikoimmillaan heinä- ja elokuussa. Vedessä oli myös

runsaasti kiintoainesta ja rautapitoisuudet olivat korkeita. Vesi oli lievästi happanta/neutraalin tuntumassa. Tutkituilta osin vedenlaatu oli Vesiojan kaikilla pisteillä hyvin samankaltaista läpi tarkkailujakson lukuun ottamatta rautapitoisuuksia, jotka olivat korkeimpia Vesiojan alimmalla pisteellä Iso o. Muuten selviä eroja pisteiden vedenlaadussa ei ollut havaittavissa.


Vesiojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.

Taulukko 5-60 Pullinevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Vesioja yp Ves yp (Pullinevan yp)	87819	15.3.2023						ei näytettä		
		5.6.2023	7,0	82	32	100	890	300	4 000	8,4
		3.7.2023	6,4	39	49	180	940	460	6 600	10,0
		14.8.2023	6,8	56	46	250	1400	580	9 800	16,0
Vesioja Saarik-Mankila s Ves2 (Pullinevan ap)	53490	15.3.2023						ei näytettä		
		5.6.2023	6,9	92	30	100	790	320	5 100	10,0
		3.7.2023	6,4	55	47	190	930	460	6 600	14,0
		14.8.2023	6,7	66	47	180	1200	540	7 900	15
Vesioja Saarikoski Iso o (Pullinevan ap)	53488	15.3.2023	6,3	4	36	160	780	570	15 000	21,0
		5.6.2023	6,9	80	26	93	780	330	6 500	14,0
		3.7.2023	6,5	61	44	190	1000	490	7 800	9,6
		14.8.2023	6,7	58	45	180	1300	640	12 000	21

Kuvassa 5-29 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Pullinnevan pintavalutuskentältä 1 lähtevässä vedessä sekä Vesiojassa Pullinnevan ylä- (Ves yp) ja alapuolisilla tarkkailupisteillä (Ves 2 ja Iso o).

Pullinnevan pintavalutuskentältä 1 lähtevä vesi oli selvästi Vesiojan pisteitä heikompilevää maalis- ja elokuun tarkkailukierroksilla etenkin COD_{Mn}- ja kokonaistyyppipitoisuuksien osalta. Myös kokonaisfosforipitoisuus oli elokuun tarkkailukierroksilla selvästi Vesiojan tarkkailupisteitä korkeampi. Kiintoainepitoisuudet olivat keskimäärin pienempiä Vesiojassa Pullinnevan yläpuolella kuin suon alapuolella, mutta muuten Vesiojan pisteiden vedenlaadussa ei ollut havaittavissa selkeitä eroja. Pullinnevan vesistövaikutuksia on siis tutkituilta osin vaikea arvioida.



Kuva 5-29 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Pullinnevan pintavalutus-kentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Vesiojassa Pullinnevan yläpuolisella vedenlaatupisteellä Ves yp ja alapuolisilla pisteillä Ves2 ja Iso o vuonna 2023.

5.16 Saari-Teerineva (Saarineva)

5.16.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Saari-Teerinevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 28 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli 114,8 ha. Tuotantoa oli 4.6–18.7. välisenä aikana. Laskeutuslaitaita, kokoojaojia sekä pumppaamoja ja pumppausallasta syvennettiin helmikuussa. Lisäksi huhtikuussa selkeytyslaitteisiin laitettiin virtaamansäätöpadot. Ohjuoksutustilanteita oli toukokuun alussa.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 9.1.–13.12. välisenä aikana pintavalutus-kentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 22, joista kuutena kertana ei saatu otettua näytettä poikkeavien virtaamaolosuhteiden

takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-61.

Pintavalutus kentän 1 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaistyyppi- ja kiintoainepitoisuus oli korkeampi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutus kenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä noin puolet esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosfori- ja COD_{Mn}-pitoisuus oli lähes samalla tasolla kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista reilu puolet esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 5 318 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Saari-Teerinevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus 1.1.–21.4. ja 15.5.–28.7. välisenä aikana. Jaksoilla 22.4.–14.5. ja 29.7.–31.12. oli padotusta, joten virtaama on arvioitu läheisen Ahmonsuon valuman avulla. Saari-Teerinevan kesän keskivaluma (12 l/s km²) oli suurempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-61.

Taulukko 5-61 Saari-Teerinevan pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutus kentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l
Pvk1	Talvi	1.1. - 17.4.	107	5,1	3	6,5	22	45	1567	11,1
Pvk1	Kevät	18.4. - 19.5.	32	68	4	6,0	23	28	1195	7,9
Pvk1	Kesä	20.5. - 14.9.	118	12	5	6,5	38	56	1150	12,2
Pvk1	Alkusyky	15.9. - 31.10.	47	29	1	6,3	30	34	2200	1,6
Pvk1	Loppusyky	1.11. - 31.12.	61	4	3	6,5	23	33	1567	3,5
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	16	16	6,3	28	41	1383	8,6
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:llä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3

*1.1.-21.4. ja 15.5.-28.7. oma virtaamamittaus. 22.4.-14.5. ja 29.7.-31.12. padotus, virtaama arvioitu läheisen Ahmonsuon valuman avulla.

Saari-Teerinevan pintavalutus kentän tehoa tarkkailtiin tammikuusta marraskuulle. Kiintoaineen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo hyvä (Taulukko 5-62). Kokonaisfosforin osalta kentän puhdistusteho oli keskinkertainen. Tyyden osalta keskimääräinen ainepoistuma

jäi kohtalaiseksi. Kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin todella matala. Kemiallisen hapenkulutuksen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuudet olivat kuitenkin turvetuotantoalueelle tyypillisellä tasolla (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-62 Saari-Teerinevan pintavalutuskentän 1 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD_{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	3	20	53	33	76
Pvk1	Kevät	2	1,9	36	24	86
Pvk1	Kesä	2	-9	28	20	40
Pvk1	Alkusyksy	0				
Pvk1	Loppusyksy	1	-14	0	5	-22
Pvk1	Vuosi	8	4	41	25	75


Saari-Teerinevan pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-63. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat typen ja kiintoaineen osalta pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) korkeammat. Fosforin osalta ominaiskuormitukset olivat samalla tasolla kuin vertailukohteilla, ja COD_{Mn} osalta vertailukohteita matalammat. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin edellisvuotta korkeampi.

Taulukko 5-63 Saari-Teerinevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Talvi	98	0,2	7,0	48,1
Pvk1	Kevät	1 260	1,2	62	247
Pvk1	Kesä	228	0,6	18,1	133
Pvk1	Alkusyksy	747	0,8	55	40
Pvk1	Loppusyksy	83	0,1	5,9	14
Pvk1	Vuosi	323	0,5	21,4	86
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.037	114,8	13 530	20	896	3 612
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>9 283</i>	<i>11</i>	<i>553</i>	<i>1 142</i>

5.16.2 Vesistötarkkailu

Saari-Teerinevan vedet johdetaan pintavalutuskentältä 1 reittiä laskuoja–Pahkapuro–Siikajoki. Saari-Teerinevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Saari-Teerinevan yläpuolisella tarkkailupisteellä Pahkapurossa (Pahkapuro Saarineva PahkaP) sekä Saari-Teerinevan alapuolisella pisteellä Siikajoessa (Siikajoki Siikaj). Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 5-30.



Kuva 5-30 Saari-Teerinevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 23.3., 5.6., 13.7. ja 14.8. Saari-Teerinevan alapuoliselta pisteeltä Siikaj ei saatu näytettä maaliskuussa. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-64 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Saari-Teerinevan yläpuolisella vesistötarkkailupisteellä PahkaP vesi oli erittäin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat lievästi reheviä olosuhteita maalisi- ja kesäkuussa ja reheviä olosuhteita heinä- ja elokuussa. Rautapitoisuudet olivat suuria. Pahkapuron veden laatu oli selvästi huonointa elokuussa, jolloin kiintoaine-, rauta-, COD_{mn}- ja

kokonaistyyppipitoisuudet sekä väriluku olivat huomattavasti muita tarkkailukierroksia korkeampia, ja veden happipitoisuus oli huono.

Siikajoessa havaintopisteellä Siikaj vesi oli niin ikään erittäin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Pahkapuron tavoin kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat lievästi reheviä olosuhteita kesäkuussa ja reheviä olosuhteita heinä- ja elokuussa. Myös Siikajoessa vedenlaatu oli selvästi huonointa elokuussa, jolloin kiintoaine-, rauta-, COD_{mn}- ja kokonaistyyppipitoisuudet sekä väriluku olivat selvästi muita tarkkailukierroksia korkeampia. Molemmilla pisteillä vesi oli hapanta.

Pahkapuroa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin. Siikajoen tarkkailupiste SiikaJ sijaitsee Siikajoen yläosan vesimuodostumassa, joka on tyypitelty suureksi turvemaiden joeksi (St). Vesistötarkkailutulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (55 µg/l) indikoi tyydyttävää tilaa (40–60 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (667 µg/l) hyvää tilaa (450–900 µg/l). Tarkkailupisteen pH-minimi (5,2) indikoi tyydyttävää tilaa (pH 5,0–5,5).


Taulukko 5-64 Saari-Teerinevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Pahkapuro Saarineva PahkaP (Saarinevan yp)	68201	23.3.2023	6,2	75	28	19	450	230	6 900	2,0
		5.6.2023	5,1	80	36	14	400	290	2 200	1,2
		3.7.2023	5,7	72	47	40	580	450	5 900	8,4
		14.8.2023	5,3	34	92	34	1200	950	20 000	54,0
Siikajoki SiikaJ (Saarinevan ap)	68200	23.3.2023				ei näytettä				
		5.6.2023	5,9	86	34	27	410	270	2 100	2,4
		3.7.2023	5,4	82	49	69	640	420	4 400	4,4
		14.8.2023	5,2	73	72	68	950	690	8 700	15,0

Kuvassa 5-31 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset turvetuotantoalueen pintavalutuskentältä 1 lähtevässä vedessä, tuotantoalueen yläpuolella Pahkapurossa (PahkaP) sekä tuotantoalueen alapuolella Siikajoessa (SiikaJ). Näytteet on otettu samoina päivinä edellä esitetyn vesistötarkkailun näytteenoton mukaisesti.

Turvetuotantoalueen pintavalutuskentältä 1 lähtevän veden kokonaistyyppipitoisuudet olivat tutkituilta osin korkeampia kuin vesistötarkkailupisteillä

turvetuotantoalueen ylä- ja alapuolella. Myös vesistöpisteiden tuloksia suurempia pitoisuuksia mitattiin kokonaisfosforin ja kiintoaineen osalta maalisk- ja kesäkuussa. Turvetuotantoalueen vaikutusta sen alapuoliseen vesistöön on kuitenkin tutkituilta osin vaikea arvioida, sillä alapuolinen piste sijaitsee isossa Siikajoessa, johon kohdistuu runsaasti muutakin kuormitusta koko joen valuma-alueelta.



Kuva 5-31 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Saari-Teerinevan pinta-valutuskentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Saari-Teerinevan yläpuolisella vedenlaatupisteellä Pahkapurossa (PahkaP) ja alapuolisella pisteellä Siikajoessa (SiikaJ) vuonna 2023.

5.17 Sauvasuo

5.17.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Sauvasuolla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 22 päivänä. Tuotantokunnossa olevaa aluetta oli vuoden 2023 jälkeen 30,5 ha. Tuotantoaika oli 5.6.–21.7. Alueelle ei tehty kunnossapitotöitä, mutta ympäristötarkastukset tehtiin touko- ja heinäkuussa.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 9.1.–13.12. välisenä aikana pintavalutuskentältä 1. Näytteenottokierroksia oli yhteensä 20, joista yhdeltä kerralta (5.6.) ei ole tuloksia näytepullojen katoamisen takia. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-65.

Pintavalutuskentän 1 vesi oli keskimäärin hapanta. Kokonaistyyppi-, kiintoaine- ja COD_{Mn}-pitoisuus oli korkeampi kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Typestä noin puolet esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosforipitoisuus oli alhaisempi kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista noin kolmasosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 16 390 µg/l. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Sauvasuon virtaamamittari ei useista huolto- ja korjaustoimenpiteistä huolimatta suostunut lähettämään dataa, joten virtaama arvioitiin läheisen Ahmonsuon valuman avulla. Ahmonsuon kesän keskivaluma (10 l/s km²) oli suurempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-65.

Taulukko 5-65 Sauvasuon pvk1 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l
Pvk1	Talvi	1.1. - 20.4.	110	2,3	4	6,0	53	23	1578	8,8
Pvk1	Kevät	21.4. - 16.5.	26	82	3	5,7	25	23	1083	2,2
Pvk1	Kesä	17.5. - 14.9.	121	10	7	5,8	66	44	1421	23,7
Pvk1	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	29	2	5,5	29	23	1300	3,9
Pvk1	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	4	3	5,8	22	17	1077	1,6
Pvk1	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	23	19	5,8	46	30	1334	11,6
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:llä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3

*Virtaama arvioitu läheisen Ahmonsuon valuman avulla.

Sauvasuon pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Kokonaisfosforin osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen korkea (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvo melko hyvä (Taulukko 5-66). Kiintoaineen osalta kentän puhdistusteho oli kohtalainen ja typen osalta heikko. Kemiallisen hapenkulutuksen

(COD_{Mn}) reduktio oli keskimäärin negatiivinen, johon vaikutti selvästi negatiiviset puhdistustehot kesällä ja alkusyksyllä. Mutta kemiallisen hapenkulutuksen osalta kentälle saapuneen veden pitoisuudet olivat kuitenkin lähellä turvetuotantoalueelle tyypillistä tasoa (Liite 2 ja Taulukko 4-2).

Taulukko 5-66 Sauvasuon pintavalutuskentän 1 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	Näyte- määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk1	Talvi	3	-72	84	20	74
Pvk1	Kevät	2	15,9	38	30	38
Pvk1	Kesä	2	-138	41	-30	-91
Pvk1	Alkusyky	1	-18	69	8	80
Pvk1	Loppusyky	2	-18	68	17	78
Pvk1	Vuosi	10	-60	66	12	32


Sauvasuon pintavalutuskentän 1 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-67. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat typen ja fosforin osalta pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) hieman alhaisemmat, ja COD_{Mn} ja kiintoaineen osalta vertailukohteita korkeammat. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin edellisvuotta korkeampi.

Taulukko 5-67 Sauvasuon pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Talvi	103	0,0	3,1	16,7
Pvk1	Kevät	1 789	1,5	70	147
Pvk1	Kesä	572	0,4	15,2	194
Pvk1	Alkusyky	771	0,6	35	124
Pvk1	Loppusyky	77	0,1	4,1	7
Pvk1	Vuosi	460	0,3	16,1	97
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.033	30,5	5 119	4	179	1 079
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>3 184</i>	<i>3</i>	<i>120</i>	<i>585</i>

5.17.2 Vesistötarkkailu

Sauvasuon vedet johdetaan laskuojan kautta Siikajokeen. Sauvasuolta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Siikajoessa Sauvasuon yläpuolisella pisteellä Siikajoki 3 p SiiSau sekä Sauvasuon alapuolisella pisteellä Siikajoki Haarala SiiHa. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa 5-32.



Kuva 5-32. Sauvasuon päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 23.3., 5.6., 3.7. ja 14.8. Sauvasuon yläpuoliselta tarkkailupisteeltä SiiSau ei saatu näytettä maaliskuussa. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-68 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.


Vesi oli molemmilla Siikajoen vesistötarkkailupisteillä hyvin tummaa, runsaasti orgaanista ainesta sisältävää ja rautapitoista. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita ja kokonaistyyppipitoisuudet lievästi reheviä/reheviä olosuhteita. Vedenlaatu oli selvästi heikointa elokuun tarkkailukierroksella. Siikajoen vesi oli huonompilaatuista Sauvasuon yläpuolisella pisteellä SiiSau kaikkien parametrien osalta, lukuun ottamatta kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuutta.

Siikajoen tarkkailupisteet sijaitsevat Siikajoen yläosan vesimuodostumassa, joka on tyypitelty suureksi turvemaiden joeksi (St). Vesistötarkkailutulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimejä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Molemmilla Siikajoen vesistötarkkailupisteillä keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet (SiiSau ja SiiHa 55 µg/l) indikoivat tyydyttävää tilaa (40–60 µg/l) ja keskimääräiset kokonaistyyppipitoisuudet (SiiSau 660 µg/l ja SiiHa 648 µg/l) hyvää tilaa. Sauvasuon yläpuolisella pisteellä SiiSau pH-minimi (5,2) indikoi tyydyttävää tilaa (5,0–5,5) ja alapuolisella pisteellä SiiHa erinomaista tilaa (pH >5,7).

Taulukko 5-68 Sauvasuon alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Siikajoki 3 p SiiSau (Sauvasuon yp)	69520	23.3.2023				ei näytettä				
		5.6.2023	5,6	86	35	29	410	270	2 000	1,6
		3.7.2023	5,5	81	48	66	610	420	4 300	5,6
		14.8.2023	5,2	66	73	69	960	690	8 700	15,0
Siikajoki Haarala SiiHa (Sauvasuon ap)	27999	23.3.2023	6,7	75	19	43	420	190	3 000	3,0
		5.6.2023	6,3	87	31	33	770	260	2 300	3,6
		3.7.2023	6,4	84	39	72	570	370	4 700	4,4
		14.8.2023	5,8	71	63	73	830	590	7 400	15,0

Kuvassa 5-33 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Sauvasuon pintavalutuskentältä 1 lähtevässä vedessä, sekä Sauvasuon ylä- (SiiSau) ja alapuolisilla (SiiHa) pisteillä Siikajoessa. Sauvasuon pintavalutuskentältä lähtevä vesi oli COD_{Mn}-, kokonaistyyppi- ja kiintoainepitoisuuksien osalta Siikajoen vettä heikkolaa-tuisempaa. Turvetuotantoalueen vaikutuksia alapuoliseen vesistöön on kuitenkin vaikea arvioida, sillä Sauvasuon yläpuolisen vesistöhavaintopisteen SiiSau vedenlaatu oli osittain jopa huonompaa kuin Sauvasuon alapuolisella havaintopisteellä SiiHa. Lisäksi Siikajoen vesistötarkkailupisteet sijaitsevat usean kilometrin päässä Sauvasuolta, ja Siikajokeen kohdistuu paljon kuormitusta myös muualta sen valuma-alueelta.



Kuva 5-33 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Sauvasuon pintavalutus-kentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Sauvasuon ylä- (Siikajoki 3 p, SiiSau) ja alapuolisilla (Siikajoki Haarala, SiHa) pisteillä Siikajoessa vuonna 2023.

5.18 Tahkoneva

5.18.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Tahkonevalla tuotettiin vuonna 2023 jyrshinturvetta 9 päivänä. Tuotannossa olevaa aluetta oli vuonna 2023 141,4 ha. Laskeutusaltaat sekä virtaamansäätöpatojen rakenteet puhdistettiin tammi- ja loka-marraskuussa. Sarkaojat puhdistettiin touko-, heinä- ja loka-marraskuussa. Lisäksi alueella tehtiin peruskunnossapitotöitä heinä- ja marraskuussa. Tuotantoaikainen (12.6.–12.8.) sadanta oli 260 mm Peuranevan sääasemalla.

Tuotantoalueella toteutettiin vuonna 2023 tarkkailua ympärivuotisesti, 10.1.–14.12. välisenä aikana pintavalutus kentältä 2 ja laskeutusaltaalta. Näytteenotto-kerroksia oli yhteensä 20, joista yhtenä kertana ei saatu otettua vähäisen virtaaman takia. Kuivatusvesien pumppausta tehtiin pintavalutus kentälle 17.5.–1.11. välisenä aikana. Osa vesistä kulkeutuu painovoimaisesti pintavalutus kentälle

ympäri vuotisesti. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-69.

Lisäksi Tahkonevan kosteikolla toteutettiin tarkkailua touko-syyskuussa, 10.5.–20.9. välisenä aikana. Näytteenottokierroksia oli viisi, joista neljänä saatiin otettua näytteet. Keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-70.

Laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän 2 vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaistyyppi-, kiintoaine- ja COD_{Mn}-pitoisuus oli korkeampia kuin pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutuskenttien vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Tyypestä reilu kolmasosa esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosforipitoisuus oli lähes samalla tasolla kuin vertailukohteilla keskimäärin. Fosforista noin 60 % esiintyi epäorgaanisessa muodossa. Vuoden 2023 keskimääräinen rautapitoisuus oli 10 342 µg/l ja sähkönjohtavuus 6,6 mS/m. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kosteikon vesi oli keskimäärin lievästi hapanta. Kokonaisravinne-, kiintoaine- ja COD_{Mn}-pitoisuus oli matalampia kuin pohjoisessa sijaitsevien kosteikkokohteiden vuosien 2011–2015 keskiarvopitoisuus (Pöyry Finland Oy 2016). Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Tahkonevan ympäristölupamääräyksen mukaan pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä on saavutettava vuosikeskiarvona enintään 9 mg/l kiintoaineen pitoisuus. Tahkonevan lähtevän veden kiintoaineen vuosikeskiarvopitoisuus oli 14,2 mg/l, joten lupamääräys ei täyttnyt.

Tahkonevalla oli käytössä oma jatkuvatoiminen virtaamamittaus ympäri vuotisesti. Tahkonevan kesän keskivaluma (2,2 l/s km²) oli selvästi pienempi verrattuna Siikajoen kesän keskimääräiseen keskivalumaan (8,8 l/s km²) (Taulukko 4-1). Eri tarkkailujaksojen keskivalumat on esitetty taulukossa 5-69.

Taulukko 5-69 Tahkonevan la ja pvk2 keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte-määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m
la/pvk2	Talvi	1.1. - 9.4.	99	4,9	3	6,5	19	53	777	24,3	
la/pvk2	Kevät	10.4. - 26.5.	47	56	4	6,3	23	37	1625	7,8	6
pvk2	Kesä	27.5. - 14.9.	111	2	6	6,4	42	32	1087	12,7	7
pvk2	Alkusyksy	15.9. - 31.10.	47	20	4	6,1	37	31	2350	9,8	6
la/pvk2	Loppusyksy	1.11. - 31.12.	61	3	2	6,5	19	48	815	25,5	
la/pvk2	Vuosi	1.1. - 31.12.	365	12	19	6,3	31	38	1388	14,2	7
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:illä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3	

Taulukko 5-70 Tahkonevan kosteikon keskivalumat ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023.

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte-määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l
kosteikko	Kevät	10.4. - 26.5.	47	7	1	6,7	20	26	880	2,4
kosteikko	Kesä	27.5. - 14.9.	111	3	2	6,7	34	33	915	7,9
kosteikko	Alkusyksy	15.9. - 30.9.	16	15	1	6,9	26	27	790	5,6
kosteikko	Tarkkailukausi	1.5. - 30.9.	153	6	4	6,7	28	30	875	6,0
<i>Keskimääräiset pitoisuudet kosteikkokohteilla 2011-2015</i>							41	64	1 545	8,6

Tahkonevan pintavalutuskentän tehoa tarkkailtiin koko vuoden ajan. Kaikkien aineiden osalta kentälle saapuneen veden pitoisuus oli verrattaen matala (Liite 2), ja reduktion vuosikeskiarvot olivat heikolla tai tyydyttävällä tasolla (Taulukko 5-71). Kokonaisfosforin ja typen osalta kentän puhdistusteho oli tyydyttävä, kiintoaineen osalta heikko ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD_{Mn}) reduktio oli negatiivinen.

Taulukko 5-71 Tahkonevan pintavalutuskentän 2 ainepitoisuuksien reduktioprosentit vuonna 2023.

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	Näyte-määrä	COD _{Mn} %	Kok.P %	Kok.N %	Kiintoaine %
Pvk2	Talvi	3	5	-59	30	-14
Pvk2	Kevät	2	5,3	-7	11	17
Pvk2	Kesä	3	-37	64	-49	49
Pvk2	Alkusyksy	2	9	24	27	19
Pvk2	Loppusyksy	2	-6	-60	21	-176
Pvk2	Vuosi	12	-7	18	13	5


Tahkonevan pintavalutus kentän 2 vuoden 2023 ominaiskuormitukset ja kokonaiskuormitus on esitetty taulukossa 5-72. Vuoden keskimääräiset ominaiskuormitukset olivat COD_{Mn} ja fosforin osalta pohjoisessa sijaitsevien ojittamattomien pintavalutus kenttien vuosien 2011–2015 keskiarvoja (Taulukko 4-4) alhaisemmat, ja kiintoaineen osalta vertailukohteita korkeammat. Typen osalta ominaiskuormitus oli samalla tasolla kuin vertailukohteilla. Kokonaiskuormitus oli kaikilta osin edellisvuotta korkeampi, lukuun ottamatta COD_{Mn} matalampaa pitoisuutta.

Taulukko 5-72 Tahkonevan laskeutusaltaan/pintavalutus kenttä 2:n ominaiskuormitukset (g/ha/d), sekä kokonaiskuormitus (kg/a) vuosina 2023 ja 2022.

Tarkkailu- piste	Tarkkailu- jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
la/pvk2	Talvi	83	0,2	3,7	97,5
la/pvk2	Kevät	1 479	2,2	102	591
pvk2	Kesä	76	0,0	2,3	13
pvk2	Alkusyksy	617	0,6	39	184
la/pvk2	Loppusyksy	55	0,1	2,5	78
la/pvk2	Vuosi	286	0,4	17,5	127
Vesistöalue	Pinta-ala (ha)	Kokonaiskuormitus, kg/a			
57.029	145	16 724	22	1036	7 236
<i>Kokonaiskuormitus (kg/a) 2022</i>		<i>17 283</i>	<i>18</i>	<i>958</i>	<i>4 438</i>

5.18.2 Vesistötarkkailu

Tahkonevan vedet laskevat laskuojan, Tahkonevan kosteikon sekä kunnan kosteikkojen kautta Kurunkanavaan ja siitä Siikajokeen. Tahkonevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin tarkkailuohjelman mukaisesti Tahkonevan alapuolisilla tarkkailupisteillä laskuojassa pisteellä Tahkoneva laskuoja T la ja Kurunkanavassa pisteellä Kurunkanava ku Kk0. Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 5-34.



Kuva 5-34 Tahkonevan päästötarkkailupisteiden ja alueellisen vesistötarkkailun näytepisteiden sijainnit.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 13.3. (T la), 14.4. (Kk0), 7.6., 3.7. ja 16.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-73 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Tahkonevan laskuojassa havaintopisteellä T la veden happipitoisuus oli huono maaliskuussa, välttävä elokuussa ja tyydyttävä kesä- ja heinäkuussa. Rautapitoisuudet olivat hyvin korkeita, ja korkeimmillaan maaliskuu- ja elokuussa. Vesi oli hyvin tummaa ja orgaanisen aineksen määrää indikoiva COD_{Mn}-pitoisuus oli koholla heinäkuussa ja elokuussa. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita ja kokonaistyyppipitoisuudet lievästi reheviä/reheviä olosuhteita. Vedessä oli runsaasti

kiintoainesta, ja pitoisuudet olivat korkeimmillaan maaliskuun ja heinäkuun tarkkailukierroksella.

Kurunkankaan tarkkailupisteellä Kk0 vesi oli hyvin tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. Väriluku oli kuitenkin joka tarkkailukierroksella Tahkonevan laskuojaa pienempi. Vesi oli hyvin rautapitoista, mutta rautaa oli vedessä selvästi vähemmän kuin Tahkonevan laskuojan pisteellä. Kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita, ja pitoisuudet olivat etenkin typen osalta pistettä T la korkeampia. Veden happipitoisuus vaihteli välillä välttävä–erinomainen.

Vesi oli molemmilla Tahkonevan alapuolisilla tarkkailupisteillä lievästi happanta/neutraalin tuntumassa. Tahkonevan laskuojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.

Kurunkanavan vesimuodostuma on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt). Vesistötarkkailutulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (61 µg/l) indikoi välttävää tilaa (60–90 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (943 µg/l) tyydyttävää tilaa (900–1500 µg/l). Tarkkailupisteen pH-minimi (6,6) indikoi erinomaista tilaa (pH >5,7).


Taulukko 5-73 Tahkonevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Tahkoneva, laskuoja T la (Tahkonevan ap)	70527	13.3.2023	6,4	12	15	58	760	780	25 000	43,0
		7.6.2023	6,8	77	22	42	550	440	12 000	12,0
		3.7.2023	7,1	76	31	75	610	820	26 000	45,0
		16.8.2023	6,7	49	40	49	410	690	16 000	26
Kurunkanava ku Kk0 (Tahkonevan ap)	27963	14.3.2023	6,6	65	26	74	1100	370	9 100	5,5
		7.6.2023	7,0	99	26	43	670	270	4 400	6,8
		3.7.2023	6,9	89	35	58	1000	360	5 300	10,0
		16.8.2023	7,1	73	44	70	1000	520	8 700	15

Kuvassa 5-35 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Tahkonevan pintavalutuskentältä 2 lähtevässä vedessä sekä Tahkonevan alapuolisilla havaintopisteillä turvetuotantoalueen laskuojassa (T la) ja Kurunkanavassa (Kk0). Näytteet on

otettu samoina päivinä lukuun ottamatta Kurunkanavan havaintopisteen maaliskuun näytettä, joka otettiin päivää pisteitä T la ja pvk2 myöhemmin.

Pintavalutuskentältä 2 lähteneen veden laatu oli alapuolisten vesistötarkkailupisteiden laatua heikompia COD_{Mn}- ja kokonaistyyppipitoisuuden osalta kesä-, heinä- ja elokuun tarkkailukierroksilla. Tarkkailussa ei ole mukana suoalueen yläpuolista pistettä, joten turvetuotantoalueen vaikutusta alapuoliseen vesistöön on tutkituilta osin vaikea arvioida.



Kuva 5-35 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Tahkonevan pintavalutuskentältä 2 lähteneessä vedessä sekä suon alapuolisilla vesistötarkkailupisteillä T la ja Kk0 vuonna 2023.

5.19 Tervasneva

5.19.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Tervasnevan pintavalutuskentällä tehtiin tarkkailua vuonna 2023 touko-lokuu-kuussa. Tuotantoalueella pidettiin lopputarkastus 28.9.2023 ja ELY:ltä saatiin

17.10.2023 lopputarkastuskertomus, jossa mainitaan, että jälkihoitovaiheen velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa.

Tervasnevan keskeisimmät kuormitustarkkailun vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 5-74. Vedenlaatutulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Taulukko 5-74 Tervasnevan pvk1 keskiarvot ja keskimääräinen vedenlaatu eri tarkkailujaksoilla vuonna 2023, sekä keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pintavalutuskentillä Pohjois-Suomessa vuosina 2011–2015 (Pöyry Finland Oy 2016).

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	Pvm	d	Mq* l/s/km ²	Näyte-määrä	pH	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Kiintoaine mg/l	Sähk.joht. mS/m
Pvk1	Kevät	1.5. - 27.5.	27	38	1	6,0	13	32	1100	1,0	7,7
Pvk1	Kesä	28.5. - 14.9.	110	6	3	6,4	35	164	1207	8,3	10,2
Pvk1	Alkusyky	15.9. - 31.10.	47	47	2	5,4	25	100	1112	6,0	11,3
Pvk1	Tarkkailukausi	1.5.-31.10.	304	13	6	5,8	28	102	1175	5,3	12,4
<i>Keskimääräiset pitoisuudet ojittamattomilla pvk:llä 2011-2015</i>							28	39	1 162	5,3	

*Virtaamatiedot SYKE:n WSFS-vesistömallista 1.5.-24.5. ja 30.-31.10. EHP:n virtaamamittaus 25.5.-29.10.

Tervasnevan pintavalutuskentän tarkkailukauden 2023 ominaiskuormitukset on esitetty taulukossa 5-75.

Taulukko 5-75 Tervasnevan pintavalutuskenttä 1:n ominaiskuormitukset (g/ha/d) tarkkailukaudella 2023.

Tarkkailu-piste	Tarkkailu-jakso	COD _{Mn}	Kok.P	Kok.N	Kiintoaine
g/ha/d					
Pvk1	Kevät	49	0,1	4,2	3,8
Pvk1	Kesä	168	0,6	4,6	22
Pvk1	Alkusyky	848	1,2	45	78
Pvk1	Tarkkailukausi	372	0,7	17,8	38

5.19.2 Vesistötarkkailu

Tervasnevan vedet johdetaan laskuojasta Hanhiojaan ja siitä Siikajokeen. Tervasnevalta lähtevän veden vaikutuksia alapuoliseen vesistöön seurattiin tarkkailuohjelman mukaisesti Tervasnevan alapuolisilla pisteillä Hanhiojassa (Hanhioja alapää Han0) sekä Siikajoessa (Siikajoki Ruukki uusi s Ru us). Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 5-36.



Kuva 5-36 Tervasnevan päästötarkkailupisteen ja alueellisten vesistötarkkailupisteiden sijainti.

Vaikutustarkkailun vesistönäytteet haettiin vuonna 2023 16.3., 6.6., 4.7. ja 15.8. Keskeisimmät vesistötarkkailutulokset on esitetty taulukossa 5-76 ja kokonaisuudessaan liitteessä 3.

Tervasnevan alapuolella Hanhiojassa (Han0) vesi oli erittäin tummaa ja orgaanista ainesta oli runsaasti kesä-, heinä- ja elokuun tarkkailukierroksilla. Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat erittäin reheviä ja kokonaistyyppipitoisuudet reheviä olosuhteita. Veden rautapitoisuudet olivat korkeita ja pH oli neutraalin tuntumassa. Happipitoisuus oli välttävällä tasolla kesäkuuta lukuun ottamatta, jolloin happitilanne oli erinomainen. Hanhiojan vesi oli selvästi heikkolaatuisinta heinä- ja elokuun tarkkailukierroksilla.

Siikajoen pisteellä (Ru us), Tervasnevan ja Hanhiojan alapuolella veden laatu ei vaihdellut yhtä paljon tarkkailukierrosten välillä, ja vesi oli keskimäärin Hanhiojaa

parempilaatuista. Vesi oli tummaa ja runsaasti orgaanista ainesta sisältävää ja kokonaisravinnepitoisuudet indikoivat reheviä olosuhteita. Vesi oli lievästi hapanta lukuun ottamatta heinäkuun tarkkailukierrosta, jolloin se oli lievästi emäksistä. Veden happipitoisuus vaihteli välillä välttävä-erinomainen.

Tervasnevan alapuolista Hanhiojaa ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi, joten sen tuloksia ei voida verrata jokityyppien luokkarajoihin.


Siikajoen tarkkailupisteet sijaitsevat Siikajoen alaosan vesimuodostumassa, joka on tyypitelty suureksi turvemaiden joeksi (St). Siikajoen vesistötarkkailutulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimejä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (58 µg/l) indikoi tyydyttävää tilaa (40–60 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (749 µg/l) hyvää tilaa (450–900 µg/l). Siikajoen pisteen pH-minimi (6,6) indikoi erinomaista tilaa (pH >5,7).

Taulukko 5-76 Tervasnevan alueellisen vesistötarkkailun keskeisimmät tulokset vuonna 2023.

Tarkkailupiste	Vesla ID	Pvm	pH	Happi %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	Fe µg/l	Kiintoaine mg/l
Hanhioja alapää Han0 (Tervasnevan ap)	50579	16.3.2023	6,9	64	16	120	730	210	4 400	4,8
		6.6.2023	6,9	85	30	99	730	290	3 900	9,2
		4.7.2023	6,9	66	33	240	1200	450	8 900	7,2
		15.8.2023	6,9	65	44	240	840	520	8 400	12
Siikajoki Ruukki uusi s Ru us (Tervasnevan ap)	27869	16.3.2023	6,7	65	21	58	680	220	3 200	4,8
		6.6.2023	6,7	89	24	44	740	190	2 500	5,6
		4.7.2023	7,2	67	22	68	750	210	3 600	3,8
		15.8.2023	6,6	70	30	62	790	270	3 900	5

Kuvassa 5-37 on esitetty keskeisimmät vedenlaatutulokset Tervasnevan pintavalutuskentältä 1 lähtevässä vedessä, ja tuotantoalueen alapuolisilla pisteillä Hanhiojassa (Han0) ja Siikajoessa (Ru us). Pintavalutuskentältä lähtevä vesi oli alapuolisia pisteitä heikompilaatusempaa heinäkuussa COD_{Mn}-, kiintoaine- ja kokonaisravinnepitoisuuksien osalta. Muuten vedenlaatu oli pääasiassa heikointa Hanhiojan pisteellä. Tervasnevan vaikutuksia sen alapuolisiin vesistöihin on tutkituilta osin vaikea arvioida, sillä tarkkailussa ei ole mukana turvetuotantoalueen yläpuolista pistettä. Lisäksi Hanhiojan vesistötarkkailupiste sijaitsee runsaasti ojitetulla

alueella noin 2 kilometriä Tervasnevasta alavirtaan. Myös vaikutuksia Siikajokeen on vaikea arvioida.



Kuva 5-37 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyypipitoisuudet Tervasnevan pintavalituskentältä 1 lähteneessä vedessä sekä Tervasnevan alapuolisilla havaintopisteillä Hanhiohjassa (Han0) sekä Siikajoessa (Ruus) vuonna 2023.

6 Vuosittaisen vesistötarkkailun tulokset 2021–2023

Siikajoen pääuoman ja suurimpien sivuhaarojen vedenlaatua tarkkaillaan vuosittain. Näytteet otetaan taulukon 4-1 mukaisesti neljä kertaa vuodessa: keväällä, kesä-, heinä- ja elokuussa. Tässä kappaleessa tarkastellaan vuosittaisen vesistötarkkailun tuloksia vuosilta 2021–2023. Tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 4.

Taulukko 6-1 Vuosittain toistuvan vesistötarkkailun havaintopaikat

Havaintopaikka	Tunnus	Koordinaatit ETRS-TM35FIN		Vesistöalue (1990)	Kunta
Siikajoki Saarikoski	Si50	7167623	423351	57.014	Siikajoki
Siikajoki Rantsila	Si73	7153974	434954	57.021	Siikalatva
Neittävänjoki Koskenkylä	Ne2	7137561	466861	57.041	Siikalatva
Lamujoki Pulkkilan yläp	Lam18	7127754	444650	57.061	Siikalatva
Savalaja Sa 2	Sa0	7159472	430696	57.072	Siikalatva
Luohuanjoki 86-tien silt	Lu2	7166201	415349	57.081	Siikajoki


6.1 Siikajoki

Siikajoen Saarikosken ja Rantsilan vedenlaatutulokset olivat hyvin samankaltaisia. Pitoisuudet olivat keskimäärin suurempia Saarikosken pisteellä (Kuva 6-1), mikä johtuu luultavimmin siitä, että piste sijaitsee alempana vesistössä.

Siikajoen vedessä oli vuosina 2021–2023 selkeä humusleima, ja vesi oli hyvin tummaa, orgaanista ainesta sisältävää ja selvästi sameaa. Kiintoainepitoisuuksissa oli selvää vaihtelua, ja vedessä oli runsaasti rautaa. Veden laatu oli tyypilliseen tapaan heikoimmillaan loppukesän tarkkailukierrosten aikaan, ja selvästi huonointa vedenlaatu oli elokuun 2022 tarkkailukierroksella.

Siikajoen Saarikosken sekä Rantsilan tarkkailupisteet sijaitsevat Siikajoen alaosan vesimuodostumassa, joka on tyypitelty suureksi turvemaiden joeksi (St). Tarkkailupisteiden vuosien 2021–2023 tulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimejä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019).

Saarikosken havaintopisteellä keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (61 µg/l) indikoi välttävää (60–90 µg/l) ja Rantsilan pisteellä (59 µg/l) tyydyttävää ekologista tilaa (40–60 µg/l). Molemmilla pisteillä keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (Saarikoski 883 µg/l ja Rantsila 855 µg/l) indikoi hyvää ekologista tilaa ja pH-minimit erinomaista ekologista tilaa (>5,7).




Kuva 6-1 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Siikajoen Rantsilan (Si73) ja Saarikosken (Si50) tarkkailupisteillä vuosina 2021–2023. Suurten turvemaiden jokien hyvän ekologisen tilan luokkarajat kokonaisfosforille ja kokonaistypelle on esitetty vihreänä janana.

6.2 Neittävänjoki

Neittävänjoen vedessä oli vuosina 2021–2023 selkeä humusleima, ja vesi oli hyvin tummaa ja silminnähden sameaa. Orgaanisen aineksen pitoisuudet vaihtelivat ollen etenkin loppukesän aikaan koholla ja muuten humuspitoisille vesille tyypillisellä tasolla (Kuva 6-2). Kiintoainepitoisuuksissa oli runsaasti vaihtelua ja vedessä oli runsaasti rautaa. Veden laatu oli tyypilliseen tapaan heikoimmillaan loppukesän tarkkailukierrosten aikaan, ja selvästi huonointa vedenlaatu oli loppukesinä 2021 ja 2023.

Neittävänjoen koskenkylän tarkkailupiste sijaitsee Neittävänjoen vesimuodostuksessa, joka on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt). Tarkkailupisteen vuosien 2021–2023 tulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Neittävänjoen havaintopisteellä keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (108 µg/l) indikoi huonoa (>90 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (973 µg/l) tyydyttävää ekologista tilaa (900–1500 µg/l). pH-minimi indikoi erinomaista ekologista tilaa (>5,7)




Kuva 6-2 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Neittävänjoessa pisteellä Ne2 vuosina 2021–2023. Keskisuurten turvemaiden jokien hyvän ekologisten tilan luokkarajat kokonaisfosforille ja kokonaistypelle on esitetty vihreänä janana.

6.3 Lamujoki

Lamujoen vedessä oli vuosina 2021–2023 selkeä humusleima, ja vesi oli hyvin tummaa ja silminnähden sameaa. Orgaanisen aineksen pitoisuudet vaihtelivat ollen etenkin loppukesän aikaan koholla (Kuva 6-3). Kiintoainepitoisuuksissa oli runsaasti vaihtelua ja vedessä oli runsaasti rautaa. Veden laatu oli tyypilliseen tapaan heikoimmillaan loppukesän tarkkailukierrosten aikaan, ja heikointa vedenlaatu oli loppukesinä 2021.

Lamujoen pulkkilan tarkkailupiste sijaitsee Lamujoen vesimuodostumassa, joka on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt). Tarkkailupisteen vuosien 2021–2023 tulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Lamujoen havaintopisteellä keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (59 µg/l) indikoi tyydyttävää (40–60 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (813 µg/l) hyvää ekologista tilaa (450–900 µg/l). pH-minimi indikoi erinomaista ekologista tilaa (>5,7).




Kuva 6-3 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Lamujoessa pisteellä Lam18 vuosina 2021–2023. Keskisuurten turvemaiden jokien hyvän ekologisen tilan luokkarajat kokonaisfosforille ja kokonaistypelle on esitetty vihreänä janana.

6.4 Savaloja

Savalojan vedessä oli vuosina 2021–2023 selkeä humusleima, ja vesi oli hyvin tummaa, runsaasti orgaanista ainesta sisältävää ja hyvin sameaa (Kuva 6-4). Kiintoainepitoisuuksissa oli runsaasti vaihtelua ja vedessä oli hyvin runsaasti rautaa. Veden laatu oli tyypilliseen tapaan heikoimmillaan loppukesän tarkkailukierrosten aikaan. Veden happipitoisuus oli koko tarkkailujakson yhtä, heinäkuun 2023 näytettä lukuun ottamatta tasolla huono–välttävä.

Savalojan tarkkailupiste sijaitsee Savalojan vesimuodostumassa, joka on tyypiteltä keskiuureksi turvemaiden joeksi (Kt). Tarkkailupisteen vuosien 2021–2023 tulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Savalojan havaintopisteellä keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (129 µg/l) indikoi huonoa (>90 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (1281 µg/l) tyydyttävää ekologista tilaa (900–1500 µg/l). pH-minimi indikoi erinomaista ekologista tilaa (>5,7).




Kuva 6-4 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Savalojassa pisteellä Sa0 vuosina 2021–2023. Keskiuurtien turvemaiden jokien hyvän ekologisen tilan luokkarajat kokonaisfosforille ja kokonaistyyppelle on esitetty vihreänä janana.

6.5 Luohuanjoki

Luohuanjoen vedessä oli vuosina 2021–2023 selkeä humusleima, ja vesi oli hyvin tummaa, runsaasti orgaanista ainesta sisältävää ja selvästi sameaa (Kuva 6-5). Kokonaisfosforipitoisuudet indikoivat erittäin reheviä olosuhteita ja kokonaistyyppipitoisuudet reheviä/erittäin reheviä olosuhteita. Kiintoainepitoisuuksissa oli vaihtelua. Vedessä oli hyvin runsaasti rautaa ja sen pH vaihteli ollen lievästi hapanta tai neutraalin tuntumassa. Veden laatu oli tyyppilliseen tapaan heikoimmillaan loppukesän tarkkailukierrosten aikaan, ja heikointa vedenlaatu oli elokuussa 2022.

Luohuanjoen tarkkailupiste sijaitsee Luohuanjoen vesimuodostumassa, joka on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt). Tarkkailupisteen vuosien 2021–2023 tulosten keskimääräisiä kokonaisravinnepitoisuuksia ja pH-minimiä verrattiin kyseisen jokityypin vedenlaadun luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Luohuanjoen havaintopisteellä keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (108 µg/l) indikoi huonoa (>90 µg/l) ja keskimääräinen kokonaistyyppipitoisuus (1300 µg/l) tyydyttävää ekologista tilaa (900–1500 µg/l). pH-minimi indikoi erinomaista ekologista tilaa (>5,7).



Kuva 6-5 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppipitoisuudet Luohuanjoessa pisteellä Lu2 vuosina 2021–2023. Keskiarvojen turvamaiden jokien hyvän ekologisen tilan luokkarajat kokonaisfosforille ja kokonaistypelle on esitetty vihreänä janana.

7 ELY-keskuksen seurantatulokset, vesistöhaittailmoitukset sekä muut selvitykset

7.1 ELY-keskuksen seurantatulokset


Siikajoen tarkkailuohjelman mukaan ELY-keskuksen seurantatuloksia ja muita vesistön tilaa koskevia selvityksiä tulee hyödyntää laajassa vuosiraportissa. Vuosina 2021–2023 ELY-keskus seurasi vedenlaatua neljällä tarkkailupisteellä. Näistä kattavimman aineiston omaava tarkkailupiste Siikajoki 8-tien s 11600 valittiin raportin tarkasteluun ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti (Taulukko 7-1).

Havaintopaikka on vuosittaisessa jokien mereen kuljettamien ainemäärien seurannassa. Pisteiden tarkemmat vedenlaatutulokset on esitetty liitteessä 5.

Taulukko 7-1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen seurannan näytteenottopisteet.

Seurantapaikka	Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)		Vesistöalue (1990)	Kunta
	N	E		
Siikajoki 8-tien s 11600	7178564	402804	57.012	Siikajoki
Iso Lamujärvi syväne	7099826	462643	57.064	Pyhäntä
Järvitalonjärvi 2	7150145	450288	57.025	Siikalatva
Mankilanjärvi	7164560	432335	57.024	Siikalatva
Vähä Lamu	7105124	457345	57.063	Siikalatva

Siikajoen tarkkailupisteellä veden happitilanne vaihteli välillä välttävä–erinomainen tarkkailuvuosina 2021–2023. Veden pH vaihteli happaman ja emäksisen välillä (pH 6–7,39) ollen keskimäärin lievästi hapanta. Muun muassa peltolannoituksen ja jätevesien vaikutusta indikoivat sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus vaihtelivat sisävesille tyypillisten ja hieman koholla olevien arvojen välillä (Kuva 7-1). Sulfaattipitoisuudet olivat keskimäärin koholla (3,1–24 mg/l) ja veden väriluku (130–250 mg/l) Pt sekä COD_{Mn}-arvot (20–40 mg/l) indikoivat selvää humusvaikutusta. Kokonaisfosfori- (42–130 µg/l) ja typpipitoisuudet (760–2000 µg/l) olivat reheville vesille tyypillisellä tasolla. Kiintoainepitoisuudet olivat hieman koholla (keskimäärin 15 mg/l) ja rautapitoisuudet olivat keskimäärin korkeita (ka. 3 317 µg/l).



Kuva 7-1 Havaintopisteen Siikajoki 8-tien s 11600 COD_{Mn}-, kiintoaine-, kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- ja kloridipitoisuudet sekä sähkönjohtavuusarvot tarkkailuvuosina 2021–2023.

7.2 Vesistöhaittailmoitukset sekä muut selvitykset

Siikajoen vesistöalueelta ei löytynyt vuosina 2021–2023 tehtyjä vesistöhaittailmoituksia tai muita selvityksiä.

8 Siikajoen turvetuotantoalueen kokonaiskuormitus

Turvetuotantoalueiden vuosipäästöt ja vesistöalueen kokonaiskuormitus on esitetty Siikajoen vesistöalueella sijaitsevien tuotantoalueiden osalta taulukossa 8-1. Vuosikuormitus on ollut vuonna 2023 edellisvuotta suurempaa.

Taulukko 8-1 Siikajoen vesistöalueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden vuosikuormitus vuonna 2023, sekä vesistöalueelle kohdistunut kuormitus vuonna 2022.

Suo	Haltija/ tuottaja	Purku- vesistö	kuntoon- panossa ha	tuotan- nossa ha	tuotanto- kunnossa ha	poistunut tuot. ha	pinta-ala yht. ha	Bruttokuormitus			
								COD _{Mn} kg/a	kok.P kg/a	kok.N kg/a	kiintoaine kg/a
Hevoskorpi	Turveruukki Oy	57.062		92		1,8	93,8	10245	13	432	811
Huhanneva	Turveruukki Oy	57.073		110,5		1,0	112	17 932	12	750	1 633
Huhtineva	Turveruukki Oy	57.018		61,6		15,2	76,8	15 806	16	480	1 154
Jousineva	Neova Oy	57.027	18,8	56,0		19,0	93,8	18 468	44	903	4 916
Jylenneva	Turveruukki Oy	57.068		70,8		1,1	71,9	9 010	18	269	1 763
Järvineva	Turveruukki Oy	57.013		53,3		4,1	57,4	26 196	51	974	2 494
Kivineva, pvk1	Neova Oy	57.028				111	111	18 228	15	699	4 836
la		57.028				2,7	2,7	239	0,6	22	162
PVK1/la		yhteensä				113,3	113	18 467	16	721	4 998
Kivineva, pvk2	Neova Oy	57.069		96,0		0,3	96,29	7 964	13	480	1 460
Korteneva	Neova Oy	57.063		107,8			108	15 012	7,6	356	1 075
Kärjenrimpi	Neova Oy	57.048		280,8			281	23 230	12	849	1 110
Lahnasneva	Turveruukki Oy	57.069		119,9		6,4	126	16 078	25	717	3 799
Mankisenneva	Neova Oy	57.026		264,7			265	49 629	152	1 644	5 336
Paskoneva	Neova Oy	57.068			77,6		77,6	9 615	5,4	354	304
Peuraneva	Turveruukki Oy	57.072		126,1		3,2	129	23 611	40	797	4 273
Pikarineva	Turveruukki Oy	57.071		40,7			40,7	7 432	13	251	1 345
Pullinneva	Turveruukki Oy	57.014		48,0			48	7 889	9,4	380	736
Puronräme	Neova Oy	57.042		252,0	58,0		310	29 855	23	1 180	1 819
Saari-Teerineva	Neova Oy	57.037		114,8			115	13 530	20	896	3 612
Sauvasuo	Neova Oy	57.033			30,5		30,5	5 119	3,8	179	1 079
Savaloneva	Turveruukki Oy	57.073		59,4		4,1	63,5	11 596	20	391	2 098
Tahkoneva, pvk + kos	Turveruukki Oy	57.029		52,0		1,2	53,2	6 406	8,5	397	2 772
PVK kesä, la+kos talvi	Turveruukki Oy	57.029		89,4			89,4	10 318	14	639	4 464
		yhteensä		141,4		1,2	143	16 724	22	1 036	7 236
Vesiläisenneva, kos kesä, la talvi	Turveruukki Oy	57.073		13,1			13,1	1 492	2,5	51	427
Vesiläisenneva, kos kesä, la talvi	Matti Suni / Turveruukki Oy	57.073		24,1		1,4	25,5	2 905	4,9	100	831
Siikajoki yhteensä v. 2023			19	2 133	166	172	2 490	357 805	543	14 190	54 308
Siikajoki yhteensä v. 2022								342 695	436	12 595	49 821

9 Yhteenveto

Vuoden 2023 käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu raportoitiin laajasti tarkkailuohjelman mukaisesti. Laajaan vuosiraporttiin kuului jokavuotisen raportoinnin lisäksi yhteisten vesistöpisteiden tarkkailun raportointi vuosilta 2021–2023, ELY-keskuk- sen seurantatuloksien raportoiminen vuosilta 2021–2023 pisteeltä Siikajoki 8-tien s 11600 sekä vesistöalueelta tulevien ja vesistön tilaa koskevien selvitysten tulos- ten kokoaminen raporttiin.

Siikalatvan Ruukin havaintopisteellä satoi 4 % tavanomaista enemmän. Sadanta oli erityisesti lokakuussa pitkän ajan keskiarvoa huomattavasti suurempaa ja vettä satoi 71 mm enemmän kuin vertailujaksona keskimäärin. Etenkin helmi-, touko- ja kesäkuu olivat tavanomaista kuivempia kuukausia. Siikajoessa loppuvuoden vir- taamat olivat selvästi tavanomaista suurempia. Toukokuussa virtaamat olivat kes- kimäärin hieman pitkän ajan keskiarvoa suurempia ja kesäkuussa hieman pitkän ajan keskiarvoa pienempiä.

Vuonna 2023 tarkkailussa oli 19 turvetuotantoaluetta, joiden yhteenlaskettu kuor- mittava pinta-ala oli 2 490 ha ja vuosikuormitus Siikajoen vesistöalueelle oli yh- teensä 357 805 kg/a orgaanista ainesta (COD_{Mn}), 543 kg/a fosforia, 14 190 kg/a typpeä ja 54 308 kg/a kiintoainetta (Taulukko 8-1).


10 Viitteet

Aroviita, J., Mitikka, S., & Vienonen, S. 2019. Pintavesien tilan luokittelu ja arvi- ointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella. Liite 7.4. Vedenlaatu.

Ilmatieteen laitos 2024. Avoin data <<https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data>> 04/2024

Eurofins Ahma Oy 2019. Siikajoen vesistöalueen turvetuotannon tarkkailu. Päästö- ja vesistötarkkailuohjelma 2020–2024.

SYKE (Suomen ympäristökeskus) 2024. Ympäristöhallinnon avoimet ympäristötie- tojärjestelmät. Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta 4.4.2024



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:

Haltija/tuottaja:

Kunta:

ELY-keskus:

Tarkkailuluokka:

Hevoskorpi, pvk 1 ap mp 1

Turveruukki Oy

Siikalatva

POPELY

Ympärivuotinen

Vesien käsittely:

Vesistöalue:

Purkuvesistö:

Koordinaatit (ETRS TM35FIN):

pvk1 (ojittamaton)

Siikajoki

Luhtaanoja - Lamujoki - Siikajoki (57.062)

7114654-439488, pvk1 ap mp1

Tarkkailupisteen valuma-ala:

Kuormittava ala valuma-alueella:

pvk1

108 ha

93,8 ha







Näytetiedot			Veden laatu								Virtaamatiedot								Kuormitustiedot							
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	pvm	MP	EHP	Q	q	Q	q	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	12.1.23	7,3	22	35	15	740	76	26	1 600	1,4	1.1. - 29.1.	11,0	12,3	491	5,3	1 028	11	209	0,33	0,14	7,0	0,72	0,25	15	13
2	pvk1	14.2.23										30.1. - 18.3.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
3	pvk1	20.3.23										19.3. - 9.4.	-	-	-	-	2,0	0,02	0,18	0,00		0,01			0,04	
4	pvk1	18.4.23	6,5	9,8	26		520				2,2	10.4. - 20.4.	41,0	42,2	13 169	141	7 456	80	677	1,8		36			152	
5	pvk1	25.4.23	6,2	18	26	3	790	210	86	590	1,6	21.4. - 28.4.	37,0	35,6	10 188	109	9 765	105	1 628	2,4	0,24	71	19	7,8	53	145
6	pvk1	4.5.23	6,4	25	31		1 300				1,0	29.4. - 6.5.	35,0	34,1	8 866	95	9 126	98	2 112	2,6		110			84	
7	pvk1	11.5.23	6,5	29	31	6	810	11	5	860	1,1	7.5. - 14.5.	14,0	14,4	897	9,6	1 116	12	300	0,32		8,4			11	
8	pvk1	24.5.23	6,6	33	23		790				1,1	15.5. - 30.5.	11,0	10,9	491	5,3	330	3,5	101	0,07		2,4			3,4	
9	pvk1	8.6.23	6,8	28	17	4	670	16	5	560	1,0	31.5. - 17.6.	4,5	4,9	53	0,56	107	1,1	28	0,02		0,66	0,02	0,00	0,55	0,99
10	pvk1	19.6.23										18.6. - 2.7.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
11	pvk1	5.7.23	6,7	55	64	12	1 300	12	5	1 400	2,0	3.7. - 11.7.	13,0	14,0	745	8,0	741	7,9	378	0,44	0,08	8,9	0,08	0,03	9,6	14
12	pvk1	19.7.23	6,8	53	38		1 200				2,6	12.7. - 24.7.	5,0	5,1	68	0,73	477	5,1	234	0,17		5,3			11	
13	pvk1	31.7.23	6,6	37	41		1 600				2,8	25.7. - 7.8.	34,0	31,3	8 247	88	2 174	23	745	0,83		32			56	
14	pvk1	17.8.23	6,9	52	53	20	1 100	6	10	2 900	8,5	8.8. - 22.8.	11,0	11,3	491	5,3	74	0,79	36	0,04	0,01	0,75	0,00	0,01	2,0	5,8
15	pvk1	30.8.23	6,8	38	37		910				2,0	23.8. - 14.9.	10,0	10,8	387	4,1	689	7,4	242	0,24		5,8			13	
16	pvk1	18.9.23	6,8	31	33	9	790	13	9	1 200	2,8	15.9. - 24.9.	22,0	22,4	2 777	30	2 941	32	844	0,90	0,26	22	0,35	0,25	33	76
17	pvk1	3.10.23	6,5	31	31		1 600				2,2	25.9. - 13.10.	33,0	30,4	7 654	82	3 636	39	1 044	1,0		54			74	
18	pvk1	26.10.23										14.10. - 31.10.	-	-	-	-	959	10	275	0,28		14			20	
19	pvk1	7.11.23	7,1	21	50	26	860	140	200	2 200	2,0	1.11. - 23.11.	18,5	18,9	1 801	19	770	8,3	150	0,36	0,19	6,1	1,00	1,4	16	14
20	pvk1	11.12.23										24.11. - 31.12.	1,0	1,6	1,2	0,01	8,9	0,09	1,7	0,00		0,07			0,16	
TALVI n= 1		keskiarvo keskihajonta	7,3	22	35	15	740	76	26	1 600	1,4	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d		5,3	302	3,2	61	0,10 0,04	0,14	2,1 0,67	0,72	0,25	15	3,9 1,1	
KEVÄT n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,4	20 8,4	29 2,9	4 2	855 325	111 141	46 57	725 191	1,5 0,55	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d		89	7 098	76	1 147	1,8 0,50	0,24	55 23	19	7,8	53	107 41	
KESÄ n= 7		keskiarvo keskihajonta	6,7	42 11	39 16	12 8,1	1 081 320	11 5,1	6,7 2,9	1 620 1 185	2,9 2,6	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d		16	562	6,0	209	0,21 0,11	0,02	6,7 4,1	0,03	0,01	3,1	13 7,5	
ALKUSYKSY n= 2		keskiarvo keskihajonta	6,6	31 0,00	32 1,4	9,4 573	1 195 573	13	9,2	1 200	2,5 0,42	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d		56	2 505	27	719	0,73 0,27	0,26	32 20	0,35	0,25	33	55 32	
LOPPUSYKSY n= 1		keskiarvo keskihajonta	7,1	21	50	26	860	140	200	2 200	2,0	LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d		3,9	296	3,2	58	0,14 0,08	0,19	2,4 0,99	1,00	1,4	16	5,5 2,7	
VUOSI n= 15		keskiarvo keskihajonta	6,6	32 13	36 12	12 8	999 333	60 76	43 69	1414 813	2,3 1,8	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d		32	1 530	14	299	0,39 0,15	0,13	13 6,7	1,8	0,94	15	24 12	

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

- 14.2. ei virtaamaa, ei näytettä. Nollavirtaamajakso 30.1.-18.3.
- 20.3. ei virtaamaa, ei näytettä. Jakson 19.3.-9.4. kuormitus laskettu 18.4. näytteen tulosten perusteella.
- 19.6. Ei virtaamaa, ei näytettä. Nollavirtaamajakso 18.6.-2.7.
- Sys-lokakuun näytteenotot viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.
- 26.10. Ei virtaamaa, ei näytettä. Jakson 14.10.-31.10. kuormitus laskettu 3.10. näytteen pitoisuuksilla, sillä jakson muina päivinä on virtaamaa.
- 11.12. Virtaama niin pieni, ettei saatu edustavaa näytettä. Jakson 24.11.-31.12. kuormitus laskettu 7.11. näytteen pitoisuuksilla.

Hevoskorpi, pvk 1 ap mp 1
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Hourunneva pvk1 mp																											
Haltija/tuottaja:	Turveruukki Oy		Vesien käsittely:		pvk (ojittamaton) kesä, la talvi		Tarkkailupisteen		Lupamääräykset pvk:n käyttöajan keskiarvoina:												 AFRY AF PÖYRY							
Kunta:	Siikalatva		Vesistöalue:		Siikajoki		valuma-ala:		33,0 ha		pitoisuus																	
ELY-keskus:	POPELY		Purkuvesistö:		laskuoja-Pakkulanoja-Kurranoja-Siikajoki 57.021		Kuormittava ala		2 ha		kiintoaine		10 mg/l															
Tarkkailuluokka:	Ympäri­vuotinen, jälkihoito		Koordinaatit (ETRS TM35FIN):		7147451-444807, pvk1 ap mp3		valuma-alueella:				Kok.P		100 µg/l															
											Kok.N		1100 µg/l															







Näytetiedot			Veden laatu											Virtaamatiedot								Kuormitustiedot							
Näyte			Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Sulfaatti	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	mg/l		MP	EHP	Q	q	Q	q								
															pvm	cm	cm	m³/d	l/s km²	m³/d	l/s km²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	la	28.2.23	6,2	31	120	110	2 200	14	2000	21 000	38	9,6	5,0		1.1. - 9.4.	4,0		39	1,4	152	5,3	143	0,55	0,51	10	0,06	9,2	97	175
2	la	18.4.23	6,0	14	44		840				3,7	3,5	2,8		10.4. - 21.4.	15,0		1 066	37	802	28	340	1,1		20			90	
3	la	26.4.23	6,1	16	30	5	860	120	360	470	4,0	3,2	5,3		22.4. - 28.4.	52,0		23 855	837	2 762	97	1 339	2,5	0,44	72	10	30	39	335
4	la	3.5.23	6,0	16	39		1 100				1,7	4,1	7,1		29.4. - 4.5.	34,0		8 247	289	1 236	43	599	1,5		41			64	
5	la	8.5.23	5,7	20	54	21	1 400	250	530	2 200	3,3	5,1	7,4		5.5. - 14.5.	12,0		610	21	136	4,8	82	0,22	0,09	5,8	1,0	2,2	9,0	14
6	la	23.5.23	6,5	27	47		1 100				4,4	5,4	5,1		15.5. - 30.5.	5,0		68	2,4	145	5,1	119	0,21		4,8			19	
7	la	8.6.23	6,5	31	53	14	460	5	5	5 200	10,00	4,8	3,2		31.5. - 17.6.	4,0		39	1,4	21	0,74	20	0,03	0,01	0,29	0,00	0,00	3,3	6,4
8	pvk	21.6.23													18.6. - 4.7.	-		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
9	pvk	6.7.23	5,9	31	37	4	830	8	41	4 000	1,0	3,9	5,5		5.7. - 7.7.	3,0	2,0	19	0,67	86	3,0	81	0,10	0,01	2,2	0,02	0,11	10	2,6
10*	pvk	11.7.23	5,6									3,9	6,1		8.7. - 13.7.	-	-	-	-	1,7	0,06	1,6	0,00		0,04			0,05	
11	pvk	18.7.23													14.7. - 23.7.	0,0	0,2	0,00	0,00	133	4,7	125	0,15		3,3			4,0	
12	pvk	31.7.23	5,6	38	29		1 200				1,2	6,4	14		24.7. - 7.8.	11,0	9,6	491	17	526	18	606	0,46		19			19	
13	pvk	17.8.23	6,2	41	71	26	1 000	10	28	5 900	4,7	5,3	6,4		8.8. - 22.8.	3,0	2,8	19	0,67	31	1,1	39	0,07	0,02	0,95	0,01	0,03	5,6	4,5
14	pvk	29.8.23													23.8. - 18.9.	1,0	0,3	1,2	0,04	170	6,0	211	0,37		5,2			24	
15	la	20.9.23	6,2	26	60	40	1 700	710	230	2 700	2,8	7,8	14		19.9. - 26.9.	15,0	16,2	1 066	37	854	30	673	1,6	1,0	44	18	6,0	70	72
16	la	5.10.23	5,8	35	48		1 800				2,4	6,6	12		27.9. - 13.10.	13,0	12,4	745	26	3 868	136	4 102	5,6		211			281	
17	la	23.10.23	5,8	34	42	33	1 700	370	590	2 900	2,5	6,4	7,6		14.10. - 31.10.	6,0	5,9	108	3,8	1 643	58	1 693	2,1	1,6	85	18	29	144	124
18	la	6.11.23	6,1	35	75	62	2 500	330	1600	10 000	15	9,3	6,0		1.11. - 23.11.	8,0	-	221	7,8	169	5,9	179	0,38	0,32	13	1,7	8,2	51	77
19	la	13.12.23	6,2	44	130	110	2 600	19	1800	26 000	23	11	1,4		24.11. - 31.12.	5,0	-	68	2,4	51	1,8	67	0,20	0,17	4,0	0,03	2,8	40	35
TALVI n= 1		keskiarvo keskihajonta	6,2	31	120	110	2 200	14	2 000	21 000	38	9,6	5,0	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			1,4	152	5,3	143	0,55	0,51	10	0,06	9,2	97	175	171
KEVÄT n= 5		keskiarvo keskihajonta	6,0	19	43	13	1 060	185	445	1 335	3,4	4,3	5,5	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			237	624	22	412	0,92	0,25	23	5,0	15	23	90	64
KESÄ n= 5		keskiarvo keskihajonta	5,8	35	48	15	873	7,5	25	5 033	4,2	4,9	7,0	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			3,3	130	4,6	156	0,18	0,02	4,4	0,01	0,02	5,0	11	6,4
ALKUSYKSY n= 3		keskiarvo keskihajonta	5,9	32	50	37	1 733	540	410	2 800	2,6	6,9	11	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			22	2 174	76	2 376	3,3	1,4	123	18	22	120	172	102
LOPPUSYKSY n= 2		keskiarvo keskihajonta	6,1	40	103	86	2 550	175	1 700	18 000	19	10	3,7	LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			5,1	97	3,4	111	0,27	0,23	7,5	0,68	4,9	44	52	49
VUOSI pvk1 n= 4		keskiarvo keskihajonta	5,9	37	46	15	1 010	8,8	35	4 950	2,3	4,9	8,0																
VUOSI n= 16		keskiarvo keskihajonta	5,9	29	59	43	1 419	184	718	8 037	7,8	6,0	6,8	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			76	487	17	442	0,77	0,45	23	2,6	8,5	67	92	77

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittäysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittäysrajalla. = lupamääräys täyttyi = lupamääräys ei täyttynyt

1.1.-30.5. ja 2.11.-31.12. virtaamadata SYKE:n WSFS vesistömallista. 31.5.-1.11. virtaamatiedot EHP.
Alkuvuoden näytteet ovat jääneet ottamatta järjestelmäongelman vuoksi.
28.2. kiintoaineen hehkutushäviö 23 mg/l ja hehkutusjäännös 14 mg/l
21.6. Ei virtaamaa, ei näytettä. Nollavirtaamajakso 18.6.-4.7.
11.7. omavalvontanäyte. Jakson 8.7.-23.7. kuormitustiedot on laskettu 6.7. näytteen tuloksilla.
18.7. Ei virtaamaa, ei näytettä. Jakson 14.7.-23.7. kuormitus on laskettu 6.7. näytteen pitoisuuksilla, sillä virtaamamittauksen mukaan virtaamaa on ollut.
29.8. Ei virtaamaa, ei näytettä. Jakson 23.8.-18.9. kuormitus on laskettu 17.8. näytteenoton tuloksilla, sillä virtaamamittauksen mukaan virtaamaa on ollut.
Pumppaus pintavalutuskentälle 16.6.-19.9.

Syys-lokakuun näytteenotot viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.
Omavalvontanäyte 31.7.2023. pH: 5,38, COD_{Mn}: 37 mg/l, Kiintoaine: 2,8 mg/l, Kok.N: 1300 µg/l, Kok.P: 49 µg/l, SO₄: 14 µg/l. Tulosten analysoinnissa 2 vrk viive.
13.12. kiintoaineen hehkutushäviö 15 mg/l ja hehkutusjäännös 8 mg/l.
Lopputarkastus pidetty.

Hourunneva pvk1 mp
Jälkihoitovaiheen tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023





Kohde:	Huhanneva, pvk 1 ap mp 1			Tarkkailupisteen	Lupamääräykset: vuosikeskiarvona lähtevän veden			
Haltija/tuottaja:	Turveruukki Oy	Vesien käsittely:	pvk1 (ojittamaton)	valuma-ala:	pitoisuus			
Kunta:	Siikalatva, Rantsila	Vesistöalue:	Siikajoki	pvk1	127	ha	pitoisuus	
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	Köyryoja - Savaloja - Kurunkanava - Siikajokii (57.073)	Kuormittava ala	8 mg/l			
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen	Koordinaatit (ETRS TM35FIN):	7135997-429629, Pvk1 ap mp 1	valuma-alueella:	111,5	ha		

Näytetiedot			Veden laatu										Virtaamatiedot						Kuormitustiedot								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	SO ₄	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	pvm	cm	EHP	Q	q	Q	q	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	10.1.23	6,0	26	14	5	910	240	76	1 700	2,0	0,81	1.1. - 26.1.	3,5		28	0,26	928	9,9	190	0,10	0,04	6,6	1,8	0,56	12	15
2	pvk1	14.2.23	6,1	26	31	21	1 000	300	200	3 200	4,3	0,50	27.1. - 26.2.	13,5		819	7,5	406	4,3	83	0,10	0,07	3,2	0,96	0,64	10	14
3	pvk1	13.3.23	6,2	27	12	3	710	230	130	1 800	1,2	0,50	27.2. - 9.4.	2,5		12	0,11	197	2,1	42	0,02	0,00	1,1	0,36	0,20	2,8	1,9
4	pvk1	18.4.23	6,4	19	14		750				1,7		10.4. - 21.4.	12,5		676	6,2	7 329	79	1 096	0,81		43			98	
5	pvk1	26.4.23	6,3	17	18	4	850	150	330	990	3,4	0,60	22.4. - 28.4.	39,0		11 621	106	15 095	162	2 021	2,1	0,49	101	18	39	118	404
6	pvk1	3.5.23	6,1	20	12		1 000				1,0		29.4. - 5.5.	8,0		221	2,0	4 124	44	649	0,39		32			32	
7	pvk1	10.5.23	6,1	22	17	4	1 000	460	24	1 300	1,4	0,98	6.5. - 12.5.	18,0		1 682	15	827	8,9	143	0,11		6,5			9,1	
8	pvk1	24.5.23	6,3	29	15		640				1,0		13.5. - 30.5.	14,0		897	8,2	307	3,3	70	0,04		1,5			2,4	
9	pvk1	8.6.23	6,3	31	9,5	2	540	44	11	1 100	1,0	0,50	31.5. - 13.6.	9,0	8,6	297	2,7	282	3,0	69	0,02	0,00	1,2	0,10	0,02	2,4	2,2
10	pvk1	21.6.23	6,2	32	24		720				2,8		14.6. - 27.6.	3,5	2,9	28	0,26	85	0,91	21	0,02		0,48			1,9	
11	pvk1	6.7.23	6,1	39	21	3	1 600	350	490	1 800	1,0	2,1	28.6. - 11.7.	34,5	36,3	8 553	78	6 708	72	2 060	1,1	0,16	85	18	26	95	53
12	pvk1	18.7.23	6,1	42	15		790				2,2		12.7. - 23.7.	11,0	10,4	491	4,5	1 603	17	530	0,19		10,0			28	
13	pvk1	31.7.23	6,0	47	22		2 000				4,4		24.7. - 7.8.	35,0	35,3	8 866	81	4 182	45	1 548	0,72		66			145	
14	pvk1	17.8.23	6,4	82	25	2	2 000	38	660	9 600	5,6	0,50	8.8. - 22.8.	12,0	11,9	610	5,6	552	5,9	357	0,11	0,01	8,7	0,17	2,9	42	24
15	pvk1	30.8.23	6,5	37	19		860				4,4		23.8. - 14.9.	13,5	13,1	819	7,5	1 275	14	372	0,19		8,6			44	
16	pvk1	18.9.23	6,3	28	15	2	730	43	93	1 500	1,2	0,57	15.9. - 25.9.	25,0	25,1	3 823	35	2 793	30	616	0,33	0,05	16	0,95	2,0	33	26
17	pvk1	5.10.23	6,2	42	33		2 200				4,8		26.9. - 10.10.	24,5	25,4	3 635	33	4 091	44	1 353	1,1		71			155	
18	pvk1	18.10.23	6,0	28	22	3	1 800	480	730	1 600	2,8	1,6	11.10. - 20.10.	28,0	28,1	5 075	46	5 031	54	1 109	0,87	0,12	71	19	29	63	111
19	pvk1	24.10.23	5,9	27	12		1 300				3,2		21.10. - 31.10.	8,0	6,9	221	2,0	1 027	11	218	0,10		11			26	
20	pvk1	7.11.23	6,1	27	29	11	1 600	260	840	3 200	4,6	2,0	1.11. - 23.11.	27,0	-	4 634	42	442	4,7	94	0,10	0,04	5,6	0,90	2,9	11	16
21	pvk1	11.12.23	6,6	25	11	2	750	110	230	2 700	2,8	1,0	24.11. - 31.12.	3,0	-	19	0,17	202	2,2	40	0,02	0,00	1,2	0,17	0,37	4,3	4,4
TALVI		keskiarvo	6,1	26	19	10	873	257	135	2 233	2,5	0,60	TALVI		Bruttokuormitus g/ha d		2,6	461	4,9	95	0,07	0,03	3,3	0,93	0,43	7,7	9,1
n= 3		keskihajonta	0,58	10	10	10	148	38	62	839	1,6	0,18	n= 3		Nettokuormitus g/ha d						0,00		1,5			5,4	
KEVÄT		keskiarvo	6,2	20	15	3,8	900	305	177	1 145	1,9	0,79	KEVÄT		Bruttokuormitus g/ha d		32	7 349	79	1 052	0,92	0,49	48	18	39	118	142
n= 4		keskihajonta	2,1	2,8	0,42	122	219	216	219	219	1,1	0,27	n= 4		Nettokuormitus g/ha d						0,00		19			84	
KESÄ		keskiarvo	6,2	42	19	2,4	1 144	144	387	4 167	2,8	1,0	KESÄ		Bruttokuormitus g/ha d		23	1 745	19	584	0,28	0,06	21	5,8	9,0	45	37
n= 8		keskihajonta	17	5,3	0,64	619	178	337	4 718	1,8	0,92	n= 8		Nettokuormitus g/ha d							0,00		14			24	
ALKUSYKSY		keskiarvo	6,1	31	21	2,6	1 508	262	412	1 550	3,0	1,1	ALKUSYKSY		Bruttokuormitus g/ha d		29	3 222	35	852	0,61	0,08	43	8,7	14	46	83
n= 4		keskihajonta	7,2	9,3	0,71	636	309	450	71	1,5	0,73	n= 4		Nettokuormitus g/ha d							0,11		30			58	
LOPPUSYKSY		keskiarvo	6,3	26	20	6,7	1 175	185	535	2 950	3,7	1,5	LOPPUSYKSY		Bruttokuormitus g/ha d		21	292	3,1	60	0,05	0,02	2,8	0,45	1,3	6,9	8,8
n= 2		keskihajonta	1,4	13	6,1	601	106	431	354	1,3	0,71	n= 2		Nettokuormitus g/ha d							0,00		1,7			6,5	
VUOSI		keskiarvo	6,2	32	19	5	1131	225	318	2541	2,7	1,0	VUOSI		Bruttokuormitus g/ha d		23	1 851	20	441	0,28	0,05	18	3,0	4,8	22	40
n= 21		keskihajonta	14	6,8	6	516	155	292	2 346	1,5	0,60	n= 21		Nettokuormitus g/ha d							0,00		11			26	

Lisätiedot:	= pitoisuus alle määrittäysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittäysrajalla.	= lupamääräys täyttyi	= lupamääräys ei täyttynyt
Oma virtaamamittaus 26.5.-1.11. Muuna aikana virtaama arvioitu Tahkonevan pvk2:n valuman avulla.			
21.6. Ei kunnollista virtaamaa, mikä voi vaikuttaa kyseisten tulosten luotettavuuteen.			
Syys-lokakuun näytteenotot viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.			

Ympäristöluvan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.

Huhanneva, pvk 1 ap mp 1 Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Huhanneva, pvk 1 ap mp 1

Haltija/tuottaja: Turveruukki Oy

Kunta: Siikalatva, Rantsila

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk1 (ojittamaton)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistö: Köyryoja - Savaloja -

Kurunkanava - Siikajokii (57.073)

Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7135771-429810, la 1 ja 2 ap (pvk yp)



Näytetiedot			Veden laatu										Reduktio %									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	SO ₄	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%	
Pvk:n yläpuoli																						
1	pvk1 yp	10.1.23	6,2	40	93	60	2 900	110	1 800	9 300	23	1,4	10.1.23	35	85	92	69	-118	96	82	91	
2	pvk1 yp	14.2.23	6,4	28	100	85	2 100	42	1 800	11 000	39	0,62	14.2.23	7	69	75	52	-614	89	71	89	
3	pvk1 yp	13.3.23	6,3	25	120	87	1 900	16	1 900	15 000	36	0,56	13.3.23	-8	90	97	63	-1338	93	88	97	
4	pvk1 yp	26.4.23	6,0		30	12	1 300	150	650	1 300	5,4	1,3	26.4.23		40	66	35	0	49	24	37	
5	pvk1 yp	10.5.23	6,3	29	61	23	1 700	130	910	3 900	24	1,1	10.5.23	24	72	85	41	-254	97	67	94	
6	pvk1 yp	8.6.23	6,8		55	26	1 100	150	420	6 000	11	0,50	8.6.23		83	92	51	71	97	82	91	
7	pvk1 yp	6.7.23	5,3		70	8	2 200	260	1 200	2 000	45	2,1	6.7.23		70	62	27	-35	59	10	98	
8	pvk1 yp	17.8.23	6,3		86	49	2 200	42	1 400	7 800	8,7	0,97	17.8.23		71	96	9	10	53	-23	36	
9	pvk1 yp	18.9.23	6,3		76	25	2 800	270	1 400	6 200	28	1,4	18.9.23		80	92	74	84	93	76	96	
10	pvk1 yp	18.10.23	5,7		41	5	2 500	230	1 400	1 700	10,0	1,6	18.10.23		46	40	28	-109	48	6	72	
11	pvk1 yp	7.11.23	6,2	26	48	32	2 000	87	1 800	6 000	8,8	1,8	7.11.23	-4	40	66	20	-199	53	47	48	
12	pvk1 yp	11.12.23	6,4	41	68	28	2 500	30	1 800	7 900	13	2,2	11.12.23	39	84	91	70	-267	87	66	78	
TALVI		n= 3 keskiarvo	6,3	31	104	77	2 300	56	1 833	11 767	33	0,86	TALVI	15	82	88	62	-358	93	81	92	
KEVÄT		n= 2 keskiarvo	6,1	29	46	18	1 500	140	780	2 600	15	1,2	KEVÄT	24	62	78	38	-118	77	56	84	
KESÄ		n= 3 keskiarvo	5,8		70	28	1 833	151	1 007	5 267	22	1,2	KESÄ		74	91	25	4	62	21	88	
ALKUSYKSY		n= 2 keskiarvo	5,9		59	15	2 650	250	1 400	3 950	19	1,5	ALKUSYKSY		68	83	52	-5	71	61	89	
LOPPUSYKSY		n= 2 keskiarvo	6,3	34	58	30	2 250	59	1 800	6 950	11	2,0	LOPPUSYKSY	22	66	78	48	-216	70	58	66	
VOUOSI		n= 12 keskiarvo	6,0	32	71	37	2 100	126	1 373	6 508	21	1,3	VOUOSI	-4	74	86	46	-78	77	61	88	
Pvk:n alapuoli																						
1	pvk1 ap	10.1.23	6,0	26	14	5	910	240	76	1 700	2,0	0,81										
2	pvk1 ap	14.2.23	6,1	26	31	21	1 000	300	200	3 200	4,3	0,50										
3	pvk1 ap	13.3.23	6,2	27	12	3	710	230	130	1 800	1,2	0,50										
4	pvk1 ap	26.4.23	6,3		18	4	850	150	330	990	3,4	0,60										
5	pvk1 ap	10.5.23	6,1	22	17	4	1 000	460	24	1 300	1,4	0,98										
6	pvk1 ap	8.6.23	6,3	31	9,5	2	540	44	11	1 100	1,0	0,50										
7	pvk1 ap	6.7.23	6,1	39	21	3	1 600	350	490	1 800	1,0	2,1										
8	pvk1 ap	17.8.23	6,4	82	25	2	2 000	38	660	9 600	5,6	0,50										
9	pvk1 ap	18.9.23	6,3	28	15	2	730	43	93	1 500	1,2	0,57										
10	pvk1 ap	18.10.23	6,0	28	22	3	1 800	480	730	1 600	2,8	1,6										
11	pvk1 ap	7.11.23	6,1	27	29	11	1 600	260	840	3 200	4,6	2,0										
12	pvk1 ap	11.12.23	6,6	25	11	2	750	110	230	2 700	2,8	1,0										
TALVI		n= 3 keskiarvo	6,1	26	19	10	873	257	135	2 233	2,5	0,60										
KEVÄT		n= 2 keskiarvo	6,2	22	18	4	925	305	177	1 145	2,4	0,79										
KESÄ		n= 3 keskiarvo	6,3	51	19	2	1 380	144	387	4 167	2,5	1,0										
ALKUSYKSY		n= 2 keskiarvo	6,2	28	19	3	1 265	262	412	1 550	2,0	1,1										
LOPPUSYKSY		n= 2 keskiarvo	6,3	26	20	6,7	1 175	185	535	2 950	3,7	1,5										
VOUOSI		n= 12 keskiarvo	6,2	33	19	5	1 124	225	318	2 541	2,6	0,97										

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittämissä. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittämissä.

10.1. kiintoaineen hehkutushäviö 16 mg/l ja hehkutusjäännös 6,8 mg/l.

6.7. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 44 mg/l ja hehkutusjäännös 1,0 mg/l

14.2. kiintoaineen hehkutushäviö 20 mg/l ja hehkutusjäännös 19 mg/l.





18.9. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 22 mg/l ja hehkutusjäännös 5,6 mg/l

13.3. kiintoaineen hehkutushäviö 20 mg/l ja hehkutusjäännös 16 mg/l.

Pvk1yp-pisteen COD_{Mn} on jäänyt epähuomiossa määrittämättä huhti-lokakuussa.

10.5. kiintoaineen hehkutushäviö 11 mg/l ja hehkutusjäännös 13 mg/l.

Huhanneva, pvk 1 ap mp 1
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Huhtineva, pvk 1 ap mp 1					Tarkkailupisteen			Lupamääräykset: vuosikeskiarvona lähtevän veden								
Haltija/tuottaja:	Turveruukki Oy	Vesien käsittely:	pvk1 (ojittamaton)			valuma-ala:			pitoisuus								
Kunta:	Siikajoki, Ruukki	Vesistöalue:	Siikajoki			137	ha	pitoisuus									
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	laskuoja - Pesuanoja - Siikajoki (57.018)														
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen	Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7164695-419860, Pvk1 ap mp					Kuormittava ala			7 mg/l							
								valuma-alueella:	76,8	ha	kokonaisfosfori					130	µg/l
											kokonaistyyppi					1500	µg/l







Näytetiedot			Veden laatu											Virtaamatiedot								Kuormitustiedot																
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	SO ₄	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine										
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	mg/l	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d										
1	pvk1	11.1.23												1.1. - 27.1.	0,0		0,00	0,00	1 365	12	289	0,23	0,11	6,4	0,07	0,21	7,9	10,0										
2	pvk1	15.2.23	6,7	29	23	11	640	7	21	790	1,0	16	43	28.1. - 28.2.	6,0		108	0,91	321	2,7	68	0,05	0,03	1,5	0,02	0,05	1,8	2,3										
3	pvk1	16.3.23												1.3. - 9.4.	0,0		0,00	0,00	117	0,99	25	0,02	0,01	0,55	0,01	0,02	0,68	0,86										
4	pvk1	17.4.23	6,2	14	35		510				4,4	8,8		10.4. - 19.4.	30,0		6 031	51	7 844	66	802	2,0		29				252										
5	pvk1	24.4.23	6,4	18	32	8	680	160	72	1 000	4,0	5,5	14	20.4. - 27.4.	27,0		4 634	39	10 179	86	1 337	2,4	0,56	51	12	5,3	74	297										
6	pvk1	2.5.23	5,3	21	30		1 200				2,7	8,4		28.4. - 4.5.	36,0		9 513	80	5 758	49	883	1,3		50				113										
7	pvk1	9.5.23	5,8	15	19	5	600	100	18	470	1,0	13	44	5.5. - 15.5.	36,0		9 513	80	1 149	9,7	126	0,16	0,04	5,0	0,84	0,15	3,9	8,4										
8	pvk1	23.5.23	6,2	20	22		560				1,0	13		16.5. - 24.5.	7,0		159	1,3	895	7,6	131	0,14		3,7				6,5										
9	pvk1	5.6.23	6,3	25	33	15	550	16	18	850	4,8	11	30	25.5. - 9.6.	-		370	3,1	185	1,6	34	0,04	0,02	0,74	0,02	0,02	1,1	6,5										
10	pvk1	21.6.23												10.6. - 27.6.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00										
11	pvk1	3.7.23	6,5	34	42	18	780	10	17	950	1,0	12	29	28.6. - 10.7.	6,5	7,8	132	1,1	1 151	9,7	286	0,35	0,15	6,6	0,08	0,14	8,0	8,4										
12	pvk1	20.7.23	6,4	25	39		610				1,6	16		11.7. - 25.7.	9,5	11,0	340	2,9	945	8,0	172	0,27		4,2				11										
13	pvk1	1.8.23	5,6	14	14		400				1,0	30		26.7. - 6.8.	27,0	21,5	4 634	39	3 323	28	340	0,34		9,7				24										
14	pvk1	14.8.23	6,2	23	36	17	620	7	21	900	1,8	17	58	7.8. - 21.8.	8,5	9,7	258	2,2	517	4,4	87	0,14	0,06	2,3	0,03	0,08	3,4	6,8										
15	pvk1	30.8.23	6,7	39	45		820				1,8	11		22.8. - 14.9.	14,0	15,3	897	7,6	1 116	9,4	318	0,37		6,7				15										
16	pvk1	20.9.23	6,3	18	16	7	430	10	5	410	1,2	25	96	15.9. - 26.9.	21,0	19,7	2 472	21	2 953	25	388	0,34	0,15	9,3	0,21	0,11	8,8	26										
17	pvk1	4.10.23	5,8	40	41		1 100				3,2	13		27.9. - 6.10.	32,5	31,6	7 367	62	3 358	28	981	1,0		27				78										
18	pvk1	10.10.23	5,7	39	31	10	1 400	320	230	1 300	3,2	13	44	7.10. - 10.10.	34,0	30,9	8 247	70	10 489	89	2 986	2,4	0,77	107	24	18	100	245										
19	pvk1*	11.10.23	5,7	31	26		870				1,6	14		11.10. - 20.10.			555	4,7	35 710	302	8 080	6,8		227				417										
20	pvk1	31.10.23	6,0	29	28		950				1,0	17		21.10. - 31.10.	5,0		68	0,58	16 550	140	3 503	3,4		115				121										
21	pvk1	20.11.23												1.11. - 30.11.	0,0		0,00	0,00	347	2,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
22	pvk1	13.12.23	6,6	47	44	12	1 100	12	280	1 200	2,3	14	30	1.12. - 31.12.	6,0		108	0,91	96	0,81	33	0,03	0,01	0,77	0,01	0,20	0,84	1,6										
TALVI n= 1		keskiarvo keskihajonta	6,7	29	23	11	640	7	21	790	1,0	16	43	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d		0,30		536		4,5		113		0,09		0,04		2,5		0,03		0,08		3,1		3,9	
																					0,01				0,55						0,00							
KEVÄT n= 5		keskiarvo keskihajonta	5,8	18	28	6	710	130	45	735	2,6	9,7	29	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d		50		4 959		42		615		1,1		0,26		26		5,4		2,3		33		131	
			3,0	6,8		2	281	42	38	375	1,6	3,2	21	Nettokuormitus g/ha d								0,42		0,26		7,7								95				
KESÄ n= 6		keskiarvo keskihajonta	6,1	27	35	17	630	11	19	900	2,0	16	39	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d		8,0		969		8,2		179		0,22		0,08		4,3		0,04		0,08		4,0		10	
			8,8	11	1,5	154	4,4	2,1	50	1,4	7,3	16		Nettokuormitus g/ha d								0,08		0,73										3,0				
ALKUSYKSY n= 5		keskiarvo keskihajonta	5,8	31	28	8,5	950	165	118	855	2,0	16	70	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d		32		13 833		117		3 101		2,7		0,30		92		6,3		4,5		32		161	
			10	10	2,1	409	219	159	629	1,1	5,8	37		Nettokuormitus g/ha d								0,72		42										60				
LOPPUSYKSY n= 1		keskiarvo keskihajonta	6,6	47	44	12	1 100	12	280	1 200	2,3	14	30	LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d		0,46		223		1,9		16		0,02		0,00		0,38		0,00		0,10		0,41		0,79	
														Nettokuormitus g/ha d								0,00		0,00								0,00		0,00				
VUOSI n= 18		keskiarvo keskihajonta	5,9	27	31	11	768	71	76	874	2,1	14,3	43,1	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d		20		2 875		24		564		0,59		0,07		17		0,83		0,54		6,6		41	
			9,9	9,5	5	283	108	104	295	1,3	5,7	23		Nettokuormitus g/ha d								0,17		0,17		6,6								20				

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittäjäajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittäjäajalla. = lupamääräys täyttyi = lupamääräys ei täyttynyt

Oma virtaamamittaus 25.5.-30.10., muulloin virtaama arvioitu Pullinnevan valuman avulla. Ympäristölupien pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.

11.1. ja 16.3. ei virtaamaa, ei näytteitä.

Huhtineva, pvk 1 ap mp 1 Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Huhtineva, pvk 1 ap mp 1

Haltija/tuottaja: Turveruukki Oy

Kunta: Siikajoki, Ruukki

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk1 (ojittamaton)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistöt: laskuoja - Pesuanoja - Siikajoki (57.018)

Lupamääräykset: vuosikeskiarvona lähtevän veden pitoisuus

pitoisuus

kiintoaine 7 mg/l

kokonaisfosfori 130 µg/l

kokonaistyyppi 1500 µg/l



Näytetiedot			Veden laatu											Reduktio %									
Näyte			Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	SO ₄	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus				mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%
Pvk:n yläpuoli																							
1	pvk1 yp	15.2.23	6,5	20	190	200	920	81	470	8 100	220	18	48	15.2.23	-45	88	95	30	92	96	90	100	
2	pvk1 yp	24.4.23	5,3	21	42	16	1 100	280	320	1 300	8,8	5,2	15	24.4.23	14	24	53	38	43	78	23	55	
3	pvk1 yp	9.5.23	4,9	21	46	12	1 200	140	330	2 000	6,7	15	54	9.5.23	29	59	61	50	29	95	77	85	
4	pvk1 yp	5.6.23	7,1	24	81	49	590	7	7	3 300	9,0	16	38	5.6.23	-4	59	69	7	-122	-165	74	47	
5	pvk1 yp	3.7.23	6,6	45	140	69	1 300	18	42	6 100	28	16	42	3.7.23	24	70	74	40	44	60	84	96	
6	pvk1 yp	14.8.23	6,4	48	120	70	1 200	8	19	6 200	16	18	57	14.8.23	52	70	76	48	10	-11	85	89	
7	pvk1 yp	20.9.23	4,4	31	49	20	1 200	200	270	3 300	24	33	120	20.9.23	42	67	65	64	95	98	88	95	
8	pvk1 yp	10.10.23	4,9	42	45	18	1 900	380	580	2 300	8,8	17	58	10.10.23	7	31	44	26	16	60	43	64	
9	pvk1 yp	13.12.23	7,0	23	110	92	990	82	510	4 700	10,0	16	31	13.12.23	-104	60	87	-11	85	45	74	77	
TALVI	n= 1	keskiarvo	6,5	20	190	200	920	81	470	8 100	220	18	48	TALVI	-45	88	95	30	92	96	90	100	
KEVÄT	n= 2	keskiarvo	5,0	21	44	14	1 150	210	325	1 650	7,8	10	35	KEVÄT	21	42	56	44	38	86	55	68	
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,6	39	114	63	1 030	11	23	5 200	18	17	46	KESÄ	30	67	73	37	0	17	83	86	
ALKUSYKSY	n= 2	keskiarvo	4,6	37	47	19	1 550	290	425	2 800	16	25	89	ALKUSYKSY	22	50	55	41	43	72	69	87	
LOPPUSYKSY	n= 1	keskiarvo	7,0	23	110	92	990	82	510	4 700	10	16	31	LOPPUSYKSY	-104	60	87	-11	85	45	74	77	
VUOSI	n= 9	keskiarvo	5,1	31	91	61	1 156	133	283	4 144	37	17	51	VUOSI	10	66	81	35	46	73	79	94	
Pvk:n alapuoli																							
1	pvk1 ap	15.2.23	6,7	29	23	11	640	7	21	790	1,0	16	43										
2	pvk1 ap	24.4.23	6,4	18	32	8	680	160	72	1 000	4,0	5,5	14										
3	pvk1 ap	9.5.23	5,8	15	19	5	600	100	18	470	1,0	13	44										
4	pvk1 ap	5.6.23	6,3	25	33	15	550	16	18	850	4,8	11	30										
5	pvk1 ap	3.7.23	6,5	34	42	18	780	10	17	950	1,0	12	29										
6	pvk1 ap	14.8.23	6,2	23	36	17	620	7	21	900	1,8	17	58										
7	pvk1 ap	20.9.23	6,3	18	16	7	430	10	5	410	1,2	25	96										
8	pvk1 ap	10.10.23	5,7	39	31	10	1 400	320	230	1 300	3,2	13	44										
9	pvk1 ap	13.12.23	6,6	47	44	12	1 100	12	280	1 200	2,3	14	30										
TALVI	n= 1	keskiarvo	6,7	29	23	11	640	7	21	790	1,0	16	43										
KEVÄT	n= 2	keskiarvo	6,0	17	26	6	640	130	45	735	2,5	9,3	29										
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,3	27	37	17	650	11	19	900	2,5	13	39										
ALKUSYKSY	n= 2	keskiarvo	5,9	29	24	9	915	165	118	855	2,2	19	70										
LOPPUSYKSY	n= 1	keskiarvo	6,6	47	44	12	1 100	12	280	1 200	2,3	14	30										
VUOSI	n= 9	keskiarvo	6,1	28	31	11	756	71	76	874	2,3	14	43										

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

= lupamääräys täyttyi

= lupamääräys ei täyttynyt





15.2. kiintoaineen hehkutushäviö 20 mg/l ja hehkutusjäännös 200 mg/l.

11.1., 16.3. ja 20.11. ei virtaamaa ap pisteellä, ei näytettä yp.

3.7. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 21 mg/l ja hehkutusjäännös 6,8 mg/l.

20.9. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 23 mg/l ja hehkutusjäännös <1 mg/l.

Huhtineva, pvk 1 ap mp 1 Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Järvineva, pvk 1 ap mittakaivo 2 (alempi)

Haltija/tuottaja: Turveruukki Oy

Kunta: Siikajoki, Ruukki

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Ympärivuotinen

Vesien käsittely: pvk1 (ojittamaton)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistö: laskuoja - Siikajoki (57.013)

Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7168381-417752, Pvk 1 ap mittakaivo (alempi)

Tarkkailupistein

valuma-ala: 65 ha

pvk1

Kuormittava ala

valuma-alueella: 57,4 ha



Näytetiedot			Veden laatu											Virtaamatiedot						Kuormitustiedot								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	SO ₄	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	mg/l	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	11.1.23	6,5	41	200	190	2 700	120	1900	6 100	5,2	19	9,4	1.1. - 27.1.	8,0	9,0	221	3,9	1 455	26	917	4,5	4,3	60	2,7	43	137	116
2	pvk1	15.2.23	6,7	43	160		1 700				3,4	16		28.1. - 28.2.	9,5	9,5	340	6,1	437	7,8	289	1,1		11			23	23
3	pvk1	16.3.23	6,7	41	260		2 600				7,6	24		1.3. - 7.4.	6,5	7,0	132	2,3	211	3,8	133	0,84		8,4			25	25
4	pvk1	17.4.23	6,6	27	47		1 200				2,8	4,8		8.4. - 19.4.	22,0	22,5	2 777	49	4 610	82	1 915	3,3		85			199	199
5	pvk1	24.4.23	5,0	25	35		980				4,4	3,0		20.4. - 27.4.	38,0	38,7	10 890	194	11 133	198	4 282	6,0		168			754	754
6	pvk1	2.5.23	5,6	34	70		1 500				3,1	6,8		28.4. - 4.5.	25,0	25,0	3 823	68	4 816	86	2 519	5,2		111			230	230
7	pvk1	9.5.23	6,3	29	120		1 500				2,0	12		5.5. - 18.5.	14,5	15,5	979	17	925	16	413	1,7		21			28	28
8	pvk1	23.5.23	6,4	69	150		1 700				7,5	10		19.5. - 29.5.	7,0	4,9	159	2,8	516	9,2	548	1,2		13			60	60
9	pvk1	6.6.23	6,9	36	150		1 300				4,0	19		30.5. - 12.6.	9,0	9,0	297	5,3	313	5,6	173	0,72		6,3			19	19
10	pvk1	21.6.23	6,6	45	200		1 600				8,0	23		13.6. - 26.6.	5,5	4,8	87	1,5	94	1,7	65	0,29		2,3			12	12
11	pvk1	4.7.23	6,7	50	180		1 900				10	24		27.6. - 11.7.	7,0	6,7	159	2,8	177	3,1	136	0,49		5,2			27	27
12	pvk1	20.7.23	6,7	54	190		1 800				7,5	23		12.7. - 25.7.	7,5	7,0	188	3,4	239	4,3	199	0,70		6,6			28	28
13	pvk1	1.8.23	6,2	90	170		2 600				11	12		26.7. - 7.8.	11,0	12,0	491	8,7	1 051	19	1 456	2,7		42			178	178
14	pvk1	15.8.23	6,6	62	250		1 900				8,7	18		8.8. - 22.8.	9,0	8,8	297	5,3	347	6,2	331	1,3		10			46	46
15	pvk1	31.8.23	6,3	76	140		2 200				5,6	12		23.8. - 14.9.	13,0	13,6	745	13	1 031	18	1 205	2,2		35			89	89
16	pvk1	21.9.23	5,7	100	110		3 300				12	8,7		15.9. - 26.9.	24,0	23,0	3 452	61	1 676	30	2 579	2,8		85			309	309
17	pvk1	4.10.23	5,9	82	94		2 800				2,0	8,9		27.9. - 6.10.	19,5	20,0	2 054	37	3 356	60	4 234	4,9		145			103	103
18	pvk1	10.10.23	6,1	69	84		2 200				5,3	8,7		7.10. - 19.10.	21,0	21,0	2 472	44	12 461	222	13 227	16		422			54	1 016
19	pvk1	31.10.23	6,8	34	270		2 300				5,6	27		20.10. - 31.10.	11,0	10,0	491	8,7	629	11	329	2,6		22			54	54
20	pvk1	20.11.23	6,9	31	230		2 500				5,2	29		1.11. - 30.11.	9,0	8,5	297	5,3	442	7,9	211	1,6		17			35	35
21	pvk1	13.12.23	7,0	36	200		2 500				7,2	28		1.12. - 31.12.	6,0	7,4	108	1,9	202	3,6	112	0,62		7,8			22	22
TALVI n= 3		keskiarvo keskihajonta	6,6 1,2	42 50	207 50	2 333 551					5,4 2,1	20 4,0		TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			4,1	645	11	411	2,0 1,8		24 19			51 41	
KEVÄT n= 4		keskiarvo keskihajonta	5,5 3,9	29 38	68 38	1 295 253					3,1 1,00	6,7 3,9		KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			82	4 596	82	1 961	3,6 2,2		84 49			245 175	
KESÄ n= 8		keskiarvo keskihajonta	6,5 18	60 36	179 36	1 875 392					7,8 2,2	18 5,6		KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			5,4	505	9,0	553	1,3 1,1		16 12			58 50	
ALKUSYKSY n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,0 28	71 88	140 88	2 650 507					6,2 4,2	13 9,1		ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			38	4 965	88	5 541	7,1 5,6		182 144			421 344	
LOPPUSYKSY n= 2		keskiarvo keskihajonta	6,9 3,5	34 21	215 21	2 500 0,00					6,2 1,4	29 0,71		LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			3,6	324	5,8	162	1,1 1,0		12 10,0			29 24	
VUOSI n= 21		keskiarvo keskihajonta	6,0 22	51 68	158 68	190 602	2037 602	120	1900	6100	6,1 2,9	16,0	9,4	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			24	1 546	28	1 250	2,4 2,0	4,3	47 35	2,7	43	137	119 95

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittämissä. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittämissä.

19.1. analyysivalikko muutettu suppeammaksi (PSAVI päätös nro 152/2022).

9.5. K1 sähkönjohtavuus 62 mS/m ja pH 3,9, K2 sähkönjohtavuus 130 mS/m, pH 6,9.

6.6. K1 sähkönjohtavuus 87 mS/m ja pH 3,8, K2 sähkönjohtavuus 380 mS/m, pH 6,6.

4.7. K1 sähkönjohtavuus 110 mS/m ja pH 5,7, K2 sähkönjohtavuus 310 mS/m, pH 6,9.





15.8. K1 sähkönjohtavuus 66 mS/m ja pH 3,9, K2 sähkönjohtavuus 320 mS/m, pH 7,0.

21.9. K1 sähkönjohtavuus 289 mS/m ja pH 3,6, K2 sähkönjohtavuus 84 mS/m, pH 6,1.

Syys-lokakuun näytteenotot viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisten sairastumisen vuoksi.

Ympäristöluvan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.

Järvineva, pvk 1 ap mittakaivo 2 (alempi)
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Järvineva, pvk 1 ap mittakaivo 2 (alempi)
Haltija/tuottaja: Turveruukki Oy
Kunta: Siikajoki, Ruukki
ELY-keskus: POPELY
Tarkkailuluokka: Teho
Vesien käsittely: pvk1 (ojittamaton)
Vesistöalue: Siikajoki
Purkuvesistö: laskuoja - Siikajoki (57.013)
Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7168448-417771, Pvk yp







Näytetiedot			Veden laatu										Reduktio %									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m		%	%	%	%	%	%	%	%	
Pvk:n yläpuoli																						
1	pvk1 yp	11.1.23	6,6	38	310	310	3 300	28	2 600	11 000	14		11.1.23	-8	35	39	18	-329	27	45	63	
2	pvk1 yp	15.2.23	6,8	33	230		2 100				3,6	22	15.2.23	-30	30		19				6	
3	pvk1 yp	16.3.23	6,8	28	300		2 700				6,4	28	16.3.23	-46	13		4				-19	
4	pvk1 yp	24.4.23	5,0	28	75		870				4,4	4,2	24.4.23	11	53		-13				0	
5	pvk1 yp	9.5.23	6,6	28	150		1 700				8,0	14	9.5.23	-4	20		12				75	
6	pvk1 yp	6.6.23	7,2	20	350		2 300				10,0	33	6.6.23	-80	57		43				60	
7	pvk1 yp	4.7.23	6,7	67	200		2 200				20	22	4.7.23	25	10		14				50	
8	pvk1 yp	15.8.23	6,9	58	270		1 800				6,7	19	15.8.23	-7	7		-6				-30	
9	pvk1 yp	21.9.23	5,3	110	99		3 900				7,5	8,4	21.9.23	9	-11		15				-60	
10	pvk1 yp	10.10.23	5,6	68	69		2 400				3,2	7,7	10.10.23	-1	-22		8				-66	
11	pvk1 yp	20.11.23	6,9	27	280		2 900				11	33	20.11.23	-15	18		14				53	
12	pvk1 yp	13.12.23	7,1	30	260		2 800				10,0	32	13.12.23	-20	23		11				28	
TALVI n= 3 keskiarvo			6,7	33	280		2 700				8,0	25	TALVI	-26	26		14				33	
KEVÄT n= 2 keskiarvo			5,2	28	113		1 285				6,2	9,1	KEVÄT	4	31		4				48	
KESÄ n= 3 keskiarvo			6,9	48	273		2 100				12	25	KESÄ	-2	29		19				38	
ALKUSYKSY n= 2 keskiarvo			5,4	89	84		3 150				5,4	8,1	ALKUSYKSY	5	-15		13				-62	
LOPPUSYKSY n= 2 keskiarvo			7,0	29	270		2 850				11	33	LOPPUSYKSY	-18	20		12				41	
VUOSI n= 12 keskiarvo			5,8	45	216		2 414				8,7	20	VUOSI	-5	24		13				28	
Pvk:n alapuoli																						
1	pvk1 ap	11.1.23	6,5	41	200	190	2 700	120	1900	6 100	5,2	19										
2	pvk1 ap	15.2.23	6,7	43	160		1 700				3,4	16										
3	pvk1 ap	16.3.23	6,7	41	260		2 600				7,6	24										
4	pvk1 ap	24.4.23	5,0	25	35		980				4,4	3,0										
5	pvk1 ap	9.5.23	6,3	29	120		1 500				2,0	12										
6	pvk1 ap	6.6.23	6,9	36	150		1 300				4,0	19										
7	pvk1 ap	4.7.23	6,7	50	180		1 900				10	24										
8	pvk1 ap	15.8.23	6,6	62	250		1 900				8,7	18										
9	pvk1 ap	21.9.23	5,7	100	110		3 300				12	8,7										
10	pvk1 ap	10.10.23	6,1	69	84		2 200				5,3	8,7										
11	pvk1 ap	20.11.23	6,9	31	230		2 500				5,2	29										
12	pvk1 ap	13.12.23	7,0	36	200		2 500				7,2	28										
TALVI n= 3 keskiarvo			6,6	42	207		2 333				5,4	20										
KEVÄT n= 2 keskiarvo			5,3	27	78		1 240				3,2	7,5										
KESÄ n= 3 keskiarvo			6,7	49	193		1 700				7,6	20										
ALKUSYKSY n= 2 keskiarvo			5,9	85	97		2 750				8,7	8,7										
LOPPUSYKSY n= 2 keskiarvo			6,9	34	215		2 500				6,2	29										
VUOSI n= 12 keskiarvo			5,9	47	165		2 090				6,3	17										

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittäysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittäysrajalta.

19.1. analyysivalikko muutettu suppeammaksi (PSAVI päätös nro 152/2022).

4.7. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 13 mg/l ja hehkutusjännös 7,6 mg/l.

Järvineva, pvk 1 ap mittakaivo 2 (alempi)
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023





Kohde:	Jousineva, pvk2-3				Lupamääräykset: Pvk 2 ja 3 yhteenlaskettuna vuosikeski-arvona pitoisuus tai virtaamapainotteen teho				AFRY AF POYRY
Haltija/tuottaja:	Neova Oy	Vesien käsittely:	pvk2-3 (ojitettu)	Tarkkailupisteen	101,0 ha		teho %		
Kunta:	Siikalatva	Vesistöalue:	Siikajoki	valuma-ala:					
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	Jousioja-Siikajoki 57.027	Kuormittava ala		Kok.P			
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen	Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7137458-452172, pvk2-3		valuma-alueella:		Kok.N		(*) = arvo tavoitteellinen	
				93,8 ha					

Näytetiedot			Veden laatu											Virtaamatiedot						Kuormitustiedot								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	SO ₄	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	mg/l	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk2-3	11.1.23	6,4	21	80	71	1 800	220	1200	3 000	4,0	8,3	3,9	1.1. - 27.1.	12,0		610	7,0	1 253	14	260	0,99	0,88	22	2,7	15	37	50
2	pvk2-3	15.2.23	6,4	31	60	42	1 300	200	520	2 600	6,0	5,6	1,9	28.1. - 27.2.	17,5	17,4	1 567	18	1 325	15	407	0,79	0,55	17	2,6	6,8	34	79
3	pvk2-3	14.3.23	6,4	34	96	75	1 700	11	1400	7 200	7,6	8,9	1,3	28.2. - 9.4.	12,5	12,0	676	7,7	702	8,0	236	0,67	0,52	12	0,08	9,7	50	53
4	pvk2-3	18.4.23	6,3	18	51		1 000				10,0			10.4. - 21.4.	28,0	28,0	5 075	58	5 658	65	1 008	2,9		56				560
5	pvk2-3	26.4.23												22.4. - 28.4.	-	37,3	10 378	119	10 632	122	1 895	5,4		137				842
6	pvk2-3	3.5.23	6,2	18	52		1 600				6,0			29.4. - 4.5.	25,0	26,5	3 823	44	5 048	58	900	2,6		80				300
7	pvk2-3	8.5.23	6,0	19	53	35	1 200	440	230	2 700	2,6		6,2	5.5. - 14.5.	19,0	18,2	1 925	22	1 702	19	320	0,89	0,59	20	7,4	3,9	45	44
8	pvk2-3	23.5.23	6,6	32	57		780				4,0			15.5. - 26.5.	16,0	16,3	1 253	14	1 461	17	463	0,82		11				58
9	pvk2-3	6.6.23	6,7	28	44	26	550	5	5	2 700	4,4		2,8	27.5. - 12.6.	11,0	14,0	491	5,6	1 036	12	287	0,45	0,27	5,6	0,05	0,05	28	45
10	pvk2-3	20.6.23	6,5	52	89		980				19			13.6. - 26.6.	10,0	11,2	387	4,4	663	7,6	341	0,58		6,4				125
11	pvk2-3	4.7.23	6,5	33	85	52	1 200	11	360	6 400	8,4		6,7	27.6. - 10.7.	17,5	18,7	1 567	18	3 904	45	1 276	3,3	2,0	46	0,43	14	247	325
12	pvk2-3	18.7.23	6,4	70	140		2 000				14			11.7. - 24.7.	13,0	13,8	745	8,5	1 808	21	1 253	2,5		36				251
13	pvk2-3	2.8.23	6,3	49	89		1 600				16			25.7. - 8.8.	18,0	18,5	1 682	19	3 382	39	1 641	3,0		54				536
14	pvk2-3	16.8.23	6,5	52	130	91	1 600	9	520	15 000	19		0,83	9.8. - 21.8.	13,0	13,9	745	8,5	865	9,9	445	1,1	0,78	14	0,08	4,5	128	163
15	pvk2-3	29.8.23	6,6	26	71		720				12			22.8. - 14.9.	18,0	19,2	1 682	19	1 116	13	287	0,78		8,0				133
16	pvk2-3	5.10.23	7,0	24	38		1 400				2,4			15.9. - 14.10.	22,0	21,8	2 777	32	3 630	42	863	1,4		50				86
17	pvk2-3	26.10.23	6,0	28	75	51	1 600	260	640	4 400	4,4		15	15.10. - 31.10.	7,0	8,3	159	1,8	2 301	26	638	1,7	1,2	36	5,9	15	100	100
18	pvk2-3	2.11.23	6,0	26	62		1 800				7,6			1.11. - 3.11.	9,5	10,4	340	3,9	564	6,5	145	0,35		10				42
19	pvk2-3	6.11.23	6,4	9,2	63	53	1 800	140	1300	3 100	4,4	6,7	7,5	4.11. - 19.11.	19,0	20,4	1 925	22	1 412	16	129	0,88	0,74	25	2,0	18	43	62
20	pvk2-3	4.12.23	6,3	22	77	69	1 900	64	1500	3 500	4,7	7,8	5,3	20.11. - 31.12.	12,5	13,0	676	7,7	557	6,4	121	0,42	0,38	10	0,35	8,3	19	26
TALVI n= 3		keskiarvo keskihajonta	6,4 6,8	29 18	79 18	63 265	1 600 115	144 115	1 040 461	4 267 2 548	5,9 1,8	7,6 1,8	2,4	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			11	1 053	12	296	0,80 0,59	0,63	16 11	1,6	10	41	60 50
KEVÄT n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,2 6,8	22 6,8	53 2,6	35 348	1 145 348	440 348	230	2 700	5,7 3,2		6,2	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			62	4 603	53	871	2,4 1,5	0,59	55 32	7,4	3,9	45	348 302
KESÄ n= 7		keskiarvo keskihajonta	6,5 16	44 33	93 33	56 525	1 236 3,1	8,3 264	295 6 311	8 033 5,4	13 3,0		3,4	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			12	1 746	20	740	1,6 1,3	0,97	22 16	0,18	5,7	127	213 200
ALKUSYKSY n= 2		keskiarvo keskihajonta	6,3 2,8	26 26	57 26	51 141	1 500 141	260 141	640	4 400	3,4 1,4		15	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			17	3 178	36	786	1,5 0,85	1,2	46 30	5,9	15	100	91 60
LOPPUSYKSY n= 3		keskiarvo keskihajonta	6,2 8,8	19 8,4	67 11	1 833 58	102 54	1 400 141	3 300 283	5,6 1,8	7,3 0,78	6,4 1,6		LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			11	782	9,0	124	0,54 0,39	0,48	14 10	0,80	11	26	36 28
VUOSI n= 19		keskiarvo keskihajonta	6,3 15	31 27	74 20	57 430	136 145	768 536	5060 3 849	8,2 5,3	7,5 1,3	5,1 4,2		VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			22	1 949	22	540	1,3 0,92	0,70	27 18	1,7	9,6	59	144 126

Lisätiedot:		= pitoisuus alle määrittämissä. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittämissä.		= lupamääräys täyttyi		= lupamääräys ei täyttynyt
1.1.-4.1.	virtaamatiedot SYKE:n WSFS vesistömallijärjestelmästä.					
26.4.	Näytteitä ei saatu otettua hankalien keli vuoksi. Jakson 22.4-28.4. kuormitus on laskettu näytteiden 18.4. ja 3.5. keskiarvolla.					
Syys-lokakuussa	näytteitä on jäänyt hakematta useampien näytteenottajien yhteiskäytön sairastumisen vuoksi.					
24.-25.11. ja 27.-31.12.	virtaamatiedot SYKE:n vesistömallijärjestelmästä, katkos omassa virtaamamittauksessa.					

Ympäristölupaan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.

Jousineva, pvk2-3
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Jousineva, pvk2-3

Haltija/tuottaja: Neova Oy

Kunta: Siikalatva

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk2-3 (ojitettu)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistö: Jousioja-Siikajoki 57.027

Lupamääräykset: Pvk 2 ja 3 yhteenlaskettuna vuosikeski-

arvona pitoisuus tai virtaamapainotteen teho

teho % pitoisuus

kiintoaine 50 7 mg/l

Kok.P 50 (*) 50 (*) µg/l

Kok.N 20 (*) 1400 (*) µg/l (*) = arvo tavoitteellinen



Näytetiedot			Veden laatu											Reduktio %									
Näyte			Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	SO ₄	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o			Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%
Pvk:n yläpuoli																							
1	pvk2 yp	11.1.23		6,4	28	250	240	2 600	34	2 100	16 000	75	9,7	3,2	11.1.23	25	68	70	31	-547	43	81	95
2	pvk2 yp	15.2.23		6,2	40	110	76	1 700	15	1 000	6 800	56	4,3	0,86	15.2.23	23	45	45	24	-1233	48	62	89
3	pvk2 yp	14.3.23		6,5	26	160	160	1 800	21	1 700	13 000	22	7,6	1,5	14.3.23	-31	40	53	6	48	18	45	65
4	pvk2 yp	8.5.23		6,4	25	130	110	1 900	140	1 300	8 300	16		5,2	8.5.23	24	59	68	37	-214	82	67	84
5	pvk2 yp	6.6.23		6,7	28	140	130	1 400	25	910	12 000	21		3	6.6.23	0	69	80	61	80	99	78	79
6	pvk2 yp	4.7.23		6,4	35	130	85	2 400	250	1 100	8 500	20		13	4.7.23	6	35	39	50	96	67	25	58
7	pvk2 yp	16.8.23		6,6	32	180	150	1 900	24	1 200	13 000	21		3,4	16.8.23	-63	28	39	16	63	57	-15	10
8	pvk2 yp	26.10.23		6,3	26	220	190	2 700	62	2 100	15 000	34		5,6	26.10.23	-8	66	73	41	-319	70	71	87
9	pvk2 yp	6.11.23		6,5	20	110	87	2 200	190	1 600	6 900	16	6,3	3,6	6.11.23	54	43	39	18	26	19	55	73
10	pvk2 yp	4.12.23		6,6	25	190	180	2 100	32	1 900	12 000	21	9,8	3,1	4.12.23	12	59	62	10	-100	21	71	78
TALVI n= 3 keskiarvo				6,3	31	173	159	2 033	23	1 600	11 933	51	7,2	1,9	TALVI	9	55	61	21	-516	35	64	88
KEVÄT n= 1 keskiarvo				6,4	25	130	110	1 900	140	1 300	8 300	16		5,2	KEVÄT	24	59	68	37	-214	82	67	84
KESÄ n= 3 keskiarvo				6,5	32	150	122	1 900	100	1 070	11 167	21		6,5	KESÄ	-19	42	54	41	92	72	28	49
ALKUSYKSY n= 1 keskiarvo				6,3	26	220	190	2 700	62	2 100	15 000	34		5,6	ALKUSYKSY	-8	66	73	41	-319	70	71	87
LOPPUSYKSY n= 2 keskiarvo				6,5	23	150	134	2 150	111	1 750	9 450	19	8,1	3,4	LOPPUSYKSY	31	53	54	14	8	20	65	75
VUOSI n= 10 keskiarvo				6,4	29	162	141	2 070	79	1 491	11 150	30	7,5	4,2	VUOSI	3	53	60	29	-72	49	55	78
Pvk:n alapuoli																							
1	pvk2-3 ap	11.1.23		6,4	21	80	71	1 800	220	1200	3 000	4,0	8,3	3,9									
2	pvk2-3 ap	15.2.23		6,4	31	60	42	1 300	200	520	2 600	6,0	5,6	1,9									
3	pvk2-3 ap	14.3.23		6,4	34	96	75	1 700	11	1400	7 200	7,6	8,9	1,3									
4	pvk2-3 ap	8.5.23		6,0	19	53	35	1 200	440	230	2 700	3		6,2									
5	pvk2-3 ap	6.6.23		6,7	28	44	26	550	5	5	2 700	4,4		2,8									
6	pvk2-3 ap	4.7.23		6,5	33	85	52	1 200	11	360	6 400	8,4		6,7									
7	pvk2-3 ap	16.8.23		6,5	52	130	91	1 600	9	520	15 000	19		0,83									
8	pvk2-3 ap	26.10.23		6,0	28	75	51	1 600	260	640	4 400	4		15									
9	pvk2-3 ap	6.11.23		6,4	9,2	63	53	1 800	140	1300	3 100	4,4	6,7	7,5									
10	pvk2-3 ap	4.12.23		6,3	22	77	69	1 900	64	1500	3 500	4,7	7,8	5,3									
TALVI n= 3 keskiarvo				6,4	29	79	63	1 600	144	1 040	4 267	5,9	7,6	2,4									
KEVÄT n= 1 keskiarvo				6,0	19	53	35	1 200	440	230	2 700	2,6		6,2									
KESÄ n= 3 keskiarvo				6,5	38	86	56	1 117	8,3	295	8 033	11		3,4									
ALKUSYKSY n= 1 keskiarvo				6,0	28	75	51	1 600	260	640	4 400	4,4		15									
LOPPUSYKSY n= 2 keskiarvo				6,4	16	70	61	1 850	102	1 400	3 300	4,6	7,3	6,4									
VUOSI n= 10 keskiarvo				6,3	28	76	57	1 465	136	768	5 060	6,6	7,5	5,1									

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

= lupamääräys täyttyi

= lupamääräys ei täyttnyt

11.1. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 32 mg/l ja hehkutusjäännös 43 mg/l.

16.8. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 14 mg/l ja hehkutusjäännös 7,5 mg/l.

Pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen on tarkasteltu alapuolisen tarkkailupisteen tuloslakanalla.

15.2. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 16 mg/l ja hehkutusjäännös 40 mg/l

16.10. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 16 mg/l ja hehkutusjäännös 18 mg/l.





14.3. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 11 mg/l ja hehkutusjäännös 11 mg/l

4.12. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 12 mg/l ja hehkutusjäännös 8,8 mg/l.

6.6. pvk2 yp ja ap pisteiltä ei otettu Kok.P eikä PO4-P.

4.7. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 15 mg/l ja hehkutusjäännös 4,8 mg/l.

Jousineva, pvk2-3
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:

Jylenneva, pvk 1 ap mp

Haltija/tuottaja:

Turveruukki Oy

Kunta:

Siikajoki, Ruukki

ELY-keskus:

POPELY

Tarkkailuluokka:

Kesäaikainen

Vesien käsittely:

pvk1 (ojittamaton)

Vesistöalue:

Siikajoki

Purkuvesistö:

Ristisenoja - Lamujoki - Siikajoki (57.068)

Koordinaatit (ETRS TM35FIN):

7105731-448429, Pvk 1 ap mp

Tarkkailupisteen

valuma-ala:

pvk1

89

ha

Kuormittava ala

valuma-alueella:

71,9

ha







Näytetiedot			Veden laatu								Virtaamatiedot						Kuormitustiedot									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l		µg/l	µg/l	mg/l		MP	EHP	Q	q	Q	q								
												pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	11.5.23	6,4	27	42		650				5,4	1.5. - 16.5.	16,0		1 253	16	1 348	18	409	0,64		9,8				82
2	pvk1	24.5.23	6,4	36	43		750				3,2	17.5. - 24.5.	11,5		549	7,1	547	7,1	221	0,26		4,6				20
3	pvk1	8.6.23	6,5	30	63	45	630	25	5	5 500	6,4	25.5. - 12.6.	8,5	8,2	258	3,4	356	4,6	120	0,25	0,18	2,5	0,10	0,02	22	26
4	pvk1	19.6.23	6,4	40	130		1 000				16	13.6. - 25.6.	5,0	3,9	68	0,89	61	0,79	27	0,09		0,68				11
5	pvk1	3.7.23	6,4	38	84	50	780	5	13	5 900	9,2	26.6. - 10.7.	11,0	10,2	491	6,4	1 006	13	430	0,95	0,57	8,8	0,06	0,15	67	104
6	pvk1	19.7.23	6,4	51	130		1 100				4,8	11.7. - 24.7.	7,5	7,2	188	2,5	560	7,3	321	0,82						30
7	pvk1	31.7.23	6,4	49	52		1 100				10	25.7. - 7.8.	18,0	17,4	1 682	22	2 706	35	1 490	1,6		33				304
8	pvk1	17.8.23	6,4	53	120	94	1 100	13	100	17 000	19	8.8. - 22.8.	8,0	8,8	221	2,9	296	3,8	176	0,40	0,31	3,7	0,04	0,33	56	63
9	pvk1	30.8.23	6,4	35	61		780				9,6	23.8. - 14.9.	14,0	14,0	897	12	895	12	352	0,61		7,8				97
10	pvk1	18.9.23	6,4	31	46		1 400				6,4	15.9. - 24.9.	29,0	28,9	5 541	72	4 549	59	1 584	2,4		72				327
11	pvk1	3.10.23	6,5	33	38		850				2,4	25.9. - 12.10.	19,0	21,1	1 925	25	2 742	36	1 017	1,2		26				74
12	pvk1	23.10.23	6,4	27	68		290				3,2	13.10. - 26.10.	8,0	7,7	221	2,9	2 116	28	642	1,6		6,9				76
13	pvk1	31.10.23	6,2	31	86		1 300				4,4	27.10. - 31.10.	7,5	7,8	188	2,5	163	2,1	57	0,16		2,4				8,0
KEVÄT n= 2		keskiarvo keskihajonta	6,4	32 6,4	43 0,71		700 71				4,3 1,6	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			12	1 115	14	354	0,53 0,28		8,3 2,1				64 51
KESÄ n= 7		keskiarvo keskihajonta	6,4	42 8,8	91 34	63 27	927 194	14 10	39 53	9 467 6 527	11 5,1	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			7,1	845	11	411	0,66 0,47	0,34	9,0 4,3	0,07	0,15	46	91 81
ALKUSYKSY n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,4	31 2,5	60 22		960 507				4,1 1,7	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			26	2 704	35	936	1,5 0,86		29 13				127 96
1.5.-31.10. n= 13		keskiarvo keskihajonta	6,4	37 8,9	74 34	63 27	902 303	14 10	39 53	9467 6 527	7,7 5,0	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			13	1 355	18	537	0,85 0,55	0,34	14 6,3	0,07	0,15	46 81	

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittysrajalla.

Virtaamatiedot EHP:n virtaamamittauksesta 26.5.-31.10. Virtaama arvioitu Pullinnevan valuman avulla 1.-25.5.

Syys-lokakuun näytteenotot viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.

Jylenneva, pvk 1 ap mp
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023
Kohde: Jylenneva, pvk 1 ap mp

Haltija/tuottaja: Turveruukki Oy

Kunta: Siikajoki, Ruukki

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk1 (ojittamaton)

Vesistöalue: Siikajoki





Purkuvesistö: Ristisenoja - Lamujoki - Siikajoki (57.068)

Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7106108-448786, la1 ja 2 ap pato (pvk yp)

Näytetiedot			Veden laatu									Reduktio %									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok. P	PO ₄ -P	Kok. N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok. P	PO ₄ -P	Kok. N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%	
Pvk:n yläpuoli																					
1	pvk1 yp	11.5.23	6,3	28	63		1 100				8,6	11.5.23	4	33		41				37	
2	pvk1 yp	8.6.23	7,2	21	77	51	750	65	220	5 900	6,8	8.6.23	-43	18		16				6	
3	pvk1 yp	3.7.23	6,8	38	96	38	2 500	450	880	4 400	10,0	3.7.23	0	13	-32	69	99	99	-34	8	
4	pvk1 yp	17.8.23	6,8	47	100	62	2 000	270	780	7 000	11	17.8.23	-13	-20	-52	45	95	87	-143	-73	
5	pvk1 yp	18.9.23	6,5	38	88		2 900				11	18.9.23	18	48		52				42	
KEVÄT	n= 1	keskiarvo	6,3	28	63		1 100				8,6	KEVÄT	4	33		41				37	
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,9	35	91	50	1 750	262	627	5 767	9,3	KESÄ	-14	2	-25	52	95	94	-64	-24	
ALKUSYKSY	n= 1	keskiarvo	6,5	38	88		2 900				11	ALKUSYKSY	18	48		52				42	
1.5.-31.10.	n= 5	keskiarvo	6,6	34	85	50	1 850	262	627	5 767	9,5	1.5.-31.10.	-4	16	-25	51	95	94	-64	2	
Pvk:n alapuoli																					
1	pvk1 ap	11.5.23	6,4	27	42		650				5,4										
2	pvk1 ap	8.6.23	6,5	30	63	45	630	25	5	5 500	6,4										
3	pvk1 ap	3.7.23	6,4	38	84	50	780	5	13	5 900	9,2										
4	pvk1 ap	17.8.23	6,4	53	120	94	1 100	13	100	17 000	19										
5	pvk1 ap	18.9.23	6,4	31	46		1 400				6,4										
KEVÄT	n= 1	keskiarvo	6,4	27	42		650				5,4										
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,4	40	89	63	837	14	39	9 467	12										
ALKUSYKSY	n= 1	keskiarvo	6,4	31	46		1 400				6,4										
1.5.-31.10.	n= 5	keskiarvo	6,4	36	71	63	912	14	39	9 467	9,3										

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

Jylenneva, pvk 1 ap mp
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Kärjenpimpi, pvk1																				
Haltija/tuottaja:	Neova Oy		Vesien käsittely:		pvk1 (ojitettu)		Tarkkailupisteen														
Kunta:	Vaala		Vesistöalue:		Siikajoki		valuma-ala:		327,3		ha										
ELY-keskus:	POPELY		Purkuvesistö:		laskuoja - Neittävänjoki - Siikajoki (57.042)																
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen						Kuormittava ala		281		ha										
Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7141553-475298																					



AFRY
AF PÖYRY



Näytetiedot			Veden laatu								Virtaamatiedot								Kuormitustiedot							
Näyte	Ottopvm		pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
													MP	Masinotek	Q	q	Q	q								
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	pvm	cm	cm	m³/d	l/s km²	m³/d	l/s km²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	9.1.23	4,6	34	7,2		610				1,1	1.1. - 25.1.	6,0	4,9	108	0,38	142	0,50	15	0,00		0,27				0,48
2	pvk1	13.2.23	4,4	39	7,6		580				1,0	26.1. - 2.3.	12,5	11,8	676	2,4	498	1,8	59	0,01		0,88				1,5
3	pvk1	21.3.23	4,2	47	31		1 100				1,2	3.3. - 3.4.	8,5	8,5	258	0,91	285	1,0	41	0,03		0,96				1,0
4	pvk1	19.4.23	4,4	61	22		870				1,0	4.4. - 20.4.	10,5	9,0	437	1,5	249	0,88	46	0,02		0,66				0,76
5	pvk1	26.4.23	4,8	20	17		550				1,7	21.4. - 28.4.	-	47,4	23 532	83	15 656	55	957	0,81		26				81
6	pvk1	3.5.23	5,1	15	14		730				1,6	29.4. - 4.5.	47,0	43,1	18 528	66	17 312	61	793	0,74		39				85
7	pvk1	8.5.23	4,9	23	16		1 400				3,2	5.5. - 10.5.	51,0	45,5	22 725	80	11 887	42	835	0,58		51				116
8	pvk1	15.5.23	5,1	25	15		630				2,0	11.5. - 17.5.	24,5	22,5	3 635	13	4 128	15	315	0,19		7,9				25
9	pvk1	22.5.23	4,4	31	18		940				1,4	18.5. - 24.5.	17,0	16,7	1 458	5,2	1 749	6,2	166	0,10		5,0				7,5
10	pvk1	6.6.23	4,8	38	22	3	990	5	260	1 100	1,0	25.5. - 12.6.	10,0	8,4	387	1,4	423	1,5	49	0,03	0,00	1,3	0,01	0,34	1,4	1,3
11	pvk1	20.6.23	5,5	43	28		1 200				2,6	13.6. - 26.6.	5,0	3,1	68	0,24	53	0,19	6,9	0,00		0,19				0,42
12	pvk1	4.7.23	4,9	45	38	5	1 200	8	340	2 300	1,6	27.6. - 10.7.	7,0	5,4	159	0,56	2 866	10	394	0,33	0,05	11	0,07	3,0	20	14
13	pvk1	18.7.23	4,7	48	28		1 700				1,2	11.7. - 24.7.	13,0	11,7	745	2,6	1 931	6,8	283	0,17		10				7,1
14	pvk1	2.8.23	4,9	50	25		2 200				2,8	25.7. - 7.8.	26,0	23,4	4 217	15	3 761	13	575	0,29		25				32
15	pvk1	15.8.23	4,7	59	44	16	1 800	8	670	3 200	3,3	8.8. - 21.8.	9,5	7,9	340	1,2	272	0,96	49	0,04	0,01	1,5	0,01	0,56	2,7	2,7
16	pvk1	29.8.23	4,8	41	22		860				2,8	22.8. - 14.9.	10,0	8,5	387	1,4	497	1,8	62	0,03		1,3				4,3
17	pvk1	25.10.23	5,2	46	14		1 800				1,0	15.9. - 31.10.	12,5	10,9	676	2,4	5 176	18	728	0,22		28				16
18	pvk1	2.11.23	4,7	51	18		1 500				1,0	1.11. - 3.11.	8,0	6,9	221	0,78	146	0,52	23	0,01		0,67				0,45
19	pvk1	7.11.23	4,7	45	14		1 100				1,0	4.11. - 13.11.	9,0	8,6	297	1,1	376	1,3	52	0,02		1,3				1,2
20	pvk1	21.11.23	5,2	51	29		1 900				1,0	14.11. - 26.11.	8,0	7,9	221	0,78	221	0,78	34	0,02		1,3				0,68
21	pvk1	4.12.23	5,1	53	29		1 600				1,6	27.11. - 10.12.	8,0	6,1	221	0,78	106	0,35	17	0,01		0,52				0,52
22	pvk1	18.12.23	4,6	40	12		810				1,6	11.12. - 31.12.	8,0	4,2	221	0,78	56	0,20	6,8	0,00		0,14				0,27
TALVI n= 4	keskiarvo keskihajonta		4,4 12	45 17	17 12		790 244				1,1 0,10	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			1,3	314	1,1	41	0,01 0,00		0,73 0,25				1,0 0,06
KEVÄT n= 5	keskiarvo keskihajonta		4,8 5,9	23 16	16 1,6		850 340				2,0 0,72	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			49	10 455	37	635	0,50 0,00		25 9,3				63 32
KESÄ n= 7	keskiarvo keskihajonta		4,8 6,9	46 8,4	30 8,4	8,1 6,9	1 421 488	7,2 1,8	423 217	2 200 1 054	2,2 0,90	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			3,2	1 292	4,6	186	0,12 0,04	0,02	6,5 4,5	0,03	1,2	7,5	8,1 4,2
ALKUSYKSY n= 1	keskiarvo keskihajonta		5,2	46	14		1 800				1,0	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			2,4	5 176	18	728	0,22 0,00		28 21				16 0,00
LÖPPUSYKSY n= 5	keskiarvo keskihajonta		4,8 5,4	48 8,1	20 8,1		1 382 429				1,2 0,33	LÖPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			0,84	158	0,55	23	0,01 0,00		0,68 0,44				0,56 0,08
VUOSI n= 22	keskiarvo keskihajonta		4,7 12	41 9,4	21 7	8 7	1185 486	7 2	423 217	2200 1 054	1,7 0,77	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			11	2 161	7,6	227	0,12 0,00	0,02	8,4 5,0	0,03	1,2	7,5	11 4,3

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittäysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittäysrajalla.

26.4. Virtaamaa ei saanut mitattua liian kovan virtauksen vuoksi.





8.5. Mittapadon vedenkorkeus epätarkka vedenpyörteilyn takia.

Syys-lokakuussa näytteitä on jäänyt hakematta useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.

2.5. omavaltionnäyte: pH 5,52, CODMn 15 mg/l, kiintoaine 2,4 mg/l, kok.N 1300 µg/l, kok.P 20 µg/l.

Ympäristöluvan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.

Kärjenpimpi, pvk1
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Kärjenpimpi, pvk1

Haltija/tuottaja: Neova Oy

Kunta: Vaala

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk1 (ojitettu)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistö: laskuoja - Neittävänjoki - Siikajoki (57.042)



Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7142659-475571

Näytetiedot			Veden laatu									Reduktio %								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%
Pvk:n yläpuoli																				
1	pvk1 yp	9.1.23	6,2	39	100		3 100				17	9.1.23	13	93		80				94
2	pvk1 yp	6.6.23	6,3	15	170	72	1 600	160	290	7 500	40	6.6.23	-153	87	96	38	97	10	85	98
3	pvk1 yp	4.7.23	6,3	55	230	160	2 000	36	530	15 000	18	4.7.23	18	83	97	40	78	36	85	91
4	pvk1 yp	15.8.23	6,0	84	340	240	3 300	41	1 800	12 000	21	15.8.23	30	87	93	45	80	63	73	84
TALVI n= 1		keskiarvo	6,2	39	100		3 100				17	TALVI	13	93		80				94
KESÄ n= 3		keskiarvo	6,2	51	247	157	2 300	79	873	11 500	26	KESÄ	8	86	95	42	91	52	81	93
VUOSI n= 4		keskiarvo	6,2	48	210	157	2 500	79	873	11 500	24	VUOSI	9	87	95	54	91	52	81	93
Pvk:n alapuoli																				
1	pvk1 ap	9.1.23	4,6	34	7,2		610				1,1									
2	pvk1 ap	6.6.23	4,8	38	22	3,1	990	5,2	260	1 100	1,0									
3	pvk1 ap	4.7.23	4,9	45	38	5,2	1 200	8,1	340	2 300	1,6									
4	pvk1 ap	15.8.23	4,7	59	44	16	1 800	8	670	3 200	3,3									
TALVI n= 1		keskiarvo	4,6	34	7,2		610				1,1									
KESÄ n= 3		keskiarvo	4,7	47	35	8,1	1 330	7,2	423	2 200	2,0									
VUOSI n= 4		keskiarvo	4,7	44	28	8	1 150	7	423	2 200	1,8									





Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittysrajalla.

Helmikuussa tehon tarkkailu on muutettu kesäaikaiseksi. 3 krt/v kesä-, heinä- ja elokuussa.

6.6. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 22 mg/l ja hehkutusjäännös 18 mg/l.

15.8. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 20 mg/l ja hehkutusjäännös <1 mg/l.

Kärjenpimpi, pvk1
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Kivineva, pvk 1			Tarkkailupisteen			Lupamääräykset: vuosikeskiarvona lähtevän veden			
Haltija/tuottaja:	Neova Oy	Vesien käsittely:	pvk1	valuma-ala:		131,4 ha	pitoisuus		teho % pitoisuus	
Kunta:	Siikalatva	Vesistöalue:	Siikajoki	pvk1						
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	Myllyoja - Leuvanjärvi - Leuvanoja - Siikajoki (57.028)	Kuormittava ala		kiintoaine	50	9	mg/l	
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen	Koordinaatit (ETRS TM35FIN):		7133025-434781, Pvk1ap	valuma-alueella:	Kok.P	50	50	µg/l	
					113 ha	Kok.N	20	1400	µg/l	



Näytetiedot			Veden laatu										Virtaamatiedot						Kuormitustiedot									
Näyte			Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	12.1.23												1.1. - 12.1.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pvk1	14.2.23	5,6	39	47	14	1 700	33	1000	10 000	6,0	8,0	13.1. - 20.2.	13,0	13,8	745	6,6	1 146	10	340	0,41	0,12	15	0,29	8,7	87	52	
3	pvk1	13.3.23												21.2. - 12.4.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pvk1	18.4.23	6,0	16	25		760				1,4	4,4	13.4. - 20.4.	5,0	5,2	68	0,60	181	1,6	22	0,03		1,0				1,9	
5	pvk1	25.4.23	5,9	13	19	2	820	89	380	1 300	2,6	1,9	21.4. - 28.4.	38,0	37,2	10 890	96	8 742	77	865	1,3	0,16	55	5,9	25	86	173	
6	pvk1	3.5.23	6,0	15	24		920				1,3	3,1	29.4. - 5.5.	14,0	14,0	897	7,9	6 629	58	757	1,2		46				66	
7	pvk1	10.5.23	5,8	14	23	4	700	130	170	1 200	1,2	3,6	6.5. - 20.5.	32,0	34,8	7 087	62	5 179	46	552	0,91	0,16	28	5,1	6,7	47	47	
8	pvk1	24.5.23	6,1		12		430				1,0	5,6	21.5. - 30.5.	4,0	2,7	39	0,34	894	7,9	129	0,08		2,9				6,8	
9	pvk1	7.6.23	6,1	19	21	10	470	45	5	2 300	2,4	3,4	31.5. - 13.6.	13,0	13,9	745	6,6	848	7,5	123	0,14	0,06	3,0	0,29	0,03	15	15	
10	pvk1	21.6.23	6,1	33	20		630				2,0	3,7	14.6. - 27.6.	8,5	11,3	258	2,3	290	2,6	73	0,04		1,4				4,4	
11	pvk1	5.7.23	6,0	33	29	7	830	21	91	5 000	4,0	4,1	28.6. - 11.7.	23,0	24,8	3 104	27	1 648	15	414	0,36	0,09	10	0,26	1,1	63	50	
12	pvk1	19.7.23	6,3	100	58		1 900				19	14	12.7. - 24.7.	5,0	4,6	68	0,60	1 308	12	996	0,58		19				189	
13	pvk1	31.7.23	6,0	61	33		2 000				16	4,2	25.7. - 7.8.	33,0	30,1	7 654	67	3 774	33	1 752	0,95		57				459	
14	pvk1	17.8.23	6,0	75	43	12	1 700	27	600	34 000	26	5,1	8.8. - 22.8.	11,5	11,8	549	4,8	763	6,7	436	0,25	0,07	9,9	0,16	3,5	197	151	
15	pvk1	30.8.23	6,2	27	30		820				17	4,8	23.8. - 14.9.	15,0	14,2	1 066	9,4	1 087	9,6	223	0,25		6,8				141	
16	pvk1	18.9.23	6,2	42	36	12	910	18	240	25 000	56	8,0	15.9. - 25.9.	5,0	3,5	68	0,60	3 577	32	1 143	0,98	0,33	25	0,49	6,5	681	1 524	
17	pvk1	5.10.23	6,0	47	33		2 000				5,6	4,5	26.9. - 10.10.	33,0	32,4	7 654	67	3 633	32	1 300	0,91		55				155	
18	pvk1	18.10.23	5,9	48	19	6	2 100	160	1200	3 500	1,0	3,5	11.10. - 20.10.	33,0	32,6	7 654	67	7 786	69	2 844	1,1	0,38	124	9,5	71	207	59	
19	pvk1	24.10.23	5,8	24	21		1 600				4,0	5,2	21.10. - 31.10.	16,0	15,1	1 253	11	1 475	13	269	0,24		18				45	
20	pvk1	7.11.23	6,3	18	23	20	1 200	100	820	3 000	2,4	4,1	1.11. - 9.12.	13,0	13,5	745	6,6	858	7,6	118	0,15	0,13	7,8	0,65	5,4	20	16	
21	pvk1	11.12.23											10.12. - 31.12.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TALVI n= 2	keskiarvo keskihajonta		5,8 16	28 16	36 16	14	1 230 665	33	1000	10 000	3,7 3,3	6,2 2,5	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			3,6	419	3,7	122	0,15 0,08	0,05	5,3 3,7	0,11	3,3	33	19 16	
KEVÄT n= 3	keskiarvo keskihajonta		5,9 1,0	14 2,6	22 1	3	813 110	110	275 148	1 250 71	1,7 0,78	2,9 0,87	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			55	6 516	57	690	1,1 0,09	0,16	40 15	5,4	13	62	86 36	
KESÄ n= 8	keskiarvo keskihajonta		6,1 30	50 14	31 2,4	9,8 658	1 098 12	31 322	13 767 17 575	11 9,7	5,6 3,5		KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			15	1 341	12	517	0,34 0,13	0,08	14 8,9	0,23	1,6	94	135 124	
ALKUSYKSY n= 4	keskiarvo keskihajonta		5,9 11	40 8,5	27 4,0	9,2 540	1 653 100	89 100	720 679	14 250 15 203	17 26	5,3 1,9	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			37	3 909	34	1 314	0,81 0,22	0,35	52 37	4,3	34	478 431		
LOPPUSYKSY n= 1	keskiarvo keskihajonta		6,3	18	23	20	1 200	100	820	3 000	2,4	4,1	LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			6,6	549	4,8	75	0,10 0,01	0,08	5,0 2,9	0,42	3,4	13	10 5,8	
VUOSI n= 18	keskiarvo keskihajonta		6,0 24	37 12	29 5	10	1194 580	69 52	501 427	9478 11 870	9,4 14	5,1 2,7	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			25	1 687	15	441	0,36 0,11	0,10	17 10	1,0	6,6	79	117 104	

Lisätiedot:	= pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.	= lupamääräys täyttyi	= lupamääräys ei täyttynyt
Ympäristöluvan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.			

12.1., 13.3. ja 11.12. ei virtaamaa, ei näytteitä. Nollavirtaamajaksot 1.-12.1., 21.2.-12.4. ja 10.-31.12.

Kivineva 1 on siirtynyt jälkihoitovaiheeseen 26.4., eikä pvk1:ty näytteitä enää oteta.

24.5. COD_{Mn} on jäänyt analysoimatta. Kuormitus laskettu 7.6. näytteen pitoisuudella.





17.8. kiintoaineen hehkutushäviö 19 mg/l ja hehkutusjäännös 7,0 mg/l.

18.9. kiintoaineen hehkutushäviö 35 mg/l ja hehkutusjäännös 21 mg/l.

Syys-lokakuun näytteenotot ovat viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.

4.5. omavalvontanäyte: pH 5,51, CODMn 27 mg/l, kiintoaine 5,7 mg/l, kok.N 1200 µg/l, kok.P 29 µg/l.

Kivineva, pvk 1
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Kivineva, pvk 1
Haltija/tuottaja: Neova Oy
Kunta: Siikalatva

Vesien käsittely: pvk1
Vesistöalue: Siikajoki
Purkuvesistö: Myllyoja - Leuvanjärvi -
Leuvanoja -
Siikajoki
(57.028)



ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7132778-434573, pvk1yp

Näytetiedot			Veden laatu									Reduktio %									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%	
Pvk:n yläpuoli																					
1	pvk1 yp	14.2.23	5,6	55	83	39	2 100	32	1 300	24 000	61	14.2.23	29	43	64	19	-3	23	58	90	
2	pvk1 yp	25.4.23	6,3	14	57	45	1 400	90	960	8 800	15	25.4.23	7	67	95	41	1	60	85	83	
TALVI	n= 1	keskiarvo	5,6	55	83	39	2 100	32	1 300	24 000	61	TALVI	29	43	64	19	-3	23	58	90	
KEVÄT	n= 1	keskiarvo	6,3	14	57	45	1 400	90	960	8 800	15	KEVÄT	7	67	95	41	1	60	85	83	
1.1.-25.4.	n= 2	keskiarvo	5,8	35	70	42	1 750	61	1 130	16 400	38	1.1.-25.4.	25	53	80	28	0	39	66	89	
Pvk:n alapuoli																					
1	pvk1 ap	14.2.23	5,6	39	47	14	1 700	33	1 000	10 000	6,0										
2	pvk1 ap	25.4.23	5,9	13	19	2	820	89	380	1 300	2,6										
TALVI	n= 1	keskiarvo	5,6	39	47	14	1 700	33	1 000	10 000	6,0										
KEVÄT	n= 1	keskiarvo	5,9	13	19	2	820	89	380	1 300	2,6										
1.1.-25.4.	n= 2	keskiarvo	5,7	26	33	8	1 260	61	690	5 650	4,3										

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

12.1. ja 13.3. ei virtausta, ei näytteitä





25.4. pvk1yp sähköjohtavuus 4,3 mS/m

14.2. pvk1yp kiintoaineen hehkutusjäännös 14 mg/l ja hehkutushäviö 47 mg/l

Kivineva 1 on siirtynyt jälkihoitovaiheeseen 26.4., eikä pvk1yp näytteitä enää oteta.

14.2. pvk1yp sähköjohtavuus 9,8 mS/m

Kivineva, pvk 1
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Kivineva, pvk 2			Tarkkailupisteen			Lupamääräykset: vuosikeskiarvona lähtevän veden					
Haltija/tuottaja:	Neova Oy	Vesien käsittely:	pvk2	valuma-ala:	105,2	ha	pitoisuus					
Kunta:	Siikalatva	Vesistöalue:	Siikajoki	pvk2			teho %	50	9	mg/l		
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	Naarastenoja - Lamujoki - Siikajoki (57.069)				pitoisuus	50	50	µg/l		
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen	Koordinaatit (ETRS89):	7129965-433885, Pvk2ap	Kuormittava ala	96	ha	Kok.P	20	1400	µg/l		
				valuma-alueella:			Kok.N					

Näytetiedot			Veden laatu										Virtaamatiedot						Kuormitustiedot								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mS/m	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk2	12.1.23											1.1. - 27.1.	-	-	-	-	853	9,4	113	0,28		14				32
2	pvk2	14.2.23											28.1. - 26.2.	-	-	-	-	397	4,4	53	0,13		6,4				15
3	pvk2	13.3.23											27.2. - 30.3.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
4	pvk2	18.4.23	6,4	14	35		1 700				4,0	4,4	31.3. - 20.4.	4,0		39	0,43	55	0,61	7,4	0,02		0,89				2,1
5	pvk2	25.4.23	6,2	10,00	18	4	990	530	64	1 100	2,0	2,3	21.4. - 28.4.	7,0		159	1,7	6 999	77	665	1,2	0,26	66	35	4,3	73	133
6	pvk2	3.5.23	6,4	14	30		1 400				2,1	2,7	29.4. - 5.5.	13,0		745	8,2	5 307	58	706	1,5		71				106
7	pvk2	10.5.23	6,2	14	46	20	1 300	620	150	4 200	3,2	3,2	6.5. - 20.5.	23,0		3 104	34	4 146	46	552	1,8	0,79	51	24	5,9	166	126
8	pvk2	24.5.23	6,3		20		570				1,0	3,3	21.5. - 30.5.	14,5		979	11	716	7,9	105	0,14		3,9				6,8
9	pvk2	7.6.23	6,3	17	19	9	480	82	5	1 900	1,2	3,2	31.5. - 13.6.	11,0		491	5,4	679	7,5	110	0,12	0,06	3,1	0,53	0,03	12	7,7
10	pvk2	21.6.23	6,2	25	17		590				1,6	3,8	14.6. - 27.6.	7,5		188	2,1	232	2,6	55	0,04		1,3				3,5
11	pvk2	5.7.23	6,4	25	23	8	670	12	5	2 500	2,0	4,1	28.6. - 11.7.	23,0		3 104	34	1 319	15	313	0,29	0,10	8,4	0,15	0,06	31	25
12	pvk2	19.7.23											12.7. - 24.7.	-		-	-	1 048	12	249	0,21		9,8				23
13	pvk2	31.7.23	6,1	25	19		1 300				2,6	4,6	25.7. - 7.8.	30,0		6 031	66	3 021	33	718	0,55		37				75
14	pvk2	17.8.23	6,4	33	31	10	810	24	42	3 300	5,6	5,0	8.8. - 22.8.	6,0		108	1,2	611	6,7	192	0,18	0,06	4,7	0,14	0,24	19	33
15	pvk2	30.8.23	6,6	21	26		640				8,6	4,4	23.8. - 14.9.	15,0		1 066	12	870	9,6	174	0,22		5,3				71
16	pvk2	18.9.23	6,3	21	23	8	610	31	31	2 200	3,6	4,2	15.9. - 25.9.	5,5		87	0,95	2 864	32	572	0,63	0,22	17	0,84	0,84	60	98
17	pvk2	5.10.23	6,4	19	23		730				2,6	3,7	26.9. - 10.10.	7,0		159	1,7	2 909	32	525	0,64		20				72
18	pvk2	18.10.23	6,2	18	21	6	960	400	77	1 500	1,0	3,2	11.10. - 20.10.	7,0		159	1,7	6 233	69	1 067	1,2	0,37	57	24	4,6	89	59
19	pvk2	24.10.23	6,2	18	34		1 300				4,9	4,0	21.10. - 31.10.	11,5		549	6,0	1 181	13	202	0,38		15				55
20	pvk2	7.11.23	6,5	16	53	48	1 300	140	680	4 100	10,00	5,4	1.11. - 23.11.	27,0		4 634	51	1 053	12	160	0,53	0,48	13	1,4	6,8	41	100
21	pvk2	11.12.23											24.11. - 31.12.	-		-	-	68	0,75	10	0,03		0,84				6,4
TALVI n= 1	keskiarvo keskihajonta		6,4	14	35		1 700				4,0	4,4	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			0,43	336	3,7	45	0,11 0,05		5,4 3,8	0,00	0,00	0,00	13 9,6
KEVÄT n= 3	keskiarvo keskihajonta		6,3	13	31	12	1 230 214	575 64	107 61	2 650 2 192	2,4 0,67	2,7 0,45	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			15	5 217	57	623	1,6 0,58		60 36	28	5,3	132	123 73
KESÄ n= 7	keskiarvo keskihajonta		6,3	24	22	8,9 5,3	723 274	39 37	17 21	2 567 702	3,2 2,8	4,1 0,67	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			19	1 074	12	243	0,22 0,02	0,07	9,3 4,2	0,27	0,12	21	35 24
ALKUSYKSY n= 4	keskiarvo keskihajonta		6,3	19	25	7,2 1,4	900 304	216 261	54 33	1 850 495	3,0 1,6	3,8 0,43	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			2,6	3 129	34	565	0,69 0,10	0,28	25 10	11	2,4	72	72 42
LOPPUSYKSY n= 1	keskiarvo keskihajonta		6,5	16	53	48	1 300	140	680	4 100	10	5,4	LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			17	439	4,8	67	0,22 0,14	0,48	5,4 3,3	1,4	6,8	41	42 42
VUOSI n= 16	keskiarvo keskihajonta		6,3	19 5,9	27 10	14 14	959 375	230 248	132 226	2600 1 160	3,5 2,6	4 0,83	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			13	1 351	15	227	0,36 0,10	0,30	14 7,3	8,2	3,0	57	41 28

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla. = lupamääräys täyttyi = lupamääräys ei täyttynyt

Virtaama arvioitu Kivinevan pvk1:n valuman avulla. Ympäristöluvan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.

12.1., 14.2. ja 13.3. ei virtaamaa, ei näytteitä. 1.1.-30.3. kuormitukset on laskettu 18.4. näytteenoton tuloksilla.

25.5.2023 COD_{Mn} analyysi puttuu. Jakson COD_{Mn} kuormitus on laskettu näytteiden 10.5. ja 7.6. COD_{Mn} tuloksen keskiarvolla.





19.7. Ei virtaamaa, ei näytettä. Jakson 12.7.-24.7. kuormitus on laskettu 5.7. ja 17.8. näytteiden tulosten keskiarvolla.

Syys-lokakuun näytteenotot ovat viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.

11.12. Virtaama niin pieni, ettei saatu edustavaa näytettä. Jakson 24.11.-31.12. kuormitus laskettu 7.11. näytteen pitoisuuksilla.

4.5. omavalvontanäyte: pH 6,23, CODMn 17 mg/l, kiintoaine 8,0 mg/l, kok.N 1700 µg/l, kok.P 44 µg/l.

Kivineva, pvk 2
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Kivineva, pvk 2
Haltija/tuottaja: Neova Oy
Kunta: Siikalatva
ELY-keskus: POPELY
Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk2
Vesistöalue: Siikajoki
Purkuvesistö: Naarastenoja - Lamujoki - Siikajoki (57.069)



Koordinaatit yp (ETRS89): 7129996-433858, Pvk2yp

Näytetiedot			Veden laatu									Reduktio %								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%
Pvk:n yläpuoli																				
1	pvk2 yp	25.4.23	5,3	15	22	3	890	80	450	1 900	4,8	25.4.23	33	18	-30	-11	-563	86	42	58
2	pvk2 yp	10.5.23	6,5	14	60	42	1 600	96	1 100	9 400	15	10.5.23	0	23	52	19	-546	86	55	79
3	pvk2 yp	7.6.23	6,6	14	61	51	1 200	23	890	13 000	13	7.6.23	-21	69	82	60	-257	99	85	91
4	pvk2 yp	5.7.23	6,2	27	53	33	1 900	190	750	7 100	16	5.7.23	7	57	76	65	94	99	65	88
5	pvk2 yp	17.8.23	6,5	22	74	51	1 700	20	1 200	13 000	22	17.8.23	-50	58	81	52	-20	97	75	75
6	pvk2 yp	18.9.23	6,2	23	53	32	2 300	460	1 200	7 600	13	18.9.23	9	57	75	73	93	97	71	72
7	pvk2 yp	18.10.23	6,2	22	50	38	2 200	380	1 300	8 700	7,6	18.10.23	18	58	84	56	-5	94	83	87
8	pvk2 yp	7.11.23	6,4	15	59	49	2 900	120	1 000	13 000	27	7.11.23	-7	10	2	55	-17	32	68	63
TALVI	n= 0	keskiarvo										TALVI								
KEVÄT	n= 2	keskiarvo	5,6	15	41	23	1 245	88	775	5 650	9,9	KEVÄT	17	22	47	8	-553	86	53	74
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,4	21	63	45	1 600	78	947	11 033	17	KESÄ	-19	61	80	59	49	98	77	83
ALKUSYKSY	n= 2	keskiarvo	6,2	23	52	35	2 250	420	1 250	8 150	10	ALKUSYKSY	13	57	80	65	49	96	77	78
LOPPUSYKSY	n= 1	keskiarvo	6,4	15	59	49	2 900	120	1 000	13 000	27	LOPPUSYKSY	-7	10	2	55	-17	32	68	63
VUOSI	n= 8	keskiarvo	6,0	19	54	37	1 836	171	986	9 213	15	VUOSI	-1	46	62	52	-34	87	72	76
Pvk:n alapuoli																				
1	pvk2 ap	25.4.23	6,2	10	18	4	990	530	64	1 100	2,0									
2	pvk2 ap	10.5.23	6,2	14	46	20	1 300	620	150	4 200	3,2									
3	pvk2 ap	7.6.23	6,3	17	19	9	480	82	5	1 900	1,2									
4	pvk2 ap	5.7.23	6,4	25	23	8	670	12	5	2 500	2,0									
5	pvk2 ap	17.8.23	6,4	33	31	10	810	24	42	3 300	5,6									
6	pvk2 ap	18.9.23	6,3	21	23	8	610	31	31	2 200	3,6									
7	pvk2 ap	18.10.23	6,2	18	21	6	960	400	77	1 500	1,0									
8	pvk2 ap	7.11.23	6,5	16	53	48	1 300	140	680	4 100	10									
TALVI	n= 0	keskiarvo																		
KEVÄT	n= 2	keskiarvo	6,2	12	32	12	1 145	575	107	2 650	2,6									
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,4	25	24	9	653	39	17	2 567	2,9									
ALKUSYKSY	n= 2	keskiarvo	6,2	20	22	7	785	216	54	1 850	2,3									
LOPPUSYKSY	n= 1	keskiarvo	6,5	16	53	48	1 300	140	680	4 100	10									
VUOSI	n= 8	keskiarvo	6,3	19	29	14	890	230	132	2 600	3,6									





Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

25.4. pvk2yp sähköjohtavuus 1,9 mS/m
10.5. pvk2yp sähköjohtavuus 4,6 mS/m
7.6. pvk2yp sähköjohtavuus 5,8 mS/m
5.7. pvk2yp sähköjohtavuus 4,2 mS/m

17.8. pvk2yp sähköjohtavuus 6,0 mS/m, kiintoaineen hehkutushäviö 17 mg/l ja hehkutusjäännös 4,7 mg/l.
18.9. pvk2yp sähköjohtavuus 5,2 mS/m
18.10. pvk2yp sähköjohtavuus 5,0 mS/m
7.11. pvk2yp sähköjohtavuus 4,2 mS/m, kiintoaineen hehkutushäviö 16 mg/l ja hehkutusjäännös 11 mg/l.

12.1., 14.2., 13.3. ja 11.12. ei näytteitä ap pisteeltä.

Kivineva, pvk 2
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Korteneva, pvk1																			
Haltija/tuottaja:	Neova Oy		Vesien käsittely:		pvk1 (ojitettu)		Tarkkailupisteen													
Kunta:	Siikalatva		Vesistöalue:		Siikajoki		valuma-ala:		117,4		ha									
ELY-keskus:	POPELY		Purkuvesistö:		laskuoja - Lamujoki - Kortteisen tekojärvi -															
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen				Lamujoki - Siikajoki 57.063		Kuormittava ala													
Koordinaatit (ETRS TM35FIN):										7112803-458243, pvk1ap		107,8		ha						



AFRY
AF PÖRY



Näytetiedot			Veden laatu								Virtaamatiedot								Kuormitustiedot							
Näyte	Ottopvm		pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
													MP	EHP	Q	q	Q	q								
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	pvm	cm	cm	m³/d	l/s km²	m³/d	l/s km²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	9.1.23	6,5	29	12	3	610	18	13	540	1,0	1.1. - 25.1.	6,5		132	1,3	393	3,9	97	0,04	0,01	2,0	0,06	0,04	1,8	3,4
2	pvk1	13.2.23	6,5	24	8,5	2	490	27	38	420	1,8	26.1. - 2.3.	9,0		297	2,9	282	2,8	58	0,02	0,00	1,2	0,06	0,09	1,0	4,3
3	pvk1	22.3.23	6,4	43	16	2	1 000	12	240	4 800	1,0	3.3. - 9.4.	7,0		159	1,6	107	1,1	39	0,01	0,00	0,91	0,01	0,22	4,4	0,91
4	pvk1	19.4.23	6,6	16	18		680				5,2	10.4. - 21.4.	33,0		7 654	75	2 397	24	327	0,37		14				106
5	pvk1	26.4.23	6,3	29	18	3	680	140	79	960	1,1	22.4. - 29.4.	40,0		12 380	122	7 663	76	1 893	1,2	0,19	44	9,1	5,2	63	72
6	pvk1	4.5.23										30.4. - 5.5.	-		-	-	7 527	74	2 052	1,1		43				67
7	pvk1	8.5.23	6,1	35	15	2	650	100	22	840	1,0	6.5. - 14.5.	39,0		11 621	115	4 902	48	1 462	0,63	0,08	27	4,2	0,92	35	42
8	pvk1	22.5.23	5,8	39	21		840				1,1	15.5. - 24.5.	25,0		3 823	38	1 283	13	426	0,23		9,2				12
9	pvk1	5.6.23	6,3	28	11	2	530	5	5	630	1,0	25.5. - 12.6.	9,0	8,9	297	2,9	206	2,0	49	0,02	0,00	0,93	0,01	0,01	1,1	1,8
10	pvk1	20.6.23										13.6. - 29.6.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
11	pvk1	3.7.23	6,3	43	23	5	780	5	17	2 100	1,2	30.6. - 9.7.	7,5	7,1	188	1,9	443	4,4	162	0,09	0,02	2,9	0,02	0,06	7,9	4,5
12	pvk1	17.7.23										10.7. - 24.7.	-	-	0,00	0,00	206	2,0	75	0,04		1,4				2,1
13	pvk1	2.8.23	6,3	53	24		1 200				11	25.7. - 7.8.	39,0	39,2	11 621	115	3 579	35	1 616	0,73		37	0,00			335
14	pvk1	14.8.23	6,3	83	44	12	1 200	11	76	4 600	5,6	8.8. - 20.8.	6,0	5,3	108	1,1	120	1,2	85	0,04	0,01	1,2	0,01	0,08	4,7	5,7
15	pvk1	29.8.23	6,5	60	37		1 100				4,4	21.8. - 14.9.	9,0	8,3	297	2,9	118	1,2	60	0,04		1,1				4,4
16	pvk1	23.10.23	6,3	31	13	3	750	74	37	910	1,0	15.9. - 31.10.	10,5	9,7	437	4,3	4 160	41	1 099	0,46	0,10	27	2,6	1,3	32	35
17	pvk1	2.11.23										1.11. - 3.11.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
18	pvk1	8.11.23	6,6	30	29	14	1 100	87	390	1 500	1,6	4.11. - 6.12.	29,0	33,2	5 541	55	643	6,3	164	0,16	0,08	6,0	0,48	2,1	8,2	8,8
19	pvk1	13.12.23										7.12. - 31.12.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TALVI n= 3	keskiarvo keskihajonta		6,5 9,8	32 3,8	12 0,40	2,2 267	700 7,5	19 124	97 124	1 920 2 495	1,3 0,46	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			1,9	246	2,4	61 0,00	0,02 0,00	0,00	1,3 0,26	0,04	0,13	2,5	2,8
KEVÄT n= 4	keskiarvo keskihajonta		6,1 10	30 2,4	18 1	2,5 86	713 28	120 40	51 85	900 85	2,1 2,1	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			87	4 154	41	1 049 0,00	0,61 0,00	0,13	24 6,4	6,3	2,8	47	62 26
KESÄ n= 5	keskiarvo keskihajonta		6,3 20	53 13	28 13	6,4 5,1	962 297	7,0 3,5	33 38	2 443 2 007	4,6 4,1	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			18	584	5,8	256 0,10	0,12 0,10	0,01	5,5 4,9	0,01	0,04	3,9	44 43
ALKUSYKSY n= 1	keskiarvo keskihajonta		6,3 31	31 13	13 13	2,7 2,7	750 750	74 74	37 37	910 910	1,0 1,0	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			4,3	4 160	41	1 099 0,00	0,46 0,00	0,10	27 8,9	2,6	1,3	32	35 0,00
LOPPUSYKSY n= 1	keskiarvo keskihajonta		6,6 30	30 29	29 14	14 14	1 100 1 100	87 87	390 390	1 500 1 500	1,6 1,6	LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			18	348	3,4	89 0,03	0,09 0,03	0,04	3,3 1,8	0,27	1,2	4,7	4,7 1,8
VUOSI n= 14	keskiarvo keskihajonta		6,3 17	39 10	21 10	5 4	829 246	48 48	92 125	1730 1 642	2,7 2,9	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			30	1 354	13	382 0,00	0,19 0,00	0,04	9,0 3,8	0,93	0,73	11	27 17

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittäysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittäysrajalla.

Virtaamatiedot 1.1.-25.5. ja 19.9. SYKE:n WSFS vesistömallijärjestelmästä. Muuten oma jatkuvatoiminen mittaus.

22.3. Pumpputuotannon pinta jäässä, ym näytettä ei saanut

4.5. Mittapadon alapuoli tulvii ja mittapato padottaa. Ei näytettä.

Jakson 30.4.-5.5. kuormitus on laskettu näytteiden 26.4. ja 8.5. tulosten keskiarvolla.

8.5. pvk1 ym näytettä ei voitu ottaa tulvan takia.

20.6. Ei virtaamaa, ei näytettä. Nollavalmajakso 13.-29.6.

17.7. Ei virtaamaa, ei näytettä. Jakson 10.7.-24.7. kuormitus on laskettu 3.7. näytteen tuloksilla, sillä jakson muina päivinä on ollut virtaamaa.





2.11. Ei virtaamaa, ei näytettä. Nollavalmajakso 1.-3.11.

Syys-lokakuussa näytteitä on jäänyt hakematta useampien näyteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.





26.-28.11. häiriö virtaamamittauksessa, käytetty vesistömallia.

13.12. ei virtaamaa, ei näytettä. Nollavirtaamajakso 7.-31.12.

Korteneva, pvk1
Päästötarkkailu



Korteneva, pvk1 Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Lahnasneva, pvk 1 ap mp 1				Tarkkailupisteen			
Haltija/tuottaja:	Turveruukki Oy	Vesien käsittely:	talvi la/kesä pvk (ojittamaton)		valuma-ala:			
Kunta:	Siikalatva, Pulkila	Vesistöalue:	Siikajoki		pvk1	145	ha	
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	Naarastenoja - Lamujoki - Siikajoki (57.069)					
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen	Koordinaatit (ETRS TM35FIN):	7130445-432825, vsp 1		Kuormittava ala			
				7130332-433166, pvk 1 ap mp 1	valuma-alueella:	126,3	ha	



Näytetiedot			Veden laatu										Virtaamatiedot						Kuormitustiedot								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	vsp 1	10.1.23	6,3	18	110		1 400				21	11	1.1. - 26.1.	-		372	3,0	1 246	9,9	155	0,94		12				180
2	vsp 1	14.2.23	6,3	17	110		1 100				19	9,7	27.1. - 26.2.	-		410	3,3	545	4,3	64	0,41		4,1				71
3	vsp 1	13.3.23	6,4	18	110		930				19	11	27.2. - 7.4.	-		103	0,83	238	1,9	30	0,18		1,5				31
4	vsp 1	18.4.23	6,3	14	42		1 100				6,3	3,4	8.4. - 20.4.	-		10 794	86	8 542	68	825	2,5		65				371
5	vsp 1	25.4.23	6,0	14	36		1 200				2,4	2,6	21.4. - 28.4.	-		8 284	66	19 850	158	1 917	4,9		164				329
6	pvk1	3.5.23	6,1	25	45		2 100				4,7	4,0	29.4. - 5.5.	-		3 840	31	7 742	62	1 335	2,4		112				251
7	pvk1	10.5.23	6,3	19	49		940				2,6	3,8	6.5. - 11.5.	24,5		3 635	29	1 166	9,3	153	0,39		7,6				21
8	pvk1	24.5.23	6,5	22	20		510				1,4	4,6	12.5. - 30.5.	16,0		1 253	10,0	566	4,5	86	0,08		2,0				5,5
9	pvk1	7.6.23	6,7	19	18		390				1,4	5,0	31.5. - 13.6.	13,5	14,1	819	6,5	972	7,8	127	0,12		2,6				9,4
10	pvk1	21.6.23	6,7	23	15		500				1,4	6,3	14.6. - 27.6.	11,5	11,8	549	4,4	633	5,1	100	0,07		2,2				6,1
11	pvk1	5.7.23	6,6	30	27		790				5,6	5,5	28.6. - 11.7.	25,0	26,0	3 823	31	2 404	19	497	0,45		13				93
12	pvk1	19.7.23	6,8	30	28		660				4,6	7,2	12.7. - 24.7.	14,0	14,5	897	7,2	1 215	9,7	251	0,23		5,5				39
13	pvk1	31.7.23	6,4	40	27		1 200				5,6	5,1	25.7. - 7.8.	27,0	26,3	4 634	37	4 612	37	1 272	0,86		38				178
14	pvk1	17.8.23	6,8	40	28		810				7,2	8,6	8.8. - 22.8.	14,0	14,8	897	7,2	1 000	8,0	276	0,19		5,6				50
15	pvk1	30.8.23	6,5	41	25		680				4,0	5,1	23.8. - 14.9.	10,0	10,6	387	3,1	1 792	14	507	0,31		8,4				49
16	pvk1	18.9.23	6,5	27	29		880				6,4	4,9	15.9. - 25.9.	27,0	26,8	4 634	37	3 480	28	648	0,70		21				154
17	pvk1	5.10.23	6,4	32	28		1 200				3,4	4,5	26.9. - 10.10.	26,0	27,0	4 217	34	3 962	32	874	0,77		33				93
18	pvk1	18.10.23	6,3	31	21		1 300				2,8	3,7	11.10. - 20.10.	29,0	29,2	5 541	44	7 552	60	1 615	1,1		68				146
19	vsp1	24.10.23	6,2	26	87		1 500				8,4	8,4	21.10. - 31.10.	34,0		8 247	66	1 381	11	248	0,83		14				80
20	vsp1	7.11.23	6,4	15	36		1 300				6,0	4,6	1.11. - 23.11.	-		1 228	9,8	651	5,2	67	0,16		5,8				27
21	vsp1	11.12.23	6,6	20	99		1 200				22	10,0	24.11. - 31.12.	-	-	243	1,9	271	2,2	37	0,18		2,2				41
TALVI n= 3	keskiarvo keskihajonta		6,3 0,58	18 0,00	110		1 143 238				20 1,2	11 0,75	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			2,4	617	4,9	75	0,47 0,38		5,3 3,2				86 81
KEVÄT n= 4	keskiarvo keskihajonta		6,2 5,2	18 5,5	43		1 335 521				4,0 1,9	3,5 0,62	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			53	9 597	77	1 071	2,7 1,3		88 55				283 216
KESÄ n= 8	keskiarvo keskihajonta		6,6 8,9	31 5,1	24		693 252				3,9 2,3	5,9 1,4	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			13	1 637	13	392	0,29 0,06		9,5 3,9				53 41
ALKUSYKSY n= 4	keskiarvo keskihajonta		6,3 2,9	29 31	41		1 220 259				5,3 2,6	5,4 2,1	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			45	3 922	31	812	0,83 0,28		32 19				116 88
LOPPUSYKSY n= 2	keskiarvo keskihajonta		6,5 18	18 3,5	68		1 250 71				14 11	7,3 3,8	LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			5,9	414	3,3	49	0,18 0,12		3,6 2,2				36 33
VUOSI n= 21	keskiarvo keskihajonta		6,4 8,5	25 34	47		1033 396				7,4 6,7	6,1 2,6	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			24	2 197	18	368	0,61 0,30		18 10				88 73

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittysrajalla. Ympäristöluvan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.

Oma virtaamamittaus 26.5.-25.10., muulloin virtaama arvioitu Tahkonevan pvk2:n valuman avulla.

Pumppaus pintavalutuskentälle aloitettu 1.5.2023.

10.1. kiintoaineen hehkutushäviö 12 mg/l ja hehkutusjäännös 8,4 mg/l.





Omavalvontanäyte 23.7.2023 rankkasateen vuoksi. pH: 6,61, COD_{Mn}: 34 mg/l, Kiintoaine: 5,6 mg/l, Kok.N: 650 µg/l, Kok.P: 27 µg/l, SO₄: 0,76 µg/l. Tulosten analysoinnissa 10 vrk viive.

Omavalvontanäyte 29.7.2023 rankkasateen vuoksi. pH: 6,40, COD_{Mn}: 36 mg/l, Kiintoaine: 5,6 mg/l, Kok.N: 770 µg/l, Kok.P: 36 µg/l, SO₄: 0,78 µg/l. Tulosten analysoinnissa 4 vrk viive.

Syys-lokakuun näytteenotot ovat viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.

24.10. pumppaus pvk:lle on lopetettu. Näyte otettu vsp 1:ltä. Mittapato padottaa. Arvioitu todellinen virtaama 5-10 l/s.

Lahnasneva, pvk 1 ap mp 1
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023
Kohde: Lahnasneva, pvk 1 ap mp 1

Haltija/tuottaja: Turveruukki Oy

Kunta: Siikalatva, Pulkvila

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: talvi la/kesä pvk (ojittamaton)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistö: Naarastenoja - Lamujoki -

Siikajoki (57.069)


Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7130500-432783, Pvk yp (la 1-3 ap mp)

Näytetiedot			Veden laatu								Reduktio %									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%
Pvk:n yläpuoli																				
1	pvk1 yp	10.5.23	6,3	26	200		1 300				140	10.5.23	27	76		28				98
2	pvk1 yp	7.6.23	6,7	17	130		840				18	7.6.23	-12	86		54				92
3	pvk1 yp	5.7.23	6,0	50	150		3 100				87	5.7.23	40	82		75				94
4	pvk1 yp	17.8.23	6,5	30	110		1 300				19	17.8.23	-33	75		38				62
5	pvk1 yp	18.9.23	6,2	41	93		2 700				44	18.9.23	34	69		67				85
6	pvk1 yp	18.10.23	6,1	42	43		2 800				6,0	18.10.23	26	51		54				53
KEVÄT	n= 1	keskiarvo	6,3	26	200		1 300				140	KEVÄT	27	76		28				98
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,3	32	130		1 747				41	KESÄ	8	81		62				89
ALKUSYKSY	n= 2	keskiarvo	6,1	38	99		2 416				44	ALKUSYKSY	24	75		55				90
1.5.-31.10.	n= 6	keskiarvo	6,2	34	121		2 007				52	1.5.-31.10.	19	76		58				92
Pvk:n alapuoli																				
1	pvk1 ap	10.5.23	6,3	19	49		940				2,6									
2	pvk1 ap	7.6.23	6,7	19	18		390				1,4									
3	pvk1 ap	5.7.23	6,6	30	27		790				5,6									
4	pvk1 ap	17.8.23	6,8	40	28		810				7,2									
5	pvk1 ap	18.9.23	6,5	27	29		880				6,4									
6	pvk1 ap	18.10.23	6,3	31	21		1 300				2,8									
KEVÄT	n= 1	keskiarvo	6,3	19	49		940				2,6									
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,7	30	24		663				4,7									
ALKUSYKSY	n= 2	keskiarvo	6,4	29	25		1 090				4,6									
1.5.-31.10.	n= 6	keskiarvo	6,5	28	29		852				4,3									





Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittysrajalla.

10.5. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 45 mg/l ja hehkutusjäännös 95 mg/l.

5.7. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 37 mg/l ja hehkutusjäännös 50 mg/l.

18.9. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 19 mg/l ja hehkutusjäännös 25 mg/l.

Lahnasneva, pvk 1 ap mp 1
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Mankisenneva, pvk2																								
Haltija/tuottaja:	Neova Oy	Vesien käsittely:	pvk2 (ojitettu)							Tarkkailupisteen											153,7 ha				
Kunta:	Siikalatva	Vesistöalue:	Siikajoki							valuma-ala:															
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	Mankisenoja - Kurranjärvi - Kurranoja - Siikajokii (57.026)							Kuormittava ala															
Tarkkailuluokka:	Ympäri vuotinen	Koordinaatit (ETRS TM35FIN):	7144850-455097, Pvk2ap							valuma-alueella:															



Näytetiedot			Veden laatu										Virtaamatiedot						Kuormitustiedot									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	
1	pvk2	9.1.23	6,4	41	86	64	1 100	140	63	2 800	2,0		1.1. - 25.1.	8,5	11,8	258	1,9	1 046	7,9	279	0,59	0,44	7,5	0,95	0,43	19	14	
2	pvk2	13.2.23	6,3	25	97	70	1 200	37	330	4 400	4,3	8,3	26.1. - 2.3.	11,5	13,2	549	4,1	893	6,7	145	0,56	0,41	7,0	0,21	1,9	26	25	
3	pvk2	21.3.23	6,3	64	910	830	2 500	26	1300	22 000	28	14	3.3. - 17.4.	6,5	12,5	132	0,99	537	4,0	224	3,2	2,9	8,7	0,09	4,5	77	98	
4	pvk2	19.4.23	6,2	15	56		780				2,6		18.4. - 21.4.	38,0	36,3	10 890	82	10 565	80	1 031	3,8		54				179	
5	pvk2	26.4.23											22.4. - 29.4.	-	44,7	14 038	106	12 404	93	1 735	4,8		84				178	
6	pvk2	4.5.23	6,1	28	62		1 300				1,8		30.4. - 5.5.	29,0	38,3	5 541	42	11 642	88	2 121	4,7		98				136	
7	pvk2	8.5.23	6,2	32	110	49	1 000	400	30	1 800	2,0	3,1	6.5. - 19.5.	23,0	30,3	3 104	23	3 237	24	674	2,3	1,0	21	8,4	0,63	38	42	
8	pvk2	22.5.23	6,2	40	68		810				5,2		20.5. - 28.5.	10,0	11,7	387	2,9	686	5,2	179	0,30		3,6				23	
9	pvk2	6.6.23	6,7	33	48	28	610	5	6	1 400	1,0	4,2	29.5. - 12.6.	7,5	11,2	188	1,4	563	4,2	121	0,18	0,10	2,2	0,02	0,02	5,1	3,7	
10	pvk2	20.6.23											13.6. - 26.6.	-	3,4	49	0,37	164	1,2	47	0,11		0,97				2,0	
11	pvk2	4.7.23	6,6	54	160	99	1 200	42	5	4 600	2,8	6,5	27.6. - 10.7.	9,0	14,1	297	2,2	1 360	10	478	1,4	0,88	11	0,37	0,04	41	25	
12	pvk2	18.7.23	6,5	76	310		1 600				9,2		11.7. - 24.7.	7,5	10,0	188	1,4	1 141	8,6	401	1,2		8,9				21	
13	pvk2	2.8.23	6,3	84	150		1 600				12		25.7. - 7.8.	15,0	17,8	1 066	8,0	2 852	21	1 558	2,8		30				223	
14	pvk2	15.8.23	6,3	91	400	270	1 600	28	210	16 000	33	7,6	8.8. - 21.8.	8,0	11,8	221	1,7	526	4,0	311	1,4	0,92	5,5	0,10	0,72	55	113	
15	pvk2	29.8.23	6,4	46	180		970				8,4		22.8. - 14.9.	14,0	17,2	897	6,8	909	6,8	272	1,1		5,7				50	
16	pvk2	5.10.23	6,3	58	76		2 000				3,2		15.9. - 14.10.	23,0	24,3	3 104	23	4 500	34	1 698	2,2		59				94	
17	pvk2	26.10.23	6,2	42	69		1 300				2,4		15.10. - 31.10.	7,0	9,2	159	1,2	3 194	24	873	1,4		27				50	
18	pvk2	2.11.23	6,1	37	60	29	1 500	20	990	2 100	1,0	6,6	1.11. - 3.11.	9,0	9,9	297	2,2	366	2,8	88	0,14	0,07	3,6	0,05	2,4	5,0	2,4	
19	pvk2	6.11.23	6,6	34	110	75	1 500	170	680	2 600	1,0	5,5	4.11. - 19.11.	14,0	15,0	897	6,8	1 064	8,0	235	0,76	0,52	10	1,2	4,7	18	6,9	
20	pvk2	4.12.23	6,4	39	310	63	1 500	98	700	3 000	1,6	7,0	20.11. - 31.12.	8,5	10,6	258	1,9	477	3,6	121	0,96	0,20	4,7	0,30	2,2	9,3	5,0	
TALVI n= 3	keskiarvo keskihajonta		6,3 20	36 473	287 441	321 781	1 395 781	68 63	564 651	9 733 10 653	9,2 14	11	TALVI		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			2,4	777	5,9	211	1,7 1,6	1,5	7,9 5,3	0,34	2,7	46	54 48
KEVÄT n= 3	keskiarvo keskihajonta		6,2 8,9	25 30	76 30	49 261	1 027 261	400 261	30	1 800	2,1 0,42	3,1	KEVÄT		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			63	7 963	60	1 233	3,5 2,5	1,0	54 29	8,4	0,63	38	111 59
KESÄ n= 7	keskiarvo keskihajonta		6,4 23	61 127	188 124	132 415	1 199 415	25 19	74 118	7 333 7 674	10 11	6,1 1,7	KESÄ		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			4,9	1 032	7,8	417	1,1 0,99	0,63	8,4 6,1	0,16	0,25	33	57 53
ALKUSYKSY n= 2	keskiarvo keskihajonta		6,2 11	50 4,9	73 4,9		1 650 495				2,8 0,57		ALKUSYKSY		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			12	4 055	31	1 417	2,0 1,4		48 35				79 52
LOPPUSYKSY n= 3	keskiarvo keskihajonta		6,3 2,5	37 132	160 24	56 0,00	1 500 75	96 75	790 173	2 567 451	1,2 0,35	6,4 0,78	LOPPUSYKSY		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			3,6	626	4,7	149	0,87 0,79	0,27	6,1 4,1	0,52	2,8	11	5,4 1,3
VUOSI n= 18	keskiarvo keskihajonta		6,3 21	47 208	181 246	158 246	1337 456	97 120	431 462	6070 7 034	6,8 9,2	7,0 3,1	VUOSI		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			16	1 886	14	512	1,6 1,3	0,97	17 11	0,86	2,2	34	55 43

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

Virtaamatiedot EHP Mankisenneva pvk1

Ympäristöluvan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.

21.3. pvk2 kiintoaineen hehkutushäviö 20 mg/l ja hehkutusjäännös 7,6 mg/l

26.4. Näytteitä ei saanut otettua liian upottavan lumen takia.





Jakson 22.4.-29.4. kuormitus on laskettu näytteiden 29.4. ja 4.5. tulosten keskiarvolla.

20.6. Ei virtausta, ei näytettä. Jakson 13.6.-26.6. kuormitus on laskettu 6.6. ja 4.7. tulosten keskiarvolla.

15.8. Kiintoaineen hehkutushäviö 28 mg/l ja hehkutusjäännös 4,7 mg/l.

Syys-lokakuussa näytteitä on jäänyt hakematta useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.

Mankisenneva, pvk2
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023
Kohde: Mankisenneva, pvk2

Haltija/tuottaja: Neova Oy

Kunta: Siikalatva

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk2 (ojitettu)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistö: Mankisenoja - Kurranjärvi -

Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7145079-454431, Pvk2yp

Näytetiedot			Veden laatu										Reduktio %									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m		%	%	%	%	%	%	%	%	
Pvk:n yläpuoli																						
1	pvk2 yp	9.1.23	6,5	24	200	180	2 000	220	1 400	7 100	16		9.1.23	-71	57	64	45	36	96	61	88	
2	pvk2 yp	13.2.23	6,8	23	240	250	1 700	220	1 300	7 300	10	10	13.2.23	-9	60	72	29	83	75	40	57	
3	pvk2 yp	21.3.23	6,6	18	160	130	1 900	290	1 200	6 300	26	9	21.3.23	-256	-469	-538	-32	91	-8	-249	-8	
4	pvk2 yp	8.5.23	6,6	28	95	74	1 400	160	820	3 200	5,2	5,0	8.5.23	-14	-16	34	29	-150	96	44	62	
5	pvk2 yp	6.6.23	7,1	26	110	66	910	46	270	4 600	12	8,9	6.6.23	-27	56	58	33	89	98	70	92	
6	pvk2 yp	4.7.23	6,7	41	190	110	1 600	38	830	7 600	14	8,7	4.7.23	-32	16	10	25	-11	99	39	80	
7	pvk2 yp	15.8.23	6,7	39	220	170	1 100	26	720	7 600	15	8,4	15.8.23	-133	-82	-59	-45	-8	71	-111	-120	
8	pvk2 yp	2.11.23	6,7	24	150	140	2 000	160	1 600	6 800	29	11	2.11.23	-54	60	79	25	88	38	69	97	
9	pvk2 yp	6.11.23	6,5	24	120	110	1 500	220	870	4 700	24	6,8	6.11.23	-42	8	32	0	23	22	45	96	
10	pvk1 yp	4.12.23	6,6	25	170	160	1 900	160	1 300	6 500	9	11	4.12.23	-56	-82	61	21	39	46	54	83	
TALVI n= 3 keskiarvo			6,6	22	200	187	1 867	243	1 300	6 900	17	9,6	TALVI	-100	-82	-72	14	72	57	-41	34	
KEVÄT n= 1 keskiarvo			6,6	28	95	74	1 400	160	820	3 200	5,2	5,0	KEVÄT	-14	-16	34	29	-150	96	44	62	
KESÄ n= 3 keskiarvo			6,8	35	173	115	1 203	37	607	6 600	14	8,7	KESÄ	-68	-17	-15	6	32	88	-11	10	
ALKUSYKSY n= 0 keskiarvo													ALKUSYKSY									
LOPPUSYKSY n= 3 keskiarvo			6,6	24	147	137	1 800	180	1 257	6 000	21	9,6	LOPPUSYKSY	-51	-9	59	17	47	37	57	94	
VUOSI n= 10 keskiarvo			6,7	27	166	139	1 601	154	1 031	6 170	16	8,8	VUOSI	-65	-38	-13	14	37	58	2	52	
Pvk:n alapuoli																						
1	pvk2 ap	9.1.23	6,4	41	86	64	1 100	140	63	2 800	2,0											
2	pvk2 ap	13.2.23	6,3	25	97	70	1 200	37	330	4 400	4,3	8,3										
3	pvk2 ap	21.3.23	6,3	64	910	830	2 500	26	1300	22 000	28	14										
4	pvk2 ap	8.5.23	6,2	32	110	49	1 000	400	30	1 800	2,0	3,1										
5	pvk2 ap	6.6.23	6,7	33	48	28	610	5	6	1 400	1,0	4,2										
6	pvk2 ap	4.7.23	6,6	54	160	99	1 200	42	5	4 600	2,8	6,5										
7	pvk2 ap	15.8.23	6,3	91	400	270	1 600	28	210	16 000	33	7,6										
8	pvk2 ap	2.11.23	6,1	37	60	29	1 500	20	990	2 100	1,0	6,6										
9	pvk2 ap	6.11.23	6,6	34	110	75	1 500	170	680	2 600	1,0	5,5										
10	pvk2 ap	4.12.23	6,4	39	310	63	1 500	98	700	3 000	1,6	7,0										
TALVI n= 3 keskiarvo			6,3	43	364	321	1 600	68	564	9 733	11	11										
KEVÄT n= 1 keskiarvo			6,2	32	110	49	1 000	400	30	1 800	2,0	3,1										
KESÄ n= 3 keskiarvo			6,5	59	203	132	1 137	25	74	7 333	12	6,1										
ALKUSYKSY n= 0 keskiarvo																						
LOPPUSYKSY n= 3 keskiarvo			6,3	37	160	56	1 500	96	790	2 567	1,2	6,4										
VUOSI n= 10 keskiarvo			6,3	45	229	158	1 371	97	431	6 070	7,7	7,0										





Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittäysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittäysrajalla.

21.3. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 10 mg/l ja hehkutusjäännös 16 mg/l

2.11. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 17 mg/l ja hehkutusjäännös 12 mg/l

6.11. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 15 mg/l ja hehkutusjäännös 92, mg/l

Mankisenneva, pvk2
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Paskoneva, pvk1																			
Haltija/tuottaja:	Neova Oy		Vesien käsittely:		pvk1 (ojitettu)		Tarkkailupisteen													
Kunta:	Haapavesi		Vesistöalue:		Siikajoki		valuma-ala:		100,4		ha									
ELY-keskus:	POPELY		Purkuvesistö:		laskuoja - Pasko-oja - Ristisenoja -															
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen				Lamujoki - Siikajoki 57.068		Kuormittava ala													
Koordinaatit (ETRS TM35FIN):										7120456-432021, Pvk1ap		77,6		ha						



AFRY
AF PÖYRY



Näytetiedot		Veden laatu										Virtaamatiedot						Kuormitustiedot							
Näyte	Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
												MP	EHP	Q	q	Q	q								
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	pvm	cm	cm	m³/d	l/s km²	m³/d	l/s km²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	12.1.23	5,6	48	42	20	1 700			1,1	1.1. - 27.1.	7,5	7,1	188	2,2	503	5,8	240	0,21		8,5		1,5	15	5,5
2	pvk1	14.2.23	5,4	61	35		1 100			1,0	28.1. - 2.3.	3,0	2,6	19	0,22	61	0,70	37	0,02	0,10	0,67				0,61
3	pvk1	20.3.23									3.3. - 2.4.	2,0	1,5	6,9	0,08	3,5	0,04	2,1	0,00		0,04				0,03
4	pvk1	18.4.23	5,6	79	76		1 600			2,8	3.4. - 20.4.	4,0	3,9	39	0,45	84	0,97	66	0,06		1,3				2,3
5	pvk1	25.4.23	5,5	42	50		770			1,2	21.4. - 28.4.	6,5	6,3	132	1,5	4 098	47	1 714	2,0		31				49
6	pvk1	4.5.23	5,6	29	32		2 000			1,0	29.4. - 6.5.	22,0	22,5	2 777	32	4 797	55	1 386	1,5		96				48
7	pvk1	11.5.23	5,6	33	43		1 100			1,2	7.5. - 16.5.	7,5	7,3	188	2,2	677	7,8	223	0,29		7,4				8,1
8	pvk1	24.5.23	5,5	42	27		860			1,0	17.5. - 30.5.	9,0	8,6	297	3,4	273	3,2	114	0,07		2,3				2,7
9	pvk1	8.6.23	5,5	45	26	7	890	21	1 300	1,0	31.5. - 12.6.	4,0	4,2	39	0,45	77	0,89	34	0,02	0,01	0,68		0,02	0,99	0,76
10	pvk1	19.6.23									13.6. - 26.6.	1,0	0,5	1,2	0,01	0,64	0,01	0,29	0,00		0,01				0,01
11	pvk1	5.7.23	5,3	53	43	10	1 200	5	1 900	1,0	27.6. - 11.7.	12,0	12,7	610	7,0	209	2,4	110	0,09	0,02	2,5		0,01	3,9	2,1
12	pvk1	19.7.23									12.7. - 24.7.	2,0	1,6	6,9	0,08	184	2,1	97	0,08		2,2				1,8
13	pvk1	31.7.23	5,2	53	28		1 500			1,2	25.7. - 7.8.	19,0	19,4	1 925	22	1 867	22	985	0,52		28				22
14	pvk1	17.8.23	5,4	94	70	17	1 700	13	5 200	6,5	8.8. - 22.8.	5,0	4,9	68	0,79	60	0,70	57	0,04	0,01	1,0		0,01	3,1	3,9
15	pvk1	30.8.23	5,5	61	42		1 200			4,4	23.8. - 14.9.	12,5	12,7	676	7,8	911	10	553	0,38		11				40
16	pvk1	18.9.23	5,4	47	26		1 300			1,0	15.9. - 24.9.	21,0	20,5	2 472	29	1 980	23	927	0,51		26				20
17	pvk1	3.10.23	5,3	46	29		1 900			1,0	25.9. - 10.10.	26,0	24,4	4 217	49	2 976	34	1 364	0,86		56				30
18	pvk1	19.10.23	5,3	38	18		2 100			1,0	11.10. - 21.10.	16,5	16,0	1 353	16	4 121	48	1 560	0,74		86				41
19	pvk1	26.10.23	5,4	30	28		1 200			1,6	22.10. - 31.10.	4,0	3,5	39	0,45	52	0,60	16	0,01		0,63				0,83
20	pvk1	7.11.23	5,7	43	55		1 900			2,6	1.11. - 23.11.	15,5	15,9	1 157	13	512	5,9	219	0,28		9,7				13
21	pvk1	11.12.23									24.11. - 31.12.	2,0	1,9	6,9	0,08	13	0,14	5,6	0,01		0,25				0,34
TALVI n= 4	keskiarvo keskihajonta	5,5	58	51	20	1 293		290	2 900	1,5					0,89	424	4,9	193	0,20	0,10	4,5		1,5	15	5,1
			16	18		436				0,85									0,12		2,4				0,89
KEVÄT n= 1	keskiarvo keskihajonta	5,6	29	32		2 000				1,0					32	4 797	55	1 386	1,5		96				48
																			0,57		72				0,00
KESÄ n= 7	keskiarvo keskihajonta	5,4	54	40	11	1 207		13	2 800	2,3					4,9	508	5,9	269	0,18	0,01	6,6		0,01	2,8	11
			20	15	5,4	306		8,0	2 100	2,2									0,08		4,0				6,1
ALKUSYKSY n= 4	keskiarvo keskihajonta	5,4	40	25		1 625				1,2					23	2 476	29	1 053	0,59		46				25
			7,9	5,0		443				0,30									0,09		34				0,06
LOPPUSYKSY n= 1	keskiarvo keskihajonta	5,7	43	55		1 900				2,6					6,7	201	2,3	86	0,11		3,8				5,2
																			0,07		2,8				3,2
VUOSI n= 17	keskiarvo keskihajonta	5,4	50	39	13	1413		82	2825	1,8					8,9	777	9,0	339	0,26	0,05	12		0,58	7,4	11
			17	16	6	421		139	1 715	1,5									0,10		8,6				3,0

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittämissä. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittämissä.

Näytteenottorytmi ja analyysit vaihdettu helmikuussa.

20.3. virtaama liian pieni edustavaan näytteenottoon. Jakson 3.3.-2.4. kuormitus on laskettu 14.2. näytteenoton tuloksilla.





19.6. Virtaama liian pieni ja näytettä ei saatu otettua. Jakson 13.6.-26.6. kuormitus on laskettu 8.6. näytteenoton tuloksilla.

19.7. Virtaama liian pieni ja näytettä ei saatu otettua. Jakson 12.7.-24.7. kuormitus on laskettu 5.7. näytteenoton tuloksilla.

Syys-lokakuun näytteenotot ovat viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisten sairastumisen vuoksi.

11.12. Virtaama liian pieni edustavaan näytteenottoon. Jakson 24.11.-31.12. kuormitus laskettu 7.11. näytteenoton tuloksilla.

Paskoneva, pvk1
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Paskoneva, pvk1

Haltija/tuottaja: Neova Oy

Kunta: Haapavesi

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk1 (ojitettu)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistö: laskuoja - Pasko-oja - Ristisenoja -

Lamujoki - Siikajoki 57.068

Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7120632-432025, Pvk1yp







Näytetiedot			Veden laatu									Reduktio %									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%	
Pvk:n yläpuoli																					
1	pvk1 yp	12.1.23	6,3	34	110	100	3 000		2 200	10 000	19	12.1.23	-41	62	80	43		87	71	94	
2	pvk1 yp	8.6.23	6,8	39	130	32	1 100		5	5 600	10	8.6.23	-15	80	79	19		-320	77	90	
3	pvk1 yp	5.7.23	6,6	34	140	84	2 000		660	11 000	16	5.7.23	-56	69	89	40		99	83	94	
4	pvk1 yp	17.8.23	6,4	65	150	84	2 500		750	11 000	19	17.8.23	-45	53	80	32		98	53	66	
TALVI		n= 1 keskiarvo	6,3	34	110	100	3 000		2 200	10 000	19	TALVI	-41	62	80	43		87	71	94	
KESÄ		n= 3 keskiarvo	6,6	46	140	67	1 867		472	9 200	15	KESÄ	-39	67	83	32		97	70	81	
VUOSI		n= 4 keskiarvo	6,5	43	133	75	2 150		904	9 400	16	VUOSI	-40	66	82	36		91	70	85	
Pvk:n alapuoli																					
1	pvk1 ap	12.1.23	5,6	48	42	20	1 700		290	2 900	1,1										
2	pvk1 ap	8.6.23	5,5	45	26	7	890		21	1 300	1										
3	pvk1 ap	5.7.23	5,3	53	43	10	1 200		5	1 900	1										
4	pvk1 ap	17.8.23	5,4	94	70	17	1 700		13	5 200	6,5										
TALVI		n= 1 keskiarvo	5,6	48	42	20	1 700		290	2 900	1,1										
KESÄ		n= 3 keskiarvo	5,4	64	46	11	1 263		13	2 800	2,8										
VUOSI		n= 4 keskiarvo	5,4	60	45	13	1 373		82	2 825	2,4										

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.





9.1. pvk1yp kiintoaineen hehkutushäviö 12 mg/l ja hehkutusjäännös 8,0 mg/l.

Helmikuussa tehon tarkkailu on muutettu kesäaikaiseksi. 3 krt/v kesä-, heinä- ja elokuussa.





Paskoneva, pvk1
Tehon tarkkailu







Pullinneva, pvk1
Päästötarkkailu



Pullinneva, pvk1
Tehon tarkkailu



Puronräme, pvk2
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Puronrämpe, pvk2

Haltija/tuottaja: Neova Oy

Kunta: Vaala

ELY-keskus: POPELY

Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk2 (ojitettu)

Vesistöalue: Siikajoki

Purkuvesistö: laskuoja - Neittävänjoki - Siikajoki (57.042)



Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7144624-475698, Pvk2yp





Näytetiedot			Veden laatu									Reduktio %								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%
Pvk:n yläpuoli																				
1	pvk2 yp	9.1.23	6,2	31	82		2 700				7,2	9.1.23	-74	55		44				78
2	pvk2 yp	6.6.23	6,7	33	92	43	1 100	17	160	5 800	13	6.6.23	9	77	93	40	-29	54	79	75
3	pvk2 yp	4.7.23	6,6	46	170	92	1 500	43	30	12 000	13	4.7.23	11	79	93	51	81	83	81	69
4	pvk2 yp	15.8.23	6,1	70	170	100	3 200	31	1 500	10 000	22	15.8.23	-26	51	80	38	55	76	28	32
TALVI	n= 1	keskiarvo	6,2	31	82		2 700				7,2	TALVI	-74	55		44				78
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,4	50	144	78	1 933	30	563	9 267	16	KESÄ	-7	68	87	41	51	74	62	54
VUOSI	n= 4	keskiarvo	6,3	45	129	78	2 125	30	563	9 267	14	VUOSI	-18	66	87	42	51	74	62	57
Pvk:n alapuoli																				
1	pvk2 ap	9.1.23	5,4	54	37		1 500				1,6									
2	pvk2 ap	6.6.23	5,5	30	21	3	660	22	73	1 200	3,2									
3	pvk2 ap	4.7.23	5,4	41	35	7	740	8	5	2 300	4,0									
4	pvk2 ap	15.8.23	5,1	88	84	20	2 000	14	360	7 200	15									
TALVI	n= 1	keskiarvo	5,4	54	37		1 500				1,6									
KESÄ	n= 3	keskiarvo	5,3	53	47	9,8	1 133	15	146	3 567	7,4									
VUOSI	n= 4	keskiarvo	5,3	53	44	10	1 225	15	146	3 567	6,0									

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittysrajalla.

Helmikuussa tehon tarkkailu on muutettu kesäaikaiseksi. 3 krt/v kesä-, heinä- ja elokuussa.

15.8. pvk2yp kiintoaineen hehkutushäviö 21 mg/l ja hehkutusjäännös <1

Puronräme, pvk2
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023





Kohde:	Saari-Teerineva, pvk 1			
Haltija/tuottaja:	Neova Oy	Vesien käsittely:	pvk1	
Kunta:	Pyhäntä	Vesistöalue:	Siikajoki	
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	laskuoja - Pahkapuro - Siikajoki (57.037)	
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen	Koordinaatit (ETRS TM35FIN):	7114999-485011, Pvk1ap	
				Tarkkailupisteen valuma-ala: pvk1123,7 ha
				Kuormittava ala valuma-alueella:114,8 ha

Näytetiedot			Veden laatu									Virtaamatiedot						Kuormitustiedot									
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		MP	EHP	Q	q	Q	q	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	
1	pvk1	9.1.23	6,5	24	48	32	1 700	290	1000	5 800	6,6	1.1. - 25.1.	9,0	9,5	297	2,8	835	7,8	162	0,32	0,22	11	2,0	6,7	39	45	
2	pvk1	13.2.23	6,5	22	37	26	1 300	220	690	5 600	7,8	26.1. - 3.3.	11,5	11,0	549	5,1	514	4,8	91	0,15	0,11	5,4	0,91	2,9	23	32	
3	pvk1	23.3.23	6,5	20	49	50	1 700	260	860	10 000	19	4.3. - 17.4.	8,5	10,0	258	2,4	409	3,8	66	0,16	0,17	5,6	0,86	2,8	33	63	
4	pvk1	19.4.23	6,3	17	34		1 300				15	18.4. - 21.4.	20,5	19,8	2 328	22	7 096	66	975	2,0		75				860	
5	pvk1	26.4.23	5,7	22	15	6	880	280	180	940	1,4	22.4. - 29.4.	-	-	14 669	137	12 420	116	2 209	1,5	0,58	88	28	18	94	141	
6	pvk1	4.5.23										30.4. - 5.5.	-	-	11 245	105	10 987	103	1 910	1,6		92				151	
7	pvk1	8.5.23	5,9	21	21		1 200				2,0	6.5. - 10.5.	-	-	712	6,7	5 641	53	958	0,96		55				91	
8	pvk1	15.5.23	6,2	31	40	15	1 400	370	320	2 600	13	11.5. - 19.5.	23,0	23,0	3 104	29	1 382	13	346	0,45	0,17	16	4,1	3,6	29	145	
9	pvk1	22.5.23	6,1	35	38		1 100				5,1	20.5. - 28.5.	15,0	13,2	1 066	10,0	523	4,9	148	0,16						22	
10	pvk1	5.6.23	6,9	29	48	18	850	120	77	5 100	10	29.5. - 11.6.	13,5	13,2	819	7,7	335	3,1	79	0,13	0,05	2,3	0,32	0,21	14	27	
11	pvk1	20.6.23	6,6	38	62		1 000				18	12.6. - 25.6.	5,0	3,9	68	0,64	174	1,6	54	0,09		1,4				25	
12	pvk1	3.7.23	6,7	46	62	25	1 200	78	86	8 000	8,0	26.6. - 9.7.	6,0	4,6	108	1,0	1 403	13	522	0,70	0,28	14	0,88	0,98	91	91	
13	pvk1	17.7.23	6,7	44	71		1 600				20	10.7. - 24.7.	22,0	20,9	2 777	26	2 255	21	802	1,3		29				365	
14	pvk1	2.8.23										25.7. - 7.8.	-	-	1 852	17	4 486	42	236	1,9		69				392	
15	pvk1	14.8.23										8.8. - 20.8.	-	-	231	2,2	256	2,4	13	0,11		3,9				22	
16	pvk1	29.8.23										21.8. - 14.9.	-	-	465	4,3	1 098	10	58	0,47		17				96	
17	pvk1	23.10.23	6,3	30	34		2 200				1,6	15.9. - 25.10.	47,0	-	18 528	173	3 424	32	830	0,94		61				44	
18	pvk1	30.10.23										26.10. - 31.10.	-	-	187	1,8	177	1,7	43	0,05		3,1				2,3	
19	pvk1	8.11.23	6,5	24	24		1 800				4,4	1.11. - 11.11.	49,5	-	21 091	197	1 384	13	268	0,27		20				49	
20	pvk1	16.11.23	6,4	23	37	27	1 500	480	520	4 500	2,4	12.11. - 17.11.	48,0	-	19 529	183	225	2,1	42	0,07	0,05	2,7	0,87	0,94	8,2	4,4	
21	pvk1	21.11.23	6,6	23	39		1 400				3,6	18.11. - 1.12.	48,0	-	19 529	183	255	2,4	48	0,08		2,9				7,4	
22	pvk1	13.12.23										2.12. - 31.12.	47,0	-	192	1,8	215	2,0	40	0,06		2,7				6,0	
TALVI n= 3		keskiarvo keskihajonta	6,5 2,0	22 6,7	45 12	36 231	1 567 35	257 35	850 155	7 133 2 485	11 6,8	TALVI		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			3,4	548	5,1	98	0,20 0,11	0,16	7,0 4,8	1,1	3,8	31	48 44
KEVÄT n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,0 5,9	23 12	28 7	10 225	1 195 64	325 99	250 1 174	1 770 7,9	7,9 7,2	KEVÄT		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			60	7 289	68	1 260	1,2 0,05	0,36	62 33	15	10	60	247 188
KESÄ n= 5		keskiarvo keskihajonta	6,5 6,9	38 13	56 22	11 150 283	99 30	99 6,4	82 2 051	6 550 6,5	12 6,5	KESÄ		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			8,6	1 330	12	228	0,61 0,40	0,16	18 13	0,58	0,56	50	133 122
ALKUSYKSY n= 1		keskiarvo keskihajonta	6,3	30	34		2 200				1,6	ALKUSYKSY		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			88	3 078	29	747	0,85 0,35		55 42				40 15
LOPPUSYKSY n= 3		keskiarvo keskihajonta	6,5 0,58	23 8,1	33 8,1	27 13	1 567 360	480 129	520 357	4 500 2 846	3,5 6,5	LOPPUSYKSY		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			113	435	4,1	83	0,10 0,03	0,05	5,9 4,1	0,87	0,94	8,2	14 10
VUOSI n= 16		keskiarvo keskihajonta	6,3 8,7	28 15	41 13	25 360	1383 360	262 129	467 357	5318 2 846	8,6 6,5	VUOSI		Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			49	1 699	16	323	0,49 0,22	0,17	21 15	2,4	3,7	36	86 72

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

1.1.-21.4. ja 15.5.-28.7.oma virtaamamittaus. 22.4.-14.5. ja 29.7.-31.12. padotus, virtaama arvioitu läheisen Ahmonsuon valuman avulla.	3.5. omavalvontanäyte: pH 5,47, CODMn 22 mg/l, kiintoaine 5,6 mg/l, kok.N 1100 µg/l, kok.P 19 µg/l.
26.4. Virtaamaa ei voitu määrittää. Vesipinta lähes kaivon sisäkannen tasolla.	Jaksojen 25.7.-7.8. kuormitukset on määritetty 17.7. ja 23.10. näytteenottojen tulosten keskiarvoilla.
4.5. Mittapadon alapuoli tulvi, vesi seisoo, ei virtausta.	23.10. Vesi padottaa ja vesipinnat samalla tasolla.
Jakson 30.4.-5.5. kuormitus on määritetty 26.4. ja 8.5. näytteenottojen tulosten keskiarvoilla.	30.10. Vesi padottaa, ei virtaamaa ja vesipinnat samalla tasolla.
8.5. Mittapato on kokonaan veden alla.	Jakson 26.10.-31.10. kuormitus on määritetty 23.10. näytteen tuloksilla.
17.7. Pvk1 kiintoaineen hehkutusjäännös 4,8 mg/l ja hehkutushäviö 16 mg/l.	Syys-lokakuun näytteenotot ovat osaksi jääneet ottamatta tai viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.
2.8. Mittapadon alapuolinen vedenkorkeus samalla tasolla. Padottaa, ei näytettä.	16.11. ja 21.11. Mittapato kokonaan veden alla. Vesipinnat samalla tasolla, padottaa, vesi virtaa.
14.8. ja 29.8. Seisova vesi, padottaa, ei näytettä.	13.12. Mittapato kokonaan veden alla, padottaa, seisova vesi, ei näytettä. Jakson 2.-31.12. kuormitus laskettu loppusyksyn pitoisuuksien keskiarvoilla.

Saari-Teerineva, pvk 1
Päästötarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Saari-Teerineva, pvk 1
 Haltija/tuottaja: Neova Oy
 Kunta: Pyhäntä
 ELY-keskus: POPELY
 Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: pvk1
 Vesistöalue: Siikajoki
 Purkuvesistö: laskuoja - Pahkapuro - Siikajoki (57.037)



Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7115257-485096, pvk1yp

Näytetiedot			Veden laatu									Reduktio %								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%
Pvk:n yläpuoli																				
1	pvk1 yp	9.1.23	6,3	27	83	61	2 800	26	1 900	11 000	19	9.1.23	11	42	48	39	-1015	47	47	65
2	pvk1 yp	13.2.23	6,4	31	80	53	2 100	39	1 500	17 000	46	13.2.23	29	54	51	38	-464	54	67	83
3	pvk1 yp	23.3.23	6,5	24	120	98	2 100	63	1 500	15 000	77	23.3.23	17	59	49	19	-313	43	33	75
4	pvk1 yp	26.4.23	5,7	20	16	3	1 000	290	400	1 200	3,2	26.4.23	-10	6	-132	12	3	55	22	56
5	pvk1 yp	15.5.23	6,3	34	70	31	2 000	110	1 200	4 000	97	15.5.23	9	43	52	30	-236	73	35	87
6	pvk1 yp	5.6.23	6,7	29	61	25	950	16	340	6 900	19	5.6.23	0	21	28	11	-650	77	26	47
7	pvk1 yp	3.7.23	6,7	40	91	44	1 600	33	640	10 000	11	3.7.23	-15	32	43	25	-136	87	20	27
8	pvk1 yp	8.11.23	6,5	21	24	17	1 900	310	1 200	2 900	3,6	8.11.23	-14	0		5				-22
TALVI	n= 3	keskiarvo	6,4	27	94	71	2 333	43	1 633	14 333	47	TALVI	20	53	49	33	-502	48	50	76
KEVÄT	n= 2	keskiarvo	5,9	27	43	17	1 500	200	800	2 600	50	KEVÄT	2	36	38	24	-63	69		86
KESÄ	n= 2	keskiarvo	6,7	35	76	35	1 275	25	490	8 450	15	KESÄ	-9	28	38	20	-304	83	22	40
ALKUSYKSY	n= 0	keskiarvo										ALKUSYKSY								
LOPPUSYKSY	n= 1	keskiarvo	6,5	21	24	17	1 900	310	1 200	2 900	3,6	LOPPUSYKSY	-14	0		5				-22
VUOSI	n= 12	keskiarvo	6,2	28	68	41	1 806	111	1 085	8 500	34	VUOSI	4	41	41	25	-108	58	36	75
Pvk:n alapuoli																				
1	pvk1 ap	9.1.23	6,5	24	48	32	1 700	290	1000	5 800	6,6									
2	pvk1 ap	13.2.23	6,5	22	37	26	1 300	220	690	5 600	7,8									
3	pvk1 ap	23.3.23	6,5	20	49	50	1 700	260	860	10 000	19									
4	pvk1 ap	26.4.23	5,7	22	15	6	880	280	180	940	1,4									
5	pvk1 ap	15.5.23	6,2	31	40	15	1 400	370	320	2 600	13									
6	pvk1 ap	5.6.23	6,9	29	48	18	850	120	77	5 100	10,0									
7	pvk1 ap	3.7.23	6,7	46	62	25	1 200	78	86	8 000	8,0									
8	pvk1 ap	8.11.23	6,5	24	24		1 800				4,4									
TALVI	n= 3	keskiarvo	6,5	22	45	36	1 567	257	850	7 133	11									
KEVÄT	n= 2	keskiarvo	5,9	27	28	10	1 140	325	250	1 770	7,2									
KESÄ	n= 2	keskiarvo	6,8	38	55	22	1 025	99	82	6 550	9,0									
ALKUSYKSY	n= 0	keskiarvo																		
LOPPUSYKSY	n= 1	keskiarvo		24	24		1 800				4,4									
VUOSI	n= 12	keskiarvo	6,3	27	40	25	1 354	231	459	5 434	8,8									

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittäysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittäysrajalla.

13.2. pvk1yp kiintoaineen hehkutusjäännös 20 mg/l ja hehkutushäviö 26 mg/l.





13.12. Ei näytettä ap pisteeltä.

23.3. pvk1yp kiintoaineen hehkutusjäännös 64 mg/l ja hehkutushäviö 12 mg/l.

8.11. Ap pisteeltä määritetty laboratorion virheen vuoksi suppea analyysivalikko.

15.5. pvk1yp kiintoaineen hehkutusjäännös 79 mg/l ja hehkutushäviö 18 mg/l.

Saari-Teerineva, pvk 1 Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Sauvasuo, pvk 1				Tarkkailupisteen	
Haltija/tuottaja:	Neova Oy	Vesien käsittely:	pvk1		valuma-ala:	
Kunta:	Pyhäntä	Vesistöalue:	Siikajoki		pvk1	33,1 ha
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	laskuoja - Siikajoki (57.033)			
Tarkkailuluokka:	Ympärivuotinen	Koordinaatit (ETRS TM35FIN):	7111415-482271, Pvk1ap		Kuormittava ala	
					valuma-alueella:	30,5 ha



Näytetiedot			Veden laatu									Virtaamatiedot						Kuormitustiedot								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
													MP	EHF	Q	q	Q	q								
N:o	Tunnus		mg/l		µg/l	µg/l	µg/l		µg/l	µg/l	mg/l	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	9.1.23	5,8	33	17	4	910	180	57	2 100	1,6	1.1. - 25.1.	5,0		68	2,4	15	0,54	15	0,01	0,00	0,42	0,08	0,03	0,97	0,74
2	pvk1	13.2.23	5,9	43	14	2	1 300	100	550	2 900	2,6	26.1. - 3.3.	6,5		132	4,6	84	2,9	109	0,04	0,01	3,3	0,25	1,4	7,4	6,6
3	pvk1	23.3.23	6,1	99	25	21	2 900	48	1400	66 000	23	4.3. - 4.4.	6,0		108	3,8	42	1,5	126	0,03	0,03	3,7	0,06	1,8	84	29
4	pvk1	19.4.23	6,1	38	35		1 200				8,0	5.4. - 20.4.	13,0		745	26	168	5,9	193	0,18		6,1			41	
5	pvk1	26.4.23	5,7	26	17	3	750	70	340	2 400	2,0	21.4. - 29.4.	23,0		3 104	109	3 344	117	2 627	1,7	0,34	76	7,1	34	242	202
6	pvk1	4.5.23	5,8	23	21		1 100				1,7	30.4. - 5.5.	24,0		3 452	121	2 940	103	2 043	1,9		98			151	
7	pvk1	8.5.23	5,7	27	30	10	1 400	170	580	2 600	2,8	6.5. - 16.5.	22,0		2 777	97	1 184	41	966	1,1	0,36	50	6,1	21	93	100
8	pvk1	22.5.23	5,5	33	34		670				8,8	17.5. - 28.5.	8,0		221	7,7	187	6,5	186	0,19		3,8			50	
9	pvk1	5.6.23										29.5. - 11.6.			68	2,4	80	2,8	120	0,10		2,3			13	
10	pvk1	20.6.23	5,9	50	42		950				5,4	12.6. - 25.6.	3,5		28	0,98	28	0,97	42	0,04		0,79			4,5	
11	pvk1	3.7.23	5,8	88	56	12	1 400	41	48	37 000	37	26.6. - 9.7.	6,5		132	4,6	353	12	937	0,60	0,13	15	0,44	0,51	394	394
12	pvk1	17.7.23	5,8	95	41		1 700				27	10.7. - 24.7.	7,0		159	5,5	277	9,7	794	0,34		14			226	
13	pvk1	2.8.23	5,8	68	50		2 400				20	25.7. - 7.8.	18,5		1 801	63	1 106	39	2 272	1,7		80			668	
14	pvk1	14.8.23	6,1	100	61	11	2 100	65	540	45 000	53	8.8. - 20.8.	7,5		188	6,6	69	2,4	207	0,13	0,02	4,4	0,13	1,1	93	110
15	pvk1	29.8.23	5,9	27	27		730				15	21.8. - 14.9.	6,5		132	4,6	294	10	240	0,24		6,5			133	
16	pvk1	23.10.23	5,5	31	23		1 400				5,0	15.9. - 25.10.	9,0		297	10	916	32	858	0,64		39			138	
17	pvk1	30.10.23	5,6	26	22	4	1 200	34	680	2 200	2,8	26.10. - 31.10.	7,0		159	5,5	47	1,7	37	0,03	0,01	1,7	0,05	0,97	3,1	4,0
18	pvk1	8.11.23	6,2	21	19		1 300				2,4	1.11. - 11.11.	17,5		1 567	55	370	13	235	0,21		15			27	
19	pvk1	16.11.23	5,7	20	18	5	980	88	580	1 700	1,2	12.11. - 28.11.	7,5		188	6,6	66	2,3	40	0,04	0,01	1,9	0,17	1,1	3,4	2,4
20	pvk1	13.12.23	5,8	25	15	6	950	17	570	2 000	1,2	29.11. - 31.12.	6,0		108	3,8	58	2,0	44	0,03	0,01	1,7	0,03	1,00		2,1
TALVI n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,0 31	53 9,4	23 11	8,8 897	1 578 66	109 679	669 36 664	23 667 9,9	8,8	TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			9,2	67	2,3	103	0,05 0,01	0,01	3,1 2,1	0,14	1,2	32	17 15
KEVÄT n= 3		keskiarvo keskihajonta	5,7 2,1	25 6,7	23 4,7	6,7 325	1 083 71	120 170	460 141	2 500 0,57	2,2	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			109	2 337	82	1 789	1,5 0,07	0,35	70 35	6,5	27	160	147 77
KESÄ n= 7		keskiarvo keskihajonta	5,8 30	66 44	44 12	1 421 0,71	53 678	294 17	41 000 348	24 5 657	24 17	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			12	298	10	572	0,40 0,22	0,07	15 11	0,28	0,83	238	194 185
ALKUSYKSY n= 2		keskiarvo keskihajonta	5,5 3,5	29 0,71	23 0,71	3,8 141	1 300 141	34	680	2 200	3,9 1,6	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			8,0	824	29	771	0,57 0,07	0,01	35 22	0,05	0,97	3,1	124 99
LOPPUSYKSY n= 3		keskiarvo keskihajonta	5,8 2,6	22 2,1	17 0,42	5,7 0,42	1 077 194	53 50	575 7,1	1 850	1,6 0,69	LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			22	116	4,1	77	0,06 0,00	0,01	4,1 2,3	0,08	1,1	3,5	6,6 3,1
VUOSI n= 19		keskiarvo keskihajonta	5,8 29	46 14	30 6	8 6	1334 585	81 55	535 377	16390 23 807	11,6 14	VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			23	659	23	460 0,09	0,34 0,09	0,05	16 9,9	0,79	3,7	65 84	97 84

Lisätiedot: = pitoisuus alle määritysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määritysrajalla.

23.3. pvk1 kiintoaineen hehkutushäviö 22 mg/l ja hehkutusjäännös <1 mg/l

19.4. Vedessä kiintoainetta.

5.6. Näytepullot hävinneet lähetyksen yhteydessä, joten ei tuloksia tältä näytekierrokselta.

Jakson 29.5.-11.6. kuormitus on laskettu 20.6. näytteen tuloksella.

3.7. pvk1 kiintoaineen hehkutushäviö 31 mg/l ja hehkutusjäännös 5,8 mg/l.

17.7. pvk1 kiintoaineen hehkutushäviö 25 mg/l ja hehkutusjäännös 2 mg/l.

2.8. pvk1 kiintoaineen hehkutushäviö 19 mg/l ja hehkutusjäännös <1 mg/l.





14.8. pvk1 kiintoaineen hehkutushäviö 46 mg/l ja hehkutusjäännös 7,0 mg/l.

Oma virtaamamittaus ei ole toiminut. 2.2.-31.12. virtaama arvioitu läheisen Ahmonsuon valuman avulla.





1.1.-1.2. virtaama arvioitu vesistömallin avulla, sillä Ahmonsuon dataa ei ollut saatavilla.

Syys-lokakuun näytteenotot ovat osaksi jääneet ottamatta tai viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairastumisen vuoksi.

Sauvasuo, pvk 1
Päästötarkkailu



Sauvasuo, pvk 1 Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:

Haltija/tuottaja:

Kunta:

ELY-keskus:

Tarkkailuluokka:

Tahkoneva, kosteikko

Turveruukki Oy

Siikalatva, Rantsila

POPELY

Kesäaikainen

Vesien käsittely:

Vesistöalue:

Purkuvesistö:

Koordinaatit (ETRS TM35FIN):

Kosteikko

Siikajoki

Kurunkanava-Siikajoki 57.029

7147800-431290 (kos ap mp 3)



Näytetiedot			Veden laatu									Virtaamatiedot						
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Jakso	Vedenkorkeus					
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	pvm	MP	cm				
1	kos	10.5.23	6,7	20	26		880				2,4	1.5. - 23.5.	8,0					
2	kos	7.6.23	6,9	25	24		730				2,8	24.5. - 19.6.	3,0					
3	kos	3.7.23										20.6. - 24.7.	0,0					
4	kos	16.8.23	6,6	42	41		1 100				13	25.7. - 14.9.	6,0					
5	kos	20.9.23	6,9	26	27		790				5,6	15.9. - 30.9.	8,0					
KEVÄT n= 1		keskiarvo keskihajonta	6,7	20	26		880				2,4							
KESÄ n= 2		keskiarvo keskihajonta	6,7	34 12	33 12		915 262				7,9 7,2							
ALKUSYKSY n= 1		keskiarvo keskihajonta	6,9	26	27		790				5,6							
1.5.-30.9. n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,7	28 9,5	30 7,8		875 162				6,0 4,9							

Lisätiedot:

3.7. Ei virtaamaa, ei näytettä.

Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Tahkoneva, pvk2																			
Haltija/tuottaja:	Turveruukki Oy		Vesien käsittely:		talvi pvk/la, kesä pvk (ojittamaton)		Tarkkailupisteen				Lupamääräys pvk:n vuosikeskiarvona:									
Kunta:	Siikalatva, Rantsila		Vesistöalue:		Siikajoki		valuma-ala:		187,0 ha		pitoisuus									
ELY-keskus:	POPELY		Purkuvesistö:		laskuoja-Kurunkanava-Siikajoki 57.029		kiintoaine				9 mg/l									
Tarkkailuluokka:	Ympäri­vuotinen		Koordinaatit (ETRS TM35FIN):		7146145-431705 (pvk2 ap mp4)		Kuormittava ala													
							valuma-alueella:		145 ha											







AFRY
AF PÖYRY

Näytetiedot			Veden laatu										Virtaamatiedot						Kuormitustiedot									
Näyte			Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	la/pvk2	10.1.23	6,5	21	51	37	1 000	23	490	12 000	23			1.1. - 27.1.	10,0	11,0	387	2,4	1 606	9,9	180	0,44	0,32	8,6	0,20	4,2	103	198
2	la/pvk2	15.2.23	6,5	15	53	48	760	40	450	11 000	14			28.1. - 27.2.	10,0	11,1	387	2,4	703	4,3	56	0,20	0,18	2,9	0,15	1,7	41	53
3	la/pvk2	13.3.23	6,4	22	55	45	570	18	410	25 000	36			28.2. - 9.4.	8,0	7,6	221	1,4	340	2,1	40	0,10	0,08	1,0	0,03	0,75	45	66
4	la/pvk2	17.4.23	6,0	13	21		1 100				6,0			10.4. - 20.4.	28,5	28,8	5 305	33	12 689	79	882	1,4		75			407	
5	la/pvk2	26.4.23	6,3	32	48	5	2 000	420	830	1 800	14			21.4. - 28.4.	53,0	50,0	25 019	155	26 136	162	4 473	6,7	0,63	280	59	116	252	1 957
6	la/pvk2	3.5.23	6,4	26	34		2 000				3,0			29.4. - 5.5.	28,0	28,5	5 075	31	7 141	44	993	1,3		76			115	
7	la/pvk2	10.5.23	6,6	22	44	26	1 400	360	410	5 800	8,0	6,2		6.5. - 16.5.	16,0	18,9	1 253	7,8	1 203	7,4	141	0,28	0,17	9,0	2,3	2,6	37	51
8	pvk2	7.6.23	6,7	28	26	7	860	35	37	6 600	8,8	4,7		17.5. - 13.6.	4,0	5,9	39	0,24	75	0,46	11	0,01	0,00	0,34	0,01	0,01	2,6	3,5
9	pvk2	21.6.23												14.6. - 26.6.	1,5	4,1	3,4	0,02	9,9	0,06	1,9	0,00		0,05			0,90	
10	pvk2	3.7.23	6,8	43	55	26	1 100	25	97	23 000	25	9,9		27.6. - 9.7.	3,0	5,1	19	0,12	112	0,69	26	0,03	0,02	0,66	0,01	0,06	14	15
11	pvk2	18.7.23	6,4	49	44		1 100				19			10.7. - 24.7.	4,0	5,8	39	0,24	200	1,2	53	0,05		1,2			20	
12	pvk2	1.8.23	6,2	43	21		1 400				4,4			25.7. - 7.8.	26,0	28,3	4 217	26	1 772	11	407	0,20		13			42	
13	pvk2	16.8.23	6,3	52	28	2	1 200	16	63	8 700	13	6,0		8.8. - 22.8.	5,0	3,8	68	0,42	76	0,47	21	0,01	0,00	0,49	0,01	0,03	3,5	5,3
14	pvk2	30.8.23	6,5	35	19		860				6,0			23.8. - 14.9.	8,0	7,5	221	1,4	318	2,0	60	0,03		1,5			10	
15	pvk2	20.9.23	6,7	35	34	4	1 700	460	320	4 800	11	6,2		15.9. - 26.9.	20,0	20,2	2 189	14	2 508	16	469	0,46	0,05	23	6,2	4,3	64	148
16	pvk2	5.10.23	6,1	39	41		2 900				14			27.9. - 10.10.	26,0	26,6	4 217	26	3 825	24	798	0,84		59			286	
17	pvk2	18.10.23	6,2	34	24	2	2 000	730	100	1 100	8,4			11.10. - 20.10.	28,0	28,5	5 075	31	6 086	38	1 107	0,78	0,07	65	24	3,3	36	273
18	pvk2	24.10.23	5,8	38	26		2 800				5,6			21.10. - 31.10.	13,0	11,5	745	4,6	793	4,9	161	0,11		12			24	
19	la/pvk2	6.11.23	6,4	22	56	44	1 100	90	490	15 000	34			1.11. - 24.11.	16,5	16,1	1 353	8,4	821	5,1	97	0,25	0,19	4,8	0,40	2,2	66	149
20	la/pvk2	14.12.23	6,6	15	40	35	530	14	100	9 300	17			25.11. - 31.12.	9,0	9,6	297	1,8	348	2,2	28	0,07	0,07	0,99	0,03	0,19	17	32
TALVI n= 3		keskiarvo keskihajonta	6,5 3,8	19 2,0	53 2,0	43 5,7	777 215	27 12	450 40	16 000 7 810	24 11			TALVI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			2,1	799	4,9	83	0,22 0,14	0,18	3,7 1,5	0,11	2,0	60	97 93
KEVÄT n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,3 8,0	23 12	37 15	15 450	1 625 42	390 42	620 297	3 800 2 828	7,8 4,6	6,2		KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			57	9 034	56	1 479	2,2 1,0	0,37	102 71	27	53	133	591 530
KESÄ n= 6		keskiarvo keskihajonta	6,4 8,9	42 14	32 13	12 207	1 087 9,5	25 30	66 8 924	12 767 8 024	13 8,0	6,9 2,7		KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			4,1	363	2,2	76	0,04 0,01	0,01	2,3 1,4	0,01	0,03	5,6	13 11
ALKUSYKSY n= 4		keskiarvo keskihajonta	6,1 2,4	37 7,8	31 1,2	2 350 592	595 191	210 156	2 950 2 616	9,8 3,6	6,2			ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			19	3 184	20	617	0,55 0,21	0,06	39 31	13	3,9	53	184 167
LOPPUSYKSY n= 2		keskiarvo keskihajonta	6,5 4,9	19 11	48 6,4	40 403	815 54	52 276	295 4 031	12 150 12	26			LOPPUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			5,1	534	3,3	55	0,14 0,08	0,12	2,5 1,1	0,17	0,96	36	78 75
VUOSI n= 19		keskiarvo keskihajonta	6,3 12	31 13	38 18	23 18	1388 682	186 243	316 242	10342 7 553	14 9,5	6,6 1,9		VUOSI	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			14	1 990	12	286	0,40 0,18	0,13	18 12	3,2	5,1	47	127 117

Lisätiedot:	= pitoisuus alle määrittysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittysrajalla.	= lupamääräys täyttyi	= lupamääräys ei täyttynyt
10.1. kiintoaineen hehkutushäviö 13 mg/l ja hehkutusjäännös 10 mg/l.	Ympäristöluvan pitoisuuden raja-arvojen toteutuminen tarkastellaan tältä tuloslakanalta, puhdistustehot (%) tehon tuloslakanalta.		
13.3. kiintoaineen hehkutushäviö 23 mg/l ja hehkutusjäännös 13 mg/l.			
26.4. Pumppaus ei käynnissä, näyte on otettu pumppausaltaasta.	Syys-lokakuun näytteenotot viivästyneet useampien näytteenottajien yhtäaikaisen sairautumisen vuoksi.		
Kuivatusvesien pumppaus pintavalutuskentälle 17.5.-1.11. Osa vesistä kulkeutuu painovoimaisesti pintavalutuskentälle ympärivuotisesti.			
7.6. kiintoaineen hehkutushäviö 14 mg/l ja hehkutusjäännös 11 mg/l.			
21.6. Virtaama niin pieni ettei edustavaa näytettä saatu. Kuormitus laskettu 7.6. ja 3.7. näytteiden pitoisuuksien keskiarvolla.			
3.7. kiintoaineen hehkutushäviö 13 mg/l ja hehkutusjäännös 12 mg/l.			
6.11. kiintoaineen hehkutushäviö 21 mg/l ja hehkutusjäännös 13 mg/l.			

Tahkoneva, pvk2
Päästötarkkailu



Tahkoneva turvetuotantoalueen vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde: Tahkoneva, pvk2
Haltija/tuottaja: Turveruukki Oy
Kunta: Siikalatva, Rantsila
ELY-keskus: POPELY
Tarkkailuluokka: Teho

Vesien käsittely: talvi pvk/la, kesä pvk (ojittamaton)
Vesistöalue: Siikajoki
Purkuvesistö: laskuoja-Kurunkanava-Siikajoki 57.029



Koordinaatit (ETRS TM35FIN): 7145807-431515, Pvk2 yp

Näytetiedot			Veden laatu									Reduktio %								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Ottopvm	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l		%	%	%	%	%	%	%	%
Pvk:n yläpuoli																				
1	pvk 2 yp	10.1.23	6,4	22	35	19	1 400	54	700	12 000	22	10.1.23	5	-46	-95	29	57	30	0	-5
2	pvk 2 yp	15.2.23	6,5	19	29	23	1 200	56	630	8 000	11	15.2.23	21	-83	-109	37	29	29	-38	-27
3	pvk 2 yp	13.3.23	6,4	20	36	24	750	16	560	16 000	31	13.3.23	-10	-53	-88	24	-13	27	-56	-16
4	pvk 2 yp	26.4.23	6,1	33	55	8	2 200	460	940	1 900	20	26.4.23	3	13	44	9	9	12	5	30
5	pvk 2 yp	10.5.23	6,6	24	31	9	1 600	400	470	4 300	6,4	10.5.23	8	-42	-177	13	10	13	-35	-25
6	pvk 2 yp	7.6.23	6,4	27	130	110	590	21	88	30 000	26	7.6.23	-4	80	94	-46	-67	58	78	66
7	pvk 2 yp	3.7.23	6,6	26	87	61	590	12	380	19 000	20	3.7.23	-65	37	57	-86	-108	74	-21	-25
8	pvk 2 yp	16.8.23	6,4	37	85	60	940	21	250	24 000	45	16.8.23	-41	67	96	-28	24	75	64	71
9	pvk 2 yp	20.9.23	6,6	36	38	3	2 300	860	520	4 600	12	20.9.23	3	11	-26	26	47	38	-4	8
10	pvk 2 yp	18.10.23	5,6	40	38	19	2 800	1 100	870	1 200	12	18.10.23	15	37	88	29	34	89	8	30
11	pvk 2 yp	6.11.23	6,4	19	33	20	1 300	170	590	6 300	7,5	6.11.23	-16	-70	-120	15	47	17	-138	-353
12	pvk 2 yp	14.12.23	6,4	16	27	23	760	87	180	7 000	11	14.12.23	6	-48	-52	30	84	44	-33	-55
TALVI	n= 3	keskiarvo	6,4	20	33	22	1 117	42	630	12 000	21	TALVI	5	-59	-97	30	36	29	-33	-14
KEVÄT	n= 2	keskiarvo	6,3	29	43	8,7	1 900	430	705	3 100	13	KEVÄT	5	-7	-75	11	9	12	-23	17
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,5	30	101	77	707	18	239	24 333	30	KESÄ	-37	64	85	-49	-41	73	48	49
ALKUSYKSY	n= 2	keskiarvo	5,9	38	38	11	2 550	980	695	2 900	12	ALKUSYKSY	9	24	72	27	39	70	-2	19
LOPPUSYKSY	n= 2	keskiarvo	6,4	18	30	22	1 030	129	385	6 650	9,3	LOPPUSYKSY	-6	-60	-84	21	60	23	-83	-176
VUOSI	n= 12	keskiarvo	6,2	27	52	32	1 369	271	515	11 192	19	VUOSI	-7	18	26	13	32	39	8	5
Pvk:n alapuoli																				
1	pvk2 ap	10.1.23	6,5	21	51	37	1 000	23	490	12 000	23									
2	pvk2 ap	15.2.23	6,5	15	53	48	760	40	450	11 000	14									
3	pvk2 ap	13.3.23	6,4	22	55	45	570	18	410	25 000	36									
4	pvk2 ap	26.4.23	6,3	32	48	5	2 000	420	830	1 800	14									
5	pvk2 ap	10.5.23	6,6	22	44	26	1 400	360	410	5 800	8,0									
6	pvk2 ap	7.6.23	6,7	28	26	7	860	35	37	6 600	8,8									
7	pvk2 ap	3.7.23	6,8	43	55	26	1 100	25	97	23 000	25									
8	pvk2 ap	16.8.23	6,3	52	28	2	1 200	16	63	8 700	13									
9	pvk2 ap	20.9.23	6,7	35	34	4	1 700	460	320	4 800	11									
10	pvk2 ap	18.10.23	6,2	34	24	2	2 000	730	100	1 100	8,4									
11	pvk2 ap	6.11.23	6,4	22	56	44	1 100	90	490	15 000	34									
12	pvk2 ap	14.12.23	6,6	15	40	35	530	14	100	9 300	17									
TALVI	n= 3	keskiarvo	6,5	19	53	43	777	27	450	16 000	24									
KEVÄT	n= 2	keskiarvo	6,4	27	46	15	1 700	390	620	3 800	11									
KESÄ	n= 3	keskiarvo	6,5	41	36	12	1 053	25	66	12 767	16									
ALKUSYKSY	n= 2	keskiarvo	6,3	35	29	3,1	1 850	595	210	2 950	9,7									
LOPPUSYKSY	n= 2	keskiarvo	6,5	19	48	40	815	52	295	12 150	26									
VUOSI	n= 12	keskiarvo	6,5	28	43	23	1 185	186	316	10 342	18									

Lisätiedot: = pitoisuus alle määräysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määräysrajalla.

10.1.2023 pvk 2 yp kiintoaineen hehkutushäviö 14 mg/l, kiintoaineen hehkutusjäännös 8,0 mg/l





13.3.2023 pvk 2 yp kiintoaineen hehkutushäviö 20 mg/l, kiintoaineen hehkutusjäännös 11 mg/l

26.4.2023 pvk 2 yp kiintoaineen hehkutushäviö 19 mg/l, kiintoaineen hehkutusjäännös 1,6 mg/l

3.7.2023 pvk2 yp kiintoaineen hehkutushäviö 12 mg/l ja hehkutusjäännös 8,0 mg/l.

16.8.2023 pvk2 yp kiintoaineen hehkutushäviö 31 mg/l ja hehkutusjäännös 14 mg/l.

Tahkoneva, pvk2
Tehon tarkkailu



Turvetuotantoalueiden vuosikuormituksen tarkkailu v. 2023

Kohde:	Tervasneva, pvk 1 ap mp1				Tarkkailupisteen		
Haltija/tuottaja:	Turveruukki Oy	Vesien käsittely:	pvk1 (ojittamaton)		valuma-ala:		
Kunta:	Siikajoki, Ruukki	Vesistöalue:	Siikajoki		pvk1	94	ha
ELY-keskus:	POPELY	Purkuvesistö:	laskuoja-Hanhioja-Siikajoki (57.017)				
Tarkkailuluokka:	Kesäaikainen jälkihoitovaiheen tarkkailu	Koordinaatit (ETRS TM35FIN):	7170425-412531, Pvk 1 ap mp 1		Kuormittava ala		
					valuma-alueella:	3,3	ha



AFRY
AF PÖYRY







Näytetiedot			Veden laatu										Virtaamatiedot						Kuormitustiedot								
Näyte		Ottopvm	pH	COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine	Sähkön- johtavuus	Jakso	Vedenkorkeus		Näyteajankohdan		Jakson		COD _{Mn}	Kok.P	PO ₄ -P	Kok.N	NO ₃ -N NO ₂ -N	NH ₄ -N	Fe	Kiinto- aine
N:o	Tunnus		mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mS/m	pvm	cm	cm	m ³ /d	l/s km ²	m ³ /d	l/s km ²	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d	g/ha d
1	pvk1	9.5.23	6,0	13	32		1 100				1,0	7,7	1.5. - 27.5.	27,0	-	4 634	57	357	38	49	0,12		4,2				3,8
2	pvk1	6.6.23	6,4	21	52		590				1,6	9,3	28.5. - 19.6.	9,0	8,3	297	3,7	183	2,3	41	0,10		1,1				3,1
3	pvk1	4.7.23	6,5	52	340		2 200				20	8,3	20.6. - 24.7.	3,0	1,4	19	0,23	83	1,0	46	0,30		1,9				18
4	pvk1	15.8.23	6,5	32	100		830				3,4	13	25.7. - 1.9.	9,0	6,9	297	3,7	1 033	13	352	1,1		9,1				37
5	pvk1	20.9.23	6,0	22	53		830				3,6	20	2.9. - 29.9.	18,0	29,9	1 682	21	1 009	12	236	0,57		8,9				39
6	pvk1	10.10.23	5,2	27	33		1 500				2,2	16	30.9. - 31.10.	30,0	30,5	6 031	74	4 819	60	1 384	1,7		77				113
KEVÄT n= 1		keskiarvo keskihajonta	6,0	13	32		1 100				1,0	7,7	KEVÄT	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			57	357	38	49	0,12 0,05		4,2 2,3				3,8 0,00
KESÄ n= 3		keskiarvo keskihajonta	6,4	35 16	164 154		1 207 869				8,3 10	10 2,5	KESÄ	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			2,5	469	5,8	168	0,57 0,47		4,6 2,0				22 17
ALKUSYKSY n= 2		keskiarvo keskihajonta	5,4	25 3,5	100 14		1 112 474				6,0 0,99	11 2,8	ALKUSYKSY	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			47	3 792	47	848	1,2 0,52		45 29				78 46
1.5.-31.10. n= 6		keskiarvo keskihajonta	5,8	28 13	102 119		1175 590				5,3 7,3	12,4 4,9	1.5.-31.10.	Bruttokuormitus g/ha d Nettokuormitus g/ha d			27	1 302	13	372	0,70 0,42		18 11				38 24

Lisätiedot: = pitoisuus alle määrittysrajan. Keskiarvo ja kuormitus laskettu määrittysrajalla.

Virtaamatiedot SYKE:n WSFS-vesistömallista 1.5.-24.5. ja 30.-31.10. EHP:n virtaamamittaus 25.5.-29.10.

Lopputarkastus pidetty 28.9.2023, ja 17.10. saadun lopputarkastuskertomuksen mukaisesti jälkihoitovaiheen veloitteet lakkasivat olemasta voimassa.

Tervasneva, pvk 1 ap mp1
Jälkihoitovaiheen tarkkailu



n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Hanhioja alapää Han0																			
16.3.23	0,3	0,2	0,0	9,4	64	6,9	13	210	17	16	4,8		4 400	120	120	730	270	190	
6.6.23	0,5	0,3	9,3	9,8	85	6,9	9,4	290	10	30	9,2		3 900	99	82	730	120	29	3,4
4.7.23	0,3	0,15	14,0	6,8	66	6,9	13	450	27	33	7,2		8 900	240	190	1 200	360	120	7,1
15.8.23	0,3	0,2	14,8	6,6	65	6,9	9,9	520	25	44	12		8 400	240	250	840	220	95	2,3
2023	4			8,2	70	6,9	11	368	20	31	8,3		6 400	175	161	875	243	109	4,3
Jousioja Jo0																			
14.3.23	0,2	0,1	0,0	8,1	55	6,7	9,2	380	29	27	9,6		9 900	130	130	1 100	88	700	
6.6.23	0,3	0,15	9,4	11,0	96	7,0	4,8	310	13	32	10		5 000	85	68	630	46	64	4,4
4.7.23	0,5	0,3	13,1	7,6	72	6,2	4,1	390	9,1	41	16		5 200	82	49	830	41	<5	2,9
16.8.23	0,3	0,15	15,1	8,1	80	6,8	5,9	760	37	63	34	22	13 000	170	130	1 300	150	240	5,7
2023	4			8,7	76	6,6	6,0	460	22	41	17		8 275	117	94	965	81	252	4,3
Järvinevan laskuoja JäLo																			
16.3.23	Vettä vähän																		
6.6.23		0,1	9,3	6,0	52	6,9	17	400	19	41	4,4		4 900	150	140	1 200	190	330	8,0
4.7.23	0,2	0,1	14,3	2,2	21	7,1	22	630	42	51	16		9 700	270	200	2 300	34	970	21
15.8.23		0,1	20,5	1,2	13	6,7	16	830	42	75	18		9 600	330	280	1 800	120	1 200	4,6
2023	3			3,1	29	6,9	18	620	34	56	13		8 067	250	207	1 767	115	833	11
Kurranjärvi 4 Kur4																			
21.3.23	0,5	0,8	1,2	6,0	42	5,7	3,6	310	5,2	32	1,2		4 200	46	18	1 400	490	<5	
6.6.23	0,6	0,8	13,6	10	96	6,4	1,9	200	11	23	18		2 900	55	8	470	<5	<5	15
4.7.23	0,6	0,5	16,8	8,7	90	6,5	2,6	180	11	22	22	14	3 000	61	5	480	6	<5	33
15.8.23	0,6	0,5	19,7	8,5	93	6,1	2,2	200	9,1	26	14		2 700	55	5	640	<5	16	34
2023	4			8,3	80	6,1	2,6	223	9,1	26	14		3 200	54	9	748	126	7,8	27
Kurunkanava ku Kk0																			
14.3.23	0,3	0,15	0,3	9,4	65	6,6	9,6	370	31	26	5,5		9 100	74	58	1 100	160	250	
7.6.23		0,1	10,5	11	99	7,0	5,7	270	11	26	6,8		4 400	43	24	670	85	14	3,9
3.7.23	0,2	0,1	14,0	9,2	89	6,9	5,1	360	14	35	10		5 300	58	23	1 000	150	58	7,7
16.8.23		0,2	15,8	7,2	73	7,1	6,4	520	20	44	15		8 700	70	39	1 000	170	120	5,4
2023	4			9,2	82	6,9	6,7	380	19	33	9,3		6 875	61	36	943	141	111	5,7

n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Köyryoja yp Kö yp																			
13.3.24	0,1	0,05	0,0	9,8	67	6,0	2,9	360	4,1	45	4,4		4 800	27	14	450	33	46	
8.6.23		0,1	9,8	10	88	6,2	1,8	170	2,6	23	4,0		1 700	16	5,9	400	18	<5	<1
6.7.23	0,2	0,1	12,6	9,8	92	6,4	2,5	260	7,0	31	13		4 300	51	18	510	38	5,4	5,9
17.8.23		0,1	15,1	7,3	73	5,8	2,5	440	6,1	52	17		5 800	39	13	710	22	11	2,3
2023	4			9,2	80	6,0	2,4	308	5,0	38	9,6		4 150	33	13	518	28	17	3,1
Köyryoja ap Kö ap																			
13.3.23	0,3	0,5	0,6	8,0	56	6,5	6,8	370	21	18	7,2		8 400	45	32	530	56	190	
8.6.23	0,6	0,6	10,1	10	89	6,7	4,3	220	11	21	6,4		3 800	32	18	560	69	33	2,4
6.7.23	0,5	1	12,1	7,6	71	5,9	3,6	310	10	42	10		3 500	50	13	900	330	39	3,9
17.8.23	0,4	0,7	14,5	7,5	74	6,7	5,1	490	17	48	17		8 200	57	29	950	64	160	1,9
2023	4			8,3	73	6,3	5,0	348	15	32	10		5 975	46	23	735	130	106	2,7
Lamujoki Koreojan alap LamPu																			
22.3.23	1,2	0,6	0,1	11	75	6,6	2,9	120	1,6	15	1,6		1 600	18	6,1	520	65	25	
5.6.23	0,8	0,8	10,4	11	98	6,7	2,2	110	2,9	15	7,0		1 200	21	4,6	380	20	8	4,1
3.7.23	0,6	0,3	14,5	9,4	92	6,7	2,6	140	4,2	16	3,6		2 300	30	10,0	470	16	17	4,8
14.8.23	0,8	0,5	18,5	7,8	83	6,6	2,4	130	5,6	16	6,4		2 100	28	7,3	400	15	12	4,4
2023	4			9,8	87	6,7	2,5	125	4	16	4,7		1 800	24	7,0	443	29	16	4,4
Lamujoki Kortteisen yp Lam57																			
22.3.23	1,4	0,7	0,1	12	82	6,8	2,8	100	1,3	14	1,2		1 100	16	4,6	490	66	23	
5.6.23	0,6	0,3	10,7	10	90	6,9	2,1	98	1,8	15	4,8		940	18	3,2	370	22	6	5,0
3.7.23	0,5	0,25	15,0	8,8	87	6,8	2,5	110	2,4	15	1,6		1 600	23	5,4	440	18	14	2,7
14.8.23	0,6	0,3	18,9	8,3	89	6,8	2,5	100	2,2	14	3,6		1 300	22	3,4	380	16	<5	4,7
2023	4			9,8	87	6,8	2,5	102	1,9	15	2,8		1 235	20	4,2	420	31	12	4,1
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18																			
20.3.23	0,5	0,5	0,3	10	69	6,6	5,1	180	8,0	18	6,0		3 300	43	22	670	130	69	
7.6.23	0,6	0,3	12,1	11	100	7,0	4,1	170	4,9	22	4,0		2 100	38	16	510	32	<5	5,1
5.7.23	0,6	0,3	15,8	8,8	89	7,1	5,3	220	9,0	20	2,4		3 800	66	32	770	150	<5	11
16.8.23	0,5	0,25	18,4	7,8	83	6,8	3,5	260	6,4	28	5,5		3 800	55	27	760	93	37	6,6
2023	4			9,4	85	6,8	4,5	208	7,1	22	4,5		3 250	51	24	678	101	29	7,6

n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Leuanoja le Le0																			
14.3.23	0,3	0,25	-0,1	9,1	62	6,9	11	380	23	25	9,2		9 800	130	130	790	180	300	
7.6.23	0,5	0,5	9,7	10	88	6,9	5,9	280	10	27	10		4 600	77	64	640	44	59	5
6.7.23	0,4	0,3	13,4	8,7	83	6,1	3,0	330	43	41	67	20	7 600	120	59	670	70	11	15
16.8.23	0,4	0,3	15,8	7,8	79	6,9	5,4	460	12	42	17		7 400	100	87	360	95	74	12
2023	4			8,9	78	6,6	6,3	363	22	34	26		7 350	107	85	615	97	111	11
Leuvanjärvi L1 Leu																			
14.3.23	0,3	0,5	0,5	5,9	41	6,3	5,9	430	19	28	7,5		11 000	55	37	870	92	360	
7.6.23	0,5	0,5	13,2	9,6	92	6,5	2,7	220	6,0	26	4,4		3 000	37	3,9	580	<5	<5	11
6.7.23	0,5	0,6	16,0	9,2	93	6,5	2,9	310	8,6	28	9,0		5 700	53	8,0	620	11	5,2	35
16.8.23	0,6	0,6	19,1	6,4	69	6,1	2,9	380	5,3	43	12		5 000	47	5,1	840	6,4	12	31
2023	4			7,8	74	6,3	3,6	335	9,7	31	8,2		6 175	48	14	728	29	96	26
Luhtaanoja Hev1																			
20.3.23	0,1	0,05	0,0	11	75	7,2	13	330	23	31	5,6		5 500	87	65	1 000	200	90	
8.6.23	0,5	0,25	8,4	10	85	7,0	8,8	330	5,5	43	4,6		2 700	51	25	820	7,4	<5	1,9
5.7.23	0,4	0,2	12,4	8,5	80	7,3	9,4	470	19	50	11		6 300	110	48	1 300	16	<5	11
17.8.23	0,3	0,2	14,1	6,9	67	7,2	9,3	620	13	67	8,5		7 500	130	77	1 400	73	35	2,6
2023	4			9,1	77	7,2	10	438	15	48	7,4		5 500	95	54	1 130	74	34	5,2
Luohuanjoki Lu2																			
16.3.23	0,3	0,3	0,0	9,6	66	6,8	16	260	26	18	6,0		6 200	87	79	920	380	200	
6.6.23	0,4	0,4	10,4	9,6	86	6,9	8,9	330	13	31	9,2		5 400	79	53	880	170	36	4,1
4.7.23	0,4	0,2	15,7	6,4	64	6,9	11	390	19	35	7,2		7 200	120	83	1 100	310	62	5,4
15.8.23	0,3	0,3	16,5	6,0	61	6,7	10	570	21	52	9,0		8 800	130	93	1 400	250	90	6,8
2023	4			7,9	69	6,8	11	388	20	34	7,9		6 900	104	77	1 075	278	97	5,4
Mankisenoja alapää Man0																			
21.3.23	0,3	0,3	0,1	8,6	59	6,3	6,0	390	29	28	6,4		7 600	75	66	1 200	150	430	
6.6.23	0,5	0,6	10,5	9,8	88	6,7	3,3	270	9,0	28	8,0		3 600	40	26	620	70	24	3,1
4.7.23	0,4	0,4	15,1	7,8	78	6,7	4,9	510	24	42	14		8 900	92	59	910	140	<5	6,3
15.8.23	0,3	0,5	16,4	6,5	66	6,5	4,8	800	37	60	18		15 000	96	63	1 100	94	170	6,1
2023	4			8,2	73	6,5	4,8	493	25	40	12		8 775	76	54	958	114	157	5,2

n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Naarastenoja alapää Na0																			
20.3.23	0,3	0,5	0,2	8,4	58	6,5	8,2	280	30	15	7,6		6 800	54	45	1 100	230	480	
7.6.23	0,5	0,4	10,1	10	89	7,0	5,8	230	14	20	7,2		4 400	45	29	650	100	91	2,0
5.7.23	0,4	0,5	13,1	9,2	88	6,8	5,2	300	21	30	10		7 600	70	33	860	110	87	8,1
16.8.23	0,4	0,4	14,8	8,5	84	7,0	6,6	430	24	33	13		8 200	63	43	840	100	130	2,8
2023	4			9,0	80	6,7	6,5	310	22	25	9,5		6 750	58	38	863	135	197	4,3
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2																			
23.3.23	0,4	0,2	0,0	10	68	6,7	7,6	260	17	17	8,4		7 500	110	97	980	300	180	
6.6.23	0,5	0,25	10,3	11	98	7,1	5,6	220	11	19	9,6		4 300	82	56	620	120	13	10
4.7.23	0,4	0,2	15,1	7,6	76	7,2	7,8	260	17	19	7,3	5	6 500	100	76	1 000	290	<5	7,9
15.8.23	0,3	0,15	17,0	7,6	79	6,7	5,6	460	16	36	16		8 400	130	100	970	240	78	6,8
2023	4			9,1	80	6,9	6,7	300	15	23	10		6 675	106	82	893	238	69	8,2
Neittävänjoki Leiviskä Ne11																			
22.3.23	0,4	1	0,4	9,2	64	6,8	8,1	250	20	14	6,4		9 900	110	120	1 100	280	310	
6.6.23	0,5	1	9,7	10	88	7,2	<1	210	13	16	6,8		4 500	95	74	700	180	48	14
4.7.23	0,4	1	14,2	6,7	65	7,0	8	270	18	34	7,2		6 400	140	99	1 600	670	9,4	9,3
15.8.23	0,4	1	16,9	6,5	67	6,8	7,1	430	24	31	12		9 000	170	160	890	290	170	6,4
2023	4			8,1	71	6,9	6,2	290	19	24	8,1		7 450	129	113	1 073	355	134	9,9
Neittävänjoki yp Ne yp																			
21.3.23	0,4	1	0,3	11	76	6,8	8,0	210	23	11	6,4		5 400	110	110	1 100	270	350	
6.6.23	0,6	0,6	9,6	9,7	85	7,2	6,8	200	14	14	10		4 400	99	81	720	180	78	19
4.7.23	0,4	0,8	13,2	7,9	75	7,3	8,2	240	42	17	7,5		6 100	130	95	1 100	290	<5	13
15.8.23	0,6	0,7	15,9	7,4	75	7,0	7,3	370	25	25	8,5		7 800	160	160	890	290	160	5,7
2023	4			9,0	78	7,0	7,6	255	26	17	8,1		5 925	125	112	953	258	148	13
Pahkapuro Saarineva PahkaP																			
23.3.23	0,3	0,4	0,0	11	75	6,2	2,2	230	1,8	28	2		6 900	19	8,5	450	16	15	
5.6.23	0,3	0,4	8,8	9,3	80	5,1	1,8	290	0,7	36	1		2 200	14	3,2	400	<5	<5	1,1
3.7.23	0,3	0,3	13,1	7,6	72	5,7	2,1	450	3,3	47	8		5 900	40	12	580	8	<5	1,8
14.8.23	0,3	0,5	16,0	3,4	34	5,3	3,2	950	5,3	92	54	49	20 000	34	8,2	1 200	17	18	2,7
2023	4			7,8	65	5,4	2,3	480	2,8	51	16		8 750	27	8,0	658	11	11	1,9

n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Pakkulanoja Pa0																			
14.3.23	0,4	0,4	0,0	9,3	64	6,7	6,7	330	26	24	4,5		7 200	95	90	830	140	370	
8.6.23	0,4	0,2	8,9	10	86	7,0	4,8	300	17	26	7,4		5 100	80	64	630	100	53	3,0
6.7.23	0,4	0,3	12,4	8,9	83	6,7	4,8	410	21	37	5,0		7 800	120	79	640	200	54	6,7
17.8.23	0,3	0,2	14,0	7,7	75	7,0	6,2	520	33	35	13		11 000	140	120	970	250	58	6,0
2023	4			9,0	77	6,8	5,6	390	24	31	7,5		7 775	109	88	768	173	134	5,2
Pakkulanoja Pa1																			
8.6.23		0,1	9,5	10	88	7,0	6,7	350	20	31	8,0		6 000	99	82	1 000	160	250	7,7
6.7.23	0,3	0,2	13,5	9,0	86	7,0	7,4	510	31	40	7,0		12 000	160	120	1 100	370	430	14
17.8.23	0,3	0,2	14,9	7,3	72	6,9	6,8	560	35	41	14		11 000	140	130	1 500	370	290	6,6
2023	3			8,8	82	7,0	7,0	473	29	37	9,7		9 667	133	111	1 200	300	323	9,4
Pasko-oja, yp Pas yp																			
20.3.23	0,1	0,05	0,0	11	75	6,5	3,6	250	12	26	4,4		3 700	55	41	560	35	91	
8.6.23	0,2	0,1	8,1	10	85	6,3	2,4	320	4,5	36	4,4		2 800	64	45	520	17	<5	1,1
5.7.23	0,2	0,1	11,5	7,9	72	6,3	3,2	370	14	35	10		6 600	110	68	620	19	<5	5,9
17.8.23	0,1	0,05	13,4	6,4	61	6,1	3,2	600	15	66	26	21	7 700	160	110	810	11	23	3,9
2023	4			8,8	73	6,3	3,1	385	11	41	11		5 200	97	66	628	21	31	3,6
Pasko-oja, ap Pas ap																			
20.3.23	0,1	0,05	0,2	11	76	6,7	6,2	270	24	17	8,0		7 300	68	68	980	110	540	
8.6.23	0,2	0,1	7,5	10	83	6,9	5,7	240	17	19	6,3		5 800	60	48	830	330	100	2,3
5.7.23	0,3	0,15	11,4	8,5	78	6,8	5,3	360	55	35	69	34	20 000	170	110	750	51	72	14
17.8.23	0,2	0,1	12,0	7,9	73	7,0	6,9	430	31	31	21	16	12 000	100	85	850	60	210	2,9
2023	4			9,4	78	6,8	6,0	325	32	26	26		11 275	100	78	853	138	231	6,4
Pesunoja Hu yp																			
16.3.23	Jään alla vettä vähän																		
5.6.23	0,25	0,15	10,9	8,9	81	6,9	6,5	450	17	46	17		5 700	110	73	1 100	110	70	13
3.7.23	0,3	0,15	12,0	5,5	51	7,0	12	880	53	64	28	14	15 000	320	280	1 800	270	220	11
14.8.23	0,2	0,2	14,8	5,5	54	6,7	8,3	810	31	65	26	25	11 000	250	200	2 000	300	180	17
2023	3			6,6	62	6,8	8,9	713	34	58	24		10 567	227	184	1 633	227	157	14

n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Pesunoja Hu ap																			
16.3.23	0,1	0,05	0,0	1,6	11	6,3	12	680	27	50	18		13 000	240	210	1 400	32	640	
5.6.23	0,25	0,4	10,9	9,2	83	6,9	7,3	410	26	43	15		5 500	110	65	1 000	110	66	8,9
3.7.23	0,3	0,3	13,1	6,5	62	6,9	10	590	33	48	13		9 500	220	160	1 400	170	110	31
14.8.23	0,2	0,3	15,4	5,7	57	6,7	9,3	680	26	58	19		10 000	200	150	1 700	270	150	12
2023	4			5,8	53	6,6	9,7	590	28	50	16		9 500	193	146	1 375	146	242	17
Ristisenoja Ri4 Ri8																			
20.3.23	0,4	0,6	0,2	9,7	67	6,9	10	280	24	19	8,0		6 600	120	110	890	230	200	
8.6.23	0,5	0,5	9,7	9,3	82	7,1	5,8	270	9,0	29	6,8		3 700	71	52	630	56	20	2,4
5.7.23	0,5	0,4	13,7	9,0	87	7,2	8,6	370	18	29	9,2		8 300	140	92	880	130	<5	5,7
16.8.23	0,3	0,5	16,0	7,0	71	7,1	7,1	480	15	42	14		7 400	140	140	1 000	120	75	4,3
2023	4			8,8	77	7,1	7,9	350	17	30	9,5		6 500	118	99	850	134	75	4,1
Ristisenoja Ri silta																			
20.3.23	0,2	0,1	0,0	8,3	57	6,5	6,7	350	20	34	7,2		5 900	68	49	890	63	200	
8.6.23	0,4	0,2	8,4	10	85	6,7	3,3	250	5,0	32	4,0		2 300	50	28	590	8	<5	1,7
3.7.23	0,3	0,15	15,3	9,2	92	7,0	4,5	360	15	35	10		5 300	110	61	870	32	19	9,0
17.8.23	0,3	0,15	14,5	6,9	68	6,8	4,2	470	10	49	15		5 900	120	79	830	42	38	3,6
2023	4			8,6	76	6,7	4,7	358	13	38	9,1		4 850	87	54	795	36	66	4,8
Ristisenoja Siikalatva Ri yp																			
20.3.23	0,2	0,1	0,1	<0,2	1,4	5,9	5,7	460	21	37	27	19	13 000	45	15	850	14	83	
8.6.23	0,4	0,2	11,9	6,9	64	6,0	2,3	160	1,8	21	5,2		2 300	27	2,6	450	<5	<5	7,4
3.7.23	0,3	0,25	15,8	5,4	54	6,0	2,5	260	8,1	23	7,2		5 500	44	5,3	510	8,2	<5	19
17.8.23	0,6	0,3	16,9	4,3	44	6,2	2,7	250	4,4	22	16		5 600	32	5,8	530	<5	6,8	11
2023	4			5,5	41	6,0	3,3	283	8,8	26	14		6 600	37	7,2	585	8,1	25	12
Savaloja Näsälänperä Sa29																			
13.3.23	0,1	0,05	0,0	7,4	51	6,5	8,4	360	27	26	5,6		8 300	54	41	620	98	240	
8.6.23	0,6	0,5	9,0	9,6	83	6,8	5,4	250	12	26	7,6		4 600	38	24	640	100	56	2,1
6.7.23	0,5	0,5	12,1	7,7	72	6,0	4,0	320	12	44	13		3 700	61	22	1 100	470	41	4,3
17.8.23		0,3	14,2	7,0	68	6,7	6,4	510	23	44	17		9 400	70	42	1 100	140	200	3,0
2023	4			7,9	69	6,4	6,1	360	19	35	11		6 500	56	32	865	202	134	3,1

n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Savalojan suu Sa0																			
15.3.23	0,2	0,1	0,0	5,1	35	6,6	15	380	43	21	12		9 400	110	100	870	230	280	
5.6.23	0,4	0,4	9,7	9,6	84	7,0	9,1	350	16	32	8,0		5 800	84	58	900	100	39	4,9
3.7.23	0,2	0,1	16,3	6,9	70	7,2	13	570	32	35	11		12 000	150	100	1 000	100	6,8	34
14.8.23	0,25	0,3	16,6	5,4	55	6,8	9,0	630	30	48	14		12 000	150	120	1 300	210	90	3,1
2023	4			6,8	61	6,9	11,5	483	30	34	11		9 800	124	95	1 018	160	104	14
Siikajoki 3 p SiiSau																			
30.3.23	Kohteelle ei päästy auraamattomien teiden vuoksi																		
5.6.23	0,4	0,6	8,8	10	86	5,6	2,0	270	1,5	35	1,6		2 000	29	13	410	<5	<5	1,1
3.7.23	0,4	0,5	13,0	8,5	81	5,5	2,5	420	2,9	48	5,6		4 300	66	35	610	<5	6	2,0
14.8.23	0,3	0,5	16,0	6,5	66	5,2	3,0	690	3,4	73	15		8 700	69	32	960	8	18	2,9
2023	3			8,3	78	5,4	2,5	460	2,6	52	7,4		5 000	55	27	660	6	10	2,0
Siikajoki 86-tien silta Si40																			
16.3.23	0,5	1	0,1	10	69	6,6	5,2	220	3,2	21	4,0		4 100	280	37	660	210	43	
6.6.23	0,7	1	11,9	9,5	88	7,1	4,1	180	5,7	23	3,6		2 100	39	17	690	200	<5	6,7
4.7.23	1,2	0,75	17,4	7,4	77	7,0	5,2	190	5,6	22	3,4		3 200	54	23	660	110	24	14
15.8.23		0,3	19,6	7,1	77	6,6	4,0	260	7,4	31	8,0		4 000	65	33	760	160	29	11
2023	4			8,5	78	6,8	4,6	213	5,5	24	4,8		3 350	110	28	693	170	25	11
Siikajoki Haarala SiiHa																			
23.3.23	0,2	0,1	0,1	11	75	6,7	3,7	190	4,8	19	3,0		3 000	43	34	420	60	37	
5.6.23	0,5	0,25	9,0	10	87	6,3	2,3	260	2,2	31	3,6		2 300	33	16	770	8,1	<5	1,6
3.7.23	0,4	0,2	13,3	8,8	84	6,4	2,8	370	5,0	39	4,4		4 700	72	41	570	8,4	12	2,4
14.8.23	0,4	0,2	15,0	7,2	71	5,8	3,0	590	4,3	63	15		7 400	73	46	830	16	16	70
2023	4			9,3	79	6,2	3,0	353	4,1	38	6,5		4 350	55	34	648	23	18	25
Siikajoki Niskakosken yp Si101																			
14.3.23	0,4	1	0,3	10	69	6,6	6,0	230	11	22	4,0		4 600	71	64	600	200	96	
7.6.23	0,8	1	12,5	8,9	84	6,6	4,0	220	5,1	28	4,0		2 400	51	19	590	<5	5	15
4.7.23	0,5	1	16,0	6,2	63	6,4	4,2	300	12	32	6,4		4 400	70	32	720	64	<5	19
16.8.23	0,5	1	19,7	5,6	61	6,3	3,6	390	7,2	45	12		4 900	79	41	960	75	18	8,3
2023	4			7,7	69	6,4	4,5	285	8,8	32	6,6		4 075	68	39	718	86	31	14

n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Siikajoki Rantsila Si73																			
15.3.23	0,5	0,8	0,2	9,5	65	7,0	4,9	220	7,1	22	3,0		3 700	56	34	670	210	18	
5.6.23	0,8	1,0	10,9	10	90	6,7	4,2	180	5,6	23	3,4		1 700	39	17	750	190	18	5,2
3.7.23	1,2	0,6	17,1	8,1	84	6,8	4,2	220	6,1	25	3,6		2 900	58	25	750	120	36	12
14.8.23	0,6	1,0	19,6	7,2	79	6,6	3,8	260	7,6	30	8,0		3 600	66	33	830	160	39	9,9
2023	4			8,7	80	6,7	4,3	220	6,6	25	4,5		2 975	55	27	750	170	28	9,0
Siikajoki Ruukki uusi s Ruus																			
16.3.23	0,5	1	0,2	9,5	65	6,7	5,6	220	6,5	21	4,8		3 200	58	39	680	230	44	
6.6.23	0,7	1	12,2	9,6	89	6,7	<1	190	6,3	24	5,6		2 500	44	21	740	210	13	6,6
4.7.23	0,7	1	19,0	6,2	67	7,2	6,3	210	6,4	22	3,8		3 600	68	31	750	120	60	12
15.8.23	0,6	1	19,6	6,4	70	6,6	4,3	270	6,5	30	4,8		3 900	62	32	790	160	32	11
2023	4			7,9	73	6,7	4,3	223	6,4	24	4,8		3 300	58	31	740	180	37	9,9
Siikajoki Saarikoski Si50																			
15.3.23	0,5	0,7	0,1	11	75	6,6	5,2	230	7,5	23	4,0		4 100	57	37	600	220	45	
5.6.23	0,8	1,0	11,8	10	92	6,7	4,7	180	6,0	23	8,4		2 100	44	20	710	200	15	5,1
3.7.23	1,0	0,5	18,0	7,7	81	7,1	5,4	190	6,0	20	5,8		3 000	60	22	700	93	39	16
14.8.23	0,6	1,0	19,4	7,1	77	6,6	3,9	260	8,3	29	8,0		3 800	67	34	820	160	31	12
2023	4			9,0	81	6,7	4,8	215	7,0	24	6,6		3 250	57	28	708	168	33	11
Siikajoki SiikaJ																			
30.3.23	Kohteelle ei päästy auraamattomien teiden vuoksi																		
5.6.23	0,4	0,8	8,8	10	86	5,9	2,0	270	1,3	34	2		2 100	27	12	410	<5	<5	<1
3.7.23	0,5	0,6	13,0	8,6	82	5,4	2,5	420	2,9	49	4		4 400	69	36	640	6,6	<5	1,4
14.8.23	0,3	1,0	16,0	7,2	73	5,2	2,9	690	3,6	72	15		8 700	68	33	950	7,1	17	3,6
2023	3			8,6	80	5,4	2,5	460	2,6	52	7		5 067	55	27	667	6,2	9,0	2,5
Tahkoneva laskuoja T la																			
13.3.23	0,2	0,25	0,2	1,7	12	6,4	15	780	110	15	43	21	25 000	58	48	760	20	440	
7.6.23	0,2	0,5	9,8	8,7	77	6,8	8,5	440	46	22	12		12 000	42	28	550	5,4	<5	3,1
3.7.23	0,2	0,1	14,1	7,8	76	7,1	11	820	150	31	45	22	26 000	75	42	610	11	5,8	11
16.8.23	0,2	0,3	14,7	5,0	49	6,7	8,8	690	50	40	26	9,3	16 000	49	28	410	41	180	3,8
2023	4			5,8	54	6,7	11	683	89	27	32		19 750	56	37	583	19	158	6,0

n	Näkö- syvyys m	Näytt.otto- syvyys m	Lämpö- tila °C	O ₂ mg/l	kyll. %	pH	S-joht. mS/m	Väri mg/l Pt	Sameus FTU	COD _{Mn} mg/l	Kiinto- aine mg/l	Kiint. hh mg/l	Fe µg/l	Kok. P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok. N µg/l	NO ₂₃ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Kloro- fylli-a µg/l
TUOTANTOALUEKOHTAINEN VESISTÖTARKKAILU																			
Veneoja ve Ve1																			
22.3.23	0,3	0,5	0,0	6,3	43	6,4	6,6	380	15	27	10		13 000	85	82	930	74	200	
6.6.23	0,5	0,4	9,8	9,9	87	6,9	3,6	270	8,5	26	10		4 300	55	32	540	6	17	3,6
4.7.23	0,3	0,3	13,4	7,7	74	6,9	5,9	490	18	32	22	17	11 000	110	65	940	92	<5	13
15.8.23	0,4	0,2	16,0	8,7	88	6,4	3,5	590	14	50	27	22	10 000	97	53	940	56	54	7,9
2023	4			8,2	73	6,5	4,9	433	14	34	17		9 575	87	58	838	57	69	8,2
Vesioja Saarik-Mankila s Ves2																			
15.3.23	Jään alla vettä vähän																		
5.6.23		0,1	11,4	10	92	6,9	10,0	320	16	30	10		5 100	100	79	790	74	19	7,9
3.7.23	0,3	0,15	16,9	5,3	55	6,4	4,5	460	10	47	14		6 600	190	130	930	11	17	21
14.8.23		0,1	17,5	6,3	66	6,7	7,3	540	21	47	15		7 900	180	150	1 200	93	110	7,1
2023	3			7,2	71	6,6	7,3	440	16	41	13		6 533	157	120	973	59	49	12
Vesioja Saarikoski Iso o																			
15.3.23	0,1	0,05	0,0	0,5	3,6	6,3	13	570	29	36	21	17	15 000	160	150	780	59	180	
5.6.23		0,2	10,1	9,0	80	6,9	12	330	28	26	14		6 500	93	74	780	84	48	6,4
3.7.23	0,5	0,25	14,5	6,2	61	6,5	5,2	490	14	44	10		7 800	190	120	1 000	33	53	16
14.8.23	0,2	0,1	15,8	5,7	58	6,7	9,5	640	38	45	21	14	12 000	180	140	1 300	97	190	6,0
2023	4			5,4	51	6,5	9,9	508	27	38	16		10 325	156	121	965	68	118	9,5
Vesioja yp Ves yp																			
15.3.23	Jään alla vettä vähän																		
5.6.23		0,1	11,3	9,0	82	7,0	9,8	300	13	32	8		4 000	100	83	890	98	32	6,3
3.7.23	0,4	0,2	16,4	3,8	39	6,4	4,4	460	8	49	10		6 600	180	130	940	11	16	14
14.8.23	0,2	0,15	15,5	5,6	56	6,8	11	580	30	46	16		9 800	250	210	1 400	180	110	7,9
2023	3			6,1	59	6,6	8,4	447	17	42	11		6 800	177	141	1 077	96	53	9,4

Parametri	pvm	NH3-N	PO4-P	kok.P	O2, kyläst.	O2, liuennut	CODMn	Kiintoaine	Kiintoaineen hehkutushäviö	Kiintoaineen hehkutusjäännös	Klorofylli-a	Loppusyvyys	Lt	NO3+ NO2	Näkösyvyys	Näytteenot tosyvyys	Fe	Sameus	Sähkönjoht.	kok.N	Väri	pH
yksikkö		µg/l	µg/l	µg/l	%	mg O2/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	m	°C	µg/l	m	m	µg/l	FTU	mS/m	µg/l	mg Pt/l	
Siikajoki Saarikoski Si50	10.3.2021	58	34	53	66	9,6	29	3,4					0,1	250	0,5	1	4000	7,6	4,8	860	250	6,39
Siikajoki Saarikoski Si50	9.6.2021	23	18	49	76	7	28	5					19,2	110	0,5	0,6	3300	6,6	4,6	820	220	6,83
Siikajoki Saarikoski Si50	9.6.2021										16	1										
Siikajoki Saarikoski Si50	6.7.2021										18	0,6										
Siikajoki Saarikoski Si50	6.7.2021	5	26	62	70	5,8	31	6					25,1	110	0,5	0,4	4700	8,3	4,4	960	280	6,65
Siikajoki Saarikoski Si50	25.8.2021										10	2										
Siikajoki Saarikoski Si50	25.8.2021	43	41	83	78	8,3	33	14					12,7	130	0,5	1	4200	13	4,4	1000	270	6,66
Siikajoki Saarikoski Si50	1.3.2022	42	32	55	72	11	25	3,6					0,1	210	0,45	1	3100	7,3	4,5	870	220	6,63
Siikajoki Saarikoski Si50	15.6.2022										6,8	0,6										
Siikajoki Saarikoski Si50	15.6.2022	19	23	54	79	7,8	25	8,8					16,2	220	0,6	0,6	2600	7,9	4,1	920	190	6,54
Siikajoki Saarikoski Si50	11.7.2022										9,4	0,5										
Siikajoki Saarikoski Si50	11.7.2022	22	28	55	77	7	22	4					19,9	230	1	0,5	3600	7	4,5	840	230	6,72
Siikajoki Saarikoski Si50	9.8.2022	38	35	95	69	6,9	38	12					15,3	320	0,4	1	3700	14	5,1	1500	310	6,44
Siikajoki Saarikoski Si50	9.8.2022										8	2										
Siikajoki Saarikoski Si50	15.3.2023	45	37	57	75	11	23	4					0,1	220	0,5	0,7	4100	7,5	5,2	600	230	6,61
Siikajoki Saarikoski Si50	5.6.2023										5,1	1										
Siikajoki Saarikoski Si50	5.6.2023	15	20	44	92	10	23	8,4					11,8	200	0,8	1	2100	6	4,7	710	180	6,7
Siikajoki Saarikoski Si50	3.7.2023										16	0,5										
Siikajoki Saarikoski Si50	3.7.2023	39	22	60	81	7,7	20	5,8					18	93	1	0,5	3000	6	5,4	700	190	7,06
Siikajoki Saarikoski Si50	14.8.2023										12	1										
Siikajoki Saarikoski Si50	14.8.2023	31	34	67	77	7,1	29	8					19,4	160	0,6	1	3800	8,3	3,9	820	260	6,57
Parametri	pvm	NH3-N	PO4-P	kok.P	O2, kyläst.	O2, liuennut	CODMn	Kiintoaine	Kiintoaineen hehkutushäviö	Kiintoaineen hehkutusjäännös	Klorofylli-a	Loppusyvyys	Lämpötila	NO3+ NO2	Näkösyvyys	Näytteenot tosyvyys	Rauta	Sameus	Sähkönjoht.	kok.N	Väri	pH
yksikkö		µg/l	µg/l	µg/l	%	mg O2/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	m	°C	µg/l	m	m	µg/l	FTU	mS/m	µg/l	mg Pt/l	
Siikajoki Rantsila Si73	9.3.2021	46	32	53	68	9,9	28	5,1					0,1	250	0,5	0,9	3800	7,6	4,8	830	250	6,52
Siikajoki Rantsila Si73	7.6.2021										18	1,2										
Siikajoki Rantsila Si73	7.6.2021	28	16	46	87	8	29	5,2					19,5	120	0,4	0,7	2700	6,1	3,9	790	210	6,73
Siikajoki Rantsila Si73	6.7.2021										14	1,2										
Siikajoki Rantsila Si73	6.7.2021	29	31	67	77	6,5	30	8,9					24	120	0,5	1	4700	7,9	4,4	990	300	6,77
Siikajoki Rantsila Si73	23.8.2021										9,4	1										
Siikajoki Rantsila Si73	23.8.2021	54	43	80	73	7,5	28	8					14,3	120	0,4	1	4200	9,4	4,3	940	250	6,82
Siikajoki Rantsila Si73	1.3.2022	33	30	54	71	10	25	4					0,1	200	0,35	0,9	3000	7,4	4,3	810	220	7,03
Siikajoki Rantsila Si73	14.6.2022										9	1,5										
Siikajoki Rantsila Si73	14.6.2022	15	19	45	81	7,8	24	5,6					17,1	170	0,5	1	2100	6,5	3,5	840	180	6,66
Siikajoki Rantsila Si73	11.7.2022										9,3	2										
Siikajoki Rantsila Si73	11.7.2022	19	29	57	73	6,7	24	3,6					19,8	220	1	1	3400	5,9	4,1	860	230	6,7
Siikajoki Rantsila Si73	9.8.2022										7,7	2										
Siikajoki Rantsila Si73	9.8.2022	26	34	84	78	7,7	31	14					16	230	0,4	1	3700	13	4,5	1200	300	6,38
Siikajoki Rantsila Si73	15.3.2023	18	34	56	65	9,5	22	3					0,2	210	0,5	0,8	3700	7,1	4,9	670	220	6,98
Siikajoki Rantsila Si73	5.6.2023										5,2	2										
Siikajoki Rantsila Si73	5.6.2023	18	17	39	90	10	23	3,4					10,9	190	0,8	1	1700	5,6	4,2	750	180	6,71
Siikajoki Rantsila Si73	3.7.2023										12	1										
Siikajoki Rantsila Si73	3.7.2023	36	25	58	84	8,1	25	3,6					17,1	120	1,2	0,6	2900	6,1	4,2	750	220	6,8
Siikajoki Rantsila Si73	14.8.2023										9,9	2										
Siikajoki Rantsila Si73	14.8.2023	39	33	66	79	7,2	30	8					19,6	160	0,6	1	3600	7,6	3,8	830	260	6,56

Parametri yksikkö	pvm	NH3-N	PO4-P	kok.P	O2, kyläst.	O2, liuennut	CODMn	Kiintoaine	Kiintoaineen	Kiintoaineen	Klorofylli-a	Loppusyvyyys	Lämpötil	NO3+	Näkösyvyys	Näytteenot				kok.N	Väri	pH
		µg/l	µg/l	µg/l		%	mg O2/l	mg/l	mg/l	mg/l			mg/l	°C		NO2	m	µg/l	µg/l			
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	8.3.2021	190	95	100	72	10	16	8,4					0,1	350	0,3	0,4	6200	19	7,2	1000	240	6,66
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	7.6.2021	72	55	94	87	8,4	25	8,4					17	37	0,3	0,15	5100	13	5,6	820	240	7,22
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	7.6.2021										24	0,2										
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	7.7.2021										36	0,3										
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	7.7.2021	69	71	130	86	7,5	31	9					22,3	8	0,4	0,2	7900	14	6,3	1100	330	7,12
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	23.8.2021										6,2	1										
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	23.8.2021	78	100	140	71	7,5	29	16					12,8	240	0,4	1	5000	19	5,9	1300	270	6,9
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	9.3.2022	130	99	100	76	11	14	4					0,2	340	0,3	0,15	5200	21	7,3	870	210	7,39
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	13.6.2022										14	0,3										
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	13.6.2022	47	61	88	80	7,9	21	12					15,7	160	0,3	0,3	4600	13	5,7	920	250	7,06
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	14.7.2022										72	0,5										
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	14.7.2022	55	61	110	77	7,1	24	9,2					19,5	31	0,6	0,5	6600	11	7	1100	270	7,17
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	16.8.2022										11	0,3										
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	16.8.2022	64	88	110	80	7,9	26	6					15,7	210	0,4	0,2	5400	12	5,8	1000	280	7,04
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	23.3.2023	180	97	110	68	10	17	8,4					0	300	0,4	0,2	7500	17	7,6	980	260	6,74
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	6.6.2023	13	56	82	98	11	19	9,6					10,3	120	0,5	0,25	4300	11	5,6	620	220	7,14
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	6.6.2023										10	0,4										
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	4.7.2023										7,9	0,3										
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	4.7.2023	<5	76	100	76	7,6	19	7,3	4,7	2,7			15,1	290	0,4	0,2	6500	17	7,8	1000	260	7,18
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	15.8.2023	78	100	130	79	7,6	36	16					17	240	0,3	0,15	8400	16	5,6	970	460	6,72
Neittävänjoki Koskenkylä Ne2	15.8.2023										6,8	0,2										
Parametri	pvm	NH3-N	PO4-P	kok.P	O2, kyläst.	O2, liuennut	CODMn	Kiintoaine	Kiintoaineen	Kiintoaineen	Klorofylli-a	Loppusyvyyys	Lämpötil	NO3+	Näkösyvyys	Näytteenot				kok.N	Väri	pH
yksikkö		µg/l	µg/l	µg/l	%	mg O2/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	m	°C	µg/l	m	m	µg/l	FTU	mS/m	µg/l	mg Pt/l	
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	9.3.2021	100	33	49	74	11	25	6					0,1	130	0,3	0,3	4100	9,3	5,2	680	210	6,57
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	8.6.2021										13	0,4										
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	8.6.2021	23	20	56	84	8,2	27	12					16,6	140	0,5	0,3	3200	10	4,6	850	210	6,91
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	5.7.2021	15	35	79	71	6,3	30	6					21,5	86	0,5	0,3	5200	8,8	5	960	290	6,99
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	5.7.2021										17	0,5										
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	24.8.2021										8,2	0,8										
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	24.8.2021	29	44	94	84	9	34	14					12	250	0,4	0,6	3600	16	6,2	1300	270	6,73
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	10.3.2022	54	19	35	74	10	17	3,6					1,8	94	0,5	0,5	2700	6,5	3,8	580	160	6,54
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	14.6.2022										8	0,5										
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	14.6.2022	12	29	70	82	8	26	13					16,5	120	0,5	0,5	2600	24	4,2	850	220	6,77
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	13.7.2022										10	0,5										
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	13.7.2022	<5	31	60	84	7,6	23	4,4					20,3	110	0,7	0,4	3900	9,4	4,1	720	240	6,87
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	11.8.2022										10	0,5										
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	11.8.2022	11	26	65	84	8,4	30	9,2					15,7	150	0,5	0,4	3600	7,5	4,3	1100	250	6,7
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	20.3.2023	69	22	43	69	10	18	6					0,3	130	0,5	0,5	3300	8	5,1	670	180	6,56
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	7.6.2023										5,1	0,5										
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	7.6.2023	<5	16	38	100	11	22	4					12,1	32	0,6	0,3	2100	4,9	4,1	510	170	6,98
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	5.7.2023										11	0,4										
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	5.7.2023	<5	32	66	89	8,8	20	2,4					15,8	150	0,6	0,3	3800	9	5,3	770	220	7,05
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	16.8.2023	37	27	55	83	7,8	28	5,5					18,4	93	0,5	0,25	3800	6,4	3,5	760	260	6,75
Lamujoki Pulkki yp 1,5 km Lam18	16.8.2023										6,6	0,3										

Parametri	pvm	NH3-N µg/l	PO4-P µg/l	kok.P µg/l	O2, kylläst. %	O2, liuennut mg O2/l	CODMn mg/l	Kiintoaine mg/l	Kiintoaineen hehkutushäviö mg/l	Kiintoaineen hehkutusjäännös mg/l	Klorofylli-a µg/l	Loppusyvyyys m	Lämpötila °C	NO3+ NO2 µg/l	Näkösyvyys m	Näytteenot tosyvyyys m	Rauta µg/l	Sameus FTU	Sähköjoht. mS/m	kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	pH
Savalojan suu Sa0	10.3.2021	370	taa	130	34	5	31	9					0,1	130	0,2	0,1	11000	40	13	1300	470	6,42
Savalojan suu Sa0	9.6.2021	110	81	130	58	5,7	54	9,5					16,5	110	0,2	0,1	10000	23	9,1	1500	530	6,9
Savalojan suu Sa0	9.6.2021										10	0,1										
Savalojan suu Sa0	6.7.2021										6,4	0,2										
Savalojan suu Sa0	6.7.2021	130	120	170	43	3,8	57	20	17	3,3			21,4	210	0,3	0,15	14000	30	8,8	1700	670	6,69
Savalojan suu Sa0	25.8.2021										3,6	0,3										
Savalojan suu Sa0	25.8.2021	38	64	140	69	7,9	48	8,5					9,4	150	0,3	0,3	5900	16	6,3	1300	410	6,63
Savalojan suu Sa0	1.3.2022	370	270	130	51	7,4	22	12					0,1	250	0,2	0,1	10000	56	16	1200	460	7,26
Savalojan suu Sa0	16.6.2022										8,6	0,1										
Savalojan suu Sa0	16.6.2022	48	65	110	61	6,5	42	17					12,7	190	0,2	0,1	6700	21	7,5	1400	410	6,59
Savalojan suu Sa0	11.7.2022										4,1	0,5										
Savalojan suu Sa0	11.7.2022	84	110	150	55	5,1	33	9,6					18,9	200	0,3	0,5	12000	43	13	1200	580	7,16
Savalojan suu Sa0	9.8.2022										4,1	0,6										
Savalojan suu Sa0	9.8.2022	59	43	97	48	5	62	8,4					13	200	0,3	0,4	4200	8,9	5,4	1700	410	5,88
Savalojan suu Sa0	15.3.2023	280	100	110	35	5,1	21	12					0	230	0,2	0,1	9400	43	15	870	380	6,6
Savalojan suu Sa0	5.6.2023										4,9	0,5										
Savalojan suu Sa0	5.6.2023	39	58	84	84	9,6	32	8					9,7	100	0,4	0,4	5800	16	9,1	900	350	6,99
Savalojan suu Sa0	3.7.2023	6,8	100	150	70	6,9	35	11					16,3	100	0,2	0,1	12000	32	13	1000	570	7,2
Savalojan suu Sa0	3.7.2023										34	0,1										
Savalojan suu Sa0	14.8.2023										3,1	0,4										
Savalojan suu Sa0	14.8.2023	90	120	150	55	5,4	48	14					16,6	210	0,25	0,3	12000	30	9	1300	630	6,84
Parametri	pvm	NH3-N µg/l	PO4-P µg/l	kok.P µg/l	O2, kylläst. %	O2, liuennut mg O2/l	CODMn mg/l	Kiintoaine mg/l	Kiintoaineen hehkutushäviö mg/l	Kiintoaineen hehkutusjäännös mg/l	Klorofylli-a µg/l	Loppusyvyyys m	Lämpötila °C	NO3+ NO2 µg/l	Näkösyvyys m	Näytteenot tosyvyyys m	Rauta µg/l	Sameus FTU	Sähköjoht. mS/m	kok.N µg/l	Väri mg Pt/l	pH
Luohuanjoki Lu2	10.3.2021	360	93	100	68	10	30	6,4					0,1	270	0,3	0,15	8300	30	15	1200	370	6,56
Luohuanjoki Lu2	9.6.2021										7,7	0,2										
Luohuanjoki Lu2	9.6.2021	71	65	110	70	6,6	46	9,3					18,1	190	0,3	0,15	7400	13	10	1500	420	6,78
Luohuanjoki Lu2	6.7.2021										11	0,2										
Luohuanjoki Lu2	6.7.2021	42	86	130	64	5,5	46	10					23,2	270	0,3	0,15	10000	22	11	1500	500	6,86
Luohuanjoki Lu2	25.8.2021										4	0,8										
Luohuanjoki Lu2	25.8.2021	66	52	82	73	8,4	53	11					9,7	150	0,4	0,6	5000	12	8,4	1400	410	6,35
Luohuanjoki Lu2	1.3.2022	300	86	110	73	11	20	8					0,1	360	0,2	0,1	7000	40	17	1200	320	6,99
Luohuanjoki Lu2	15.6.2022										5,4	0,2										
Luohuanjoki Lu2	15.6.2022	53	71	110	74	7,7	42	16					13,7	180	0,4	0,2	6200	20	8,1	1300	370	6,69
Luohuanjoki Lu2	11.7.2022										11	0,5										
Luohuanjoki Lu2	11.7.2022	61	95	140	59	5,6	43	11					17,7	360	0,3	0,3	11000	20	12	1500	570	6,91
Luohuanjoki Lu2	8.8.2022										4,1	0,4										
Luohuanjoki Lu2	8.8.2022	57	43	99	66	6,9	57	16					13,6	300	0,25	0,3	4600	15	7,4	1700	400	5,9
Luohuanjoki Lu2	16.3.2023	200	79	87	66	9,6	18	6					0	380	0,3	0,3	6200	26	16	920	260	6,82
Luohuanjoki Lu2	6.6.2023	36	53	79	86	9,6	31	9,2					10,4	170	0,4	0,4	5400	13	8,9	880	330	6,94
Luohuanjoki Lu2	6.6.2023										4,1	0,5										
Luohuanjoki Lu2	4.7.2023	62	83	120	64	6,4	35	7,2					15,7	310	0,4	0,2	7200	19	11	1100	390	6,87
Luohuanjoki Lu2	4.7.2023										5,4	0,2										
Luohuanjoki Lu2	15.8.2023										6,8	0,3										
Luohuanjoki Lu2	15.8.2023	90	93	130	61	6	52	9					16,5	250	0,3	0,3	8800	21	10	1400	570	6,69

Liite 5

Paikan nimi yksikkö	ID	E	N	pvm	Näyttesyvyys m	Alkaliniteetti mmol/l	Alumiini µg/l	NH3-N µg/l	Arseeni µg/l	Asiditeetti mmol/l	Barium µg/l	Hg µg/l	TiC mg/l	PO4-P µg/l	O2 %	O2 mg/l	Cd µg/l	K mg/l	Ca mg/l	CODMn mg/l	Kiintoaine mg/l	Cl mg/l	Koboltti µg/l	Kok.P µg/l	Kok.N µg/l	Cr µg/l	Cu µg/l	Pb µg/l	It °C	Mg mg/l	Mn µg/l	Na mg/l	Ni µg/l	NO3+NO2 µg/l	TOC mg/l	pH	Piidioksidi mg/l	Fe µg/l	S µg/l	Sameus FNU	Se µg/l	Zn µg/l	Sr µg/l	SO4 mg/l	Sähkö Ti mS/m µg/l	U µg/l	V µg/l	Värituku mg/l Pt
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	12.1.2021	0,5	0,161	510	74	0,36			0,0036	1,5	24	82	12	0,02	1,1	4,5	32	8	2,4	0,87	55	1000	1,1	1,7	0,28	0	2	96	2,9	2	310	23	6,44	14	3700	6,3	0,05	8,7	6,8	6,4	0,07	1,6	210		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	2.3.2021	0,5	0,208	430	63	0,34			0,0038	3,6	25	68	9,9	0,013	1,1	4,4	32	11	2,4	0,5	930	0,99	0,97	0,22	0,1	2,1	73	3,3	1,4	280	24	6,49	14	3700	7,9	0,05	4,1	4,4	5,2	0,06	1,5	200			
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	7.4.2021	0,5	0,143	710	140	0,42			0,0054	2,8	21	71	10	0,028	1,7	4,7	32	22	2,2	1,6	86	1700	1,3	2	0,32	0,3	2,1	170	2,3	2,3	770	20	6,22	10	3100	14	0,05	8,9	6,6	5,7	0,084	2,6	170		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	13.4.2021	0,5	0,129	690	130	0,4			0,0048	2,9		75	11	0,025	1,5	4,6	33	16	2,1	1,4	69	1500	1,2	1,5	0,27	0,4	2,1	160	2,4	2,2	630	20	6,24	11	2900	11	0,05	8,1	7	5,3	0,079	2,2	190		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	20.4.2021	1,0	0,1	740	77	0,42			0,0053	1,8	12	81	11	0,022	1,1	3,5	33	22	1,4	1,4	58	1200	1,2	1,5	0,29	2,7	1,7	140	1,9	1,9	360	21	6,24	9,7	2900	10	0,05	7,1	5,8	4,2	0,085	2,3	200		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	26.4.2021	0,5	0,091	780	83	0,39			0,0056	1,9	11	84	12	0,024	1	3,6	31	14	1,6	1,3	60	1100	1,3	1,6	0,29	2,2	1,6	130	1,9	2	330	22	6,11	9	2800	17	0,05	7,6	5,6	4,1	0,09	2,4	210		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	5.5.2021	0,7	0,1	600	50	0,33			0,0045	1,7	11	86	11	0,019	0,88	3	28	10	1,4	0,9	49	870	1	2,3	0,27	4,7	1,3	130	1,8	1,6	200	18	6,31	8,9	2300	9	0,05	7,9	4,4	3,6	0,064	1,7	170		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	19.5.2021	0,2	0,109	510	43	0,39			0,0035	1,3	10	83	8,6	0,018	0,94	3,3	30	10	1,5	0,87	54	930	1	1,3	0,24	13,8	1,5	100	2,1	1,7	180	21	6,55	9,5	2700	10	0,05	6,4	4	4	0,067	1,7	180		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	24.5.2021	1,0	0,122	730	69	0,43			0,0047	1,8	14	74	8,6	0,023	1,1	4,6	33	14	2	1,3	59	1200	1,3	1,6	0,25	8,8	2	120	2,5	2,5	210	24	6,15	10	3000	4,2	0,05	8,1	7,4	5,1	0,083	2,1	210		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	16.8.2021	0,5	0,199	420	40	0,53			0,0035	2,1	24	67	6,4	0,018	1,6	5,3	30	12	3,2	0,78	77	1200	1	1,5	0,62	17,8	2,4	130	3,8	2,1	250	23	6,75	10	4500	9,9	0,05	7,7	10	7	0,074	2,2	220		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	13.10.2021	0,2	0,207	550	59	0,47			0,0026	2,4	26	78	9,2	0,021	2,6	6,5	29	12	3,9	1	74	1100	1,2	1,5	0,25	8,3	3,2	120	4,5	3,3	280	20	6,75	14	4000	10	0,05	9,3	14	8,4	0,081	1,9	180		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	1.11.2021	0,1	0,116	580		0,44	0,14	22						0,02	1,11	4,1			2,1	1	42		1,2	1,5	0,32		1,9	96	2,37	2,2		27		2700	2100	0,05	8,4	30	6,8	10	0,079	2,2			
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	9.11.2021	0,5	0,135	550	36	0,37			0,0019	1,2	20	83	11	0,017	1,1	4,2	31	14	2,6	0,78	56	1100	1	1,2	0,23	2,5	1,9	83	2,8	1,9	280	21	6,62	11	2700	8,1	0,05	6,8	7,1	5,1	0,073	1,7	190		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	8.12.2021	0,2	0,171	410	50	0,35			0,012	2,3	24	80	12	0,013	1,1	4	30	16	2,5	0,51	57	880	0,97	1,1	0,26	0,1	1,8	81	2,9	1,3	230	21	6,53	12	3100	6,8	0,05	5,7	4,9	5	0,065	1,7	180		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	11.1.2022	0,3	0,202	340	52	0,33			0,0034	2,7	22	81	12	0,009	1,2	4,1	26	10	2,7	0,32	54	880	0,89	0,94	0,2	0,1	1,9	54	3,2	1,1	260	19	6,54	13	3500	7,6	0,05	3,5	4,9	5,1	0,059	1,5	180		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	10.3.2022	0,8	0,201	330	44	0,31			0,0027	2,4	23	77	11	0,009	1,1	4,2	25	12	2,4	0,31	53	870	0,86	1,6	0,23	0,1	1,9	58	3	1,1	250	18	6,82	12	3300	7,4	0,05	6,5	4	5	0,055	1,4	170		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	6.4.2022	0,5	0,269	410	200	0,38			0,0027	3,3	27	75	11	0,013	1,7	5,3	22	16	3,9	0,76	65	1200	0,97	0,99	0,17	0,3	2,5	120	4	1,8	320	18	6,83	14	4300	10	0,05	5,3	8,2	7,2	0,061	1,5	170		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	12.4.2022	0,2	0,26	420	180	0,37			0,0025	3,6	29	78	11	0,016	1,8	5,4	23	14	3,6	1,1	64	1100	1	1,1	0,19	0,3	2,5	120	3,9	2,1	330	19	6,74	14	3600	11	0,05	6,4	9,3	7,1	0,068	1,6	150		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	21.4.2022	0,5	0,196	790	240	0,43			0,0039	3,9	31	76	11	0,026	2,3	5	27	30	2,9	1,8	130	2000	1,2	1,7	0,31	0,5	2,3	230	2,7	2,3	830	18	6,53	12	4200	25	0,05	8,4	8,1	6,8	0,089	2,5	150		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	27.4.2022	0,5	0,086	690	120	0,42			0,0053	1,4	14	79	11	0,026	1,4	3,9	32	17	1,4	1,2	74	1600	1,2	1,8	0,3	1,4	1,7	150	1,6	1,7	820	24	6,02	8,8	2600	18	0,05	7,8	5,1	4,4	0,083	2,4	180		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	4.5.2022	0,5	0,095	680	80	0,37			0,0039	1,3	11	80	11	0,027	1,2	3,5	30	26	1,4	1,1	57	1400	1,1	1,8	0,27	2,3	1,6	120	1,8	1,7	600	22	6,22	8,9	2700	13	0,05	9,2	5,2	4	0,08	2	170		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	10.5.2022	0,1	0,094	600		0,37	0,15	18						0,017	0,89	3			1,2	0,94	43		1,2	1,4	0,23	5,1	1,38	100	1,58	1,5		21	6		2000	1300	0,05	6	21	4	3,8	16	0,072	2	
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	18.5.2022	1,0	0,104	550	52	0,37			0,0036	1,5	11	82	9,6	0,022	0,9	3,2	28	6	1,5	0,9	56	990	1	1,4	0,21	8,6	1,5	100	2	1,7	330	21	6,23	8,8	2000	11	0,05	9,3	5,3	3,8	0,065	1,7	160		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	30.5.2022	0,2	0,143	410	32	0,35			0,0024	0,7	12	85	8,9	0,015	1	3,5	26	8	1,9	0,7	51	960	0,87	1,2	0,19	13,4	1,6	91	2,5	1,5	230	19	6,92	9,3	2500	7,4	0,05	6,4	5	4,7	0,062	1,4	160		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	1.8.2022	0,1	0,25	260		0,55		16						0,012	1,33	4,5			3,4	0,43	56		0,97	1,1	0,31	20	2,15	74	3,93	1,3		21	6,8		4300	1300	0,05	5,7	33	4,4	5,8	6,5	0,07	2	
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	8.8.2022	1,0	0,186	780	130	0,58			0,0039	1,6	28	69	6,9	0,027	2,1	6	40	30	2,5	1,4	130	1800	1,3	2,2	0,33	15,6	2,7	190	3,2	1,7	520	28	6,37	9,8	4900	23	0,05	8,9	9,2	7,7	0,1	2,8	250		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	10.10.2022	0,2	0,252	680	65	0,44			0,0024	2,8	24	81	9,8	0,018	2,4	7,6	24	12	4,9	1,1	87	1100	1,2	1,5	0,15	7,2	3,8	150	5	3,8	320	19	6,91	16	4100	11	0,05	8,6	24	11	0,093	1,5	160		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	8.11.2022	1,0	0,193	540	60	0,39				2,2	21			0,022	1,4	5,1	27	20	3,2	0,94	66	1100	1,2	1,5	0,25	3,1	2,4	93	3,6	2,5	340	19	7,01	13	3400	11	0,05	11	10	6,7	0,083	1,8	180		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	15.12.2022	1,0	0,325	320	100	0,39				4,5	34	75	11	0,011	1,5	5,6	23	8	3,6	0,57	65	920	1,1	0,79	0,22	0,1	2,6	100	4,6	1,4	260	19	7,39	16	4700	15	0,05	9	7,2	7,5	0,061	1,8	180		
Siikajoki 8-tien s 11600	27880	402804	7178564	18.1.2023	0,5	0,234	410	81	0,36			0,0026	2,3	26	75	11	0,013	1,5	4,8	25	18	2,8	0,66	67	980	0,93	1	0,22																				